

解析学 I

近藤弘一

最終更新日：平成 20 年 6 月 3 日

目次

1	数	1
1.1	集合	1
1.2	数	2
1.3	実数と数直線	2
1.4	区間	3
1.5	上限, 下限	3
1.6	最大値, 最小値	3
1.7	有界集合	4
1.8	絶対値	4
2	関数	5
2.1	写像	5
2.2	写像の分類	6
2.3	合成写像	6
2.4	恒等写像	6
2.5	逆写像	7
2.6	関数	7
2.7	逆関数	8
2.8	多価関数	9
2.9	関数のかたち	9
2.10	関数の上限, 下限, 最大値, 最小値	10
2.11	初等関数	10
2.12	一次関数	10
2.13	べき関数	10
2.14	多項式関数	11
2.15	有理式関数	11
2.16	指数関数	11
2.17	対数関数	12
2.18	角度	12
2.19	三角関数	13
2.20	逆三角関数	15
2.21	双曲線関数	16

2.22	逆双曲線関数	18
2.23	演習 ~ 初等関数	18
2.24	関数の極限	21
2.25	ϵ - δ 論法	23
2.26	関数の極限の性質	23
2.27	関数の極限の確定と不確定	24
2.28	代入だけの極限の計算	25
2.29	有理式の極限の計算	25
2.30	関数の収束の速さを比較して極限の計算	26
2.31	はさみうちの定理による極限の計算	27
2.32	根号の有理化による極限の計算	27
2.33	変数をおきかえて極限の計算	28
2.34	自然対数の底の公式を用いた極限の計算	28
2.35	sinc 関数を用いた極限の計算	29
2.36	双曲線関数の極限の計算	30
2.37	連続と不連続	30
2.38	みかけ上の不連続点	31
2.39	連続関数	31
2.40	演習 ~ 極限, 連続	32
3	微分法	34
3.1	微分係数	34
3.2	導関数	35
3.3	導関数の計算	36
3.4	定数の微分	38
3.5	自然数べきのべき関数の微分	39
3.6	負べきのべき関数の微分	39
3.7	有理数べきのべき関数の微分	40
3.8	対数関数の微分	41
3.9	指数関数の微分	41
3.10	実数べきのべき関数の微分	42
3.11	三角関数の微分	42
3.12	逆三角関数の微分	44
3.13	双曲線関数の微分	45
3.14	逆双曲線関数の微分	46
3.15	接線の方程式	47
3.16	曲線のパラメータ表示	47
3.17	ロピタルの定理	47
3.18	演習 ~ 微分	48
3.19	高階導関数	49
3.20	C^n 級の関数	52
3.21	演習 ~ 高階導関数	53

4	数列	55
4.1	数列	55
4.2	数列の極限	56
4.3	ϵ 論法	57
4.4	発散する数列のいろいろ	58
4.5	不定型, 有限確定, 無限確定	58
4.6	収束するときにかぎり四則演算と極限は可換	59
4.7	収束する数列のいろいろ	59
4.8	等比数列の極限	60
4.9	はさみうちの定理	62
4.10	数列の速さ	62
4.11	ネピア数	62
4.12	数列の有界性と単調性	62
4.13	演習 ~ 数列	63
4.14	級数	64
4.15	収束するときにかぎり極限と四則演算は可換	66
4.16	等比級数	67
4.17	正項級数	69
4.18	正項級数に関する収束性の比較判定法	70
4.19	正項級数に関するダランベールの収束判定法	73
4.20	正項級数に関するコーシーの収束判定法	74
4.21	交項級数	75
4.22	絶対収束級数	76
4.23	べき級数	77
4.24	演習 ~ 級数, べき級数	80
5	テイラー級数	81
5.1	テイラー級数	81
5.2	テイラー級数の導出	82
5.3	指数関数のテイラー級数	83
5.4	三角関数のテイラー級数	84
5.5	対数関数のマクローリン級数	86
5.6	有理式関数のマクローリン級数	87
5.7	べき関数のマクローリン級数	87
5.8	2項係数の拡張	89
5.9	解析関数	90
5.10	テイラー級数の計算	90
5.11	割り算によるテイラー級数の計算	91
5.12	テイラー級数の項別微分	92
5.13	項別積分	93
5.14	オイラーの関係式	94
5.15	テイラー展開	95
5.16	テイラー級数による関数の近似	96
5.17	近似関数の誤差の評価	97

5.18	ランダウの記号	98
5.19	漸近展開	100
5.20	テイラー級数を用いた関数の極限の計算	100
5.21	関数の増減と極値	101
5.22	ちょっとまとめ	102
5.23	演習 ~ テイラー展開	103
6	積分法	104
6.1	不定積分	104
6.2	不定積分の性質	105
6.3	不定積分の基本的な計算	106
6.4	置換積分法	107
6.5	部分積分法	111
6.6	演習 ~ 不定積分, 置換積分, 部分積分	114
6.7	有理関数の積分	115
6.8	1次式の根号を含む関数の積分	124
6.9	2次式の根号を含む関数の積分	125
6.10	三角関数の有理式の積分	127
6.11	演習 ~ 有理式, 根号, 三角関数の積分	128
6.12	定積分	129
6.13	定積分の性質	130
6.14	定積分と不定積分	131
6.15	定積分の置換積分	133
6.16	定積分の部分積分	136
6.17	偶関数と奇関数の定積分	136
6.18	三角関数の定積分	137
6.19	図形の面積	138
6.20	曲線の長さ	139
6.21	回転体の体積	142
6.22	演習 ~ 定積分	142
6.23	広義積分	143
6.24	コーシーの主値積分	146
6.25	級数と定積分	147
6.26	演習 ~ 広義積分	148

1 数

1.1 集合

定義 1.1 (集合) ある一定範囲にある対象物の集まりを 1 つの全体として考えるとき, これを集合 (set) という. その範囲内の個々の対象物を元または要素 (element) という. x が集合 X の元であることを x は X に属する (belong), または X は x を含む (包含する) (contain) といい, $x \in X$ と表記する. その否定を $x \notin X$ と表記する.

ある元 x が条件 $C(x)$ をみたすとする. このとき条件をみたす x 全体の集合を

$$X = \{x \mid C(x)\}$$

と表記する.

例 1.2 (集合の具体例)

自然数全体の集合: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$.

整数全体の集合: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

有理数全体の集合: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$.

実数全体の集合: $\mathbb{R} = \{ \text{有理数と無理数 (irrational number) 全体の集合} \}$
 $= \{ a.b_1b_2b_3b_4\dots \mid a \in \mathbb{Z}, b_1, b_2, \dots \in \{0, 1, 2, \dots, 9\} \}$.

複素数全体の集合: $\mathbb{C} = \{ a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}$.

定義 1.3 (集合の包含関係)

- 元を 1 つも含まない集合を空集合 (empty set) といい, $X = \emptyset$ と表記する.
- 集合 X と Y に含まれる元が全て等しいとき $X = Y$ と表記する. $X = Y$ ではないとき $X \neq Y$ と書く.
- X に含まれる全ての元が Y に含まれるとき, Y は X を含む (contain), または, X は Y の部分集合 (subset) といい, $X \subset Y$ と表記する. $X \subset Y$ ではないとき $X \not\subset Y$ と書く.

注意 1.4 (真部分集合) $X \subset Y$ は定義より $X = Y$ の意味も含む. $X \subset Y$ で $X \neq Y$ のときは, X は Y の真部分集合 (proper subset) という. これを $X \subsetneq Y$ と表記する. 書物によっては部分集合に \subseteq を用い, 真部分集合に \subset を用いる場合もあるので注意が必要である.

例 1.5 (包含関係の具体例)

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

例 1.6 (包含関係の具体例)

$$X = \{(x, y) \mid x + y \leq 1\}, \quad Y = \{(x, y) \mid x + y \leq 0\}$$

のとき

$$X \supset Y$$

が成立する.

1.2 数

数にはいろいろな種類がある．それらのうち普段よく用いるものを列挙する：

- 自然数 (natural number) : $1, 2, 3, \dots$ 自然数全体の集合 = \mathbb{N}
- 整数 (integer) : $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ 整数全体の集合 = \mathbb{Z}
- 有理数 (rational number) : $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{5}, -\frac{2}{3}, \dots$ 分数で表される数 有理数全体の集合 = \mathbb{Q}
- 無理数 (irrational number) : $\sqrt{2}, -\sqrt{3}, \pi, \dots$ 分数で表せない実数
- 実数 (real number) : 有理数と無理数をあわせた数 実数全体の集合 = \mathbb{R}
- 複素数 (complex number) : $\{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ 複素数全体の集合 = \mathbb{C}

上記の数の集合には包含関係があり自然な拡張となっている：

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

問 1.7 (実数の小数表現) 有理数は有限小数または循環小数となる．無理数は循環しない無限小数となる．これを示せ．

問 1.8 (無理数) $\sqrt{2}$ は有理数でないことを示せ．

1.3 実数と数直線

定義 1.9 (実数) 実数 (real number) は数直線 (number line) と一対一対応する数のことである．

注意 1.10 (実数の性質)

- 実数 (数直線) は切目なく連続してつながっている． 連続性については直感的な理解で十分．
- 数直線上の 2 点間には左右の位置関係が必ず存在する．二つの実数の間には必ず大小関係がある．表記は次のように行なう：

$$a > b, \quad a < b.$$

$$a \geq b, \quad a \leq b,$$

$$a \gtrsim b, \quad a \lesssim b,$$

$$a \supseteq b, \quad a \leq b.$$

本講義では単に数と述べるときは実数を指すものとする．

1.4 区間

定義 1.11 (区間) \mathbb{R} の部分集合 I を区間 (interval) といい,

$$(a, b) = \{ x \mid a < x < b \},$$

$$[a, b) = \{ x \mid a \leq x < b \},$$

$$(a, b] = \{ x \mid a < x \leq b \},$$

$$[a, b] = \{ x \mid a \leq x \leq b \}$$

と表記する. 特に, (a, b) を开区間 (open interval), $[a, b]$ を閉区間 (closed interval) という.

例 1.12 (开区間の例)

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty) = \{ x \mid -\infty < x < \infty \}$$

1.5 上限, 下限

定義 1.13 (上限, 下限) 集合 $X \subset \mathbb{R}$ に対して

$$\forall x \in X, x \leq M \text{ をみたす最小な } M \in \mathbb{R} \text{ が存在} \Leftrightarrow \sup X = M$$

$$\forall x \in X, m \leq x \text{ をみたす最大な } m \in \mathbb{R} \text{ が存在} \Leftrightarrow \inf X = m$$

$\sup X$ を X の上限 (supremum), $\inf X$ を X の下限 (infimum) という.

例 1.14 (上限, 下限の具体例)

$$\sup \mathbb{N} = \infty,$$

$$\sup(1, 2] = 2,$$

$$\sup \{ (-1)^n \mid n \in \mathbb{N} \} = 1,$$

$$\sup \left\{ \frac{1}{2^n} \mid n = 0, 1, 2, \dots \right\} = 1,$$

$$\sup \{ x^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \} = 1,$$

$$\sup \{ x^2 \mid -1 < x < 1 \} = 1,$$

$$\inf \mathbb{N} = 1$$

$$\inf(1, 2] = 1$$

$$\inf \{ (-1)^n \mid n \in \mathbb{N} \} = -1$$

$$\inf \left\{ \frac{1}{2^n} \mid n = 0, 1, 2, \dots \right\} = 0$$

$$\inf \{ x^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \} = 0$$

$$\inf \{ x^2 \mid -1 < x < 1 \} = 0$$

1.6 最大値, 最小値

定義 1.15 (最大値, 最小値) 集合 $X \subset \mathbb{R}$ に対して

$$\forall x \in X, x \leq M \text{ をみたす最小な } M \in X \text{ が存在} \Leftrightarrow \max X = M$$

$$\forall x \in X, m \leq x \text{ をみたす最大な } m \in X \text{ が存在} \Leftrightarrow \min X = m$$

$\max X$ を X の最大値 (maximum), $\min X$ を X の最小値 (minimum) という.

例 1.16 (最大値, 最小値の具体例)

$$\max \mathbb{N} : \text{存在しない},$$

$$\min \mathbb{N} = 1$$

$$\max(1, 2] = 2,$$

$$\min(1, 2] : \text{存在しない}$$

$$\max \{ (-1)^n \mid n \in \mathbb{N} \} = 1,$$

$$\min \{ (-1)^n \mid n \in \mathbb{N} \} = -1$$

$$\max \left\{ \frac{1}{2^n} \mid n = 0, 1, 2, \dots \right\} = 1,$$

$$\min \left\{ \frac{1}{2^n} \mid n = 0, 1, 2, \dots \right\} : \text{存在しない}$$

$$\max \{ x^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \} = 1,$$

$$\min \{ x^2 \mid -1 \leq x \leq 1 \} = 0$$

$$\max \{ x^2 \mid -1 < x < 1 \} : \text{存在しない},$$

$$\min \{ x^2 \mid -1 < x < 1 \} = 0$$

1.7 有界集合

定義 1.17 (有界集合) $X \subset \mathbb{R}$ に対して

- (i) $\forall x \in X, x \leq M$ をみたす $M \in \mathbb{R}$ が存在するとき, X は上に有界 (**upper bounded**) であるという.
- (ii) $\forall x \in X, x \geq m$ をみたす $m \in \mathbb{R}$ が存在するとき, X は下に有界 (**lower bounded**) であるという.
- (iii) 上にも下にも有界のとき単に X は有界 (**bounded**) であるという.

1.8 絶対値

定義 1.18 (絶対値) 実数 a の絶対値 (**absolute value**) を

$$|a| = \begin{cases} a & (a > 0) \\ 0 & (a = 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

と定義する.

問 1.19 (絶対値の別の定義) 関数 $\max(x, y)$ を

$$\max(x, y) = \begin{cases} x & (x > y) \\ x & (x = y) \\ y & (x < y) \end{cases}$$

と定義するとき, $|a| = \max(a, -a)$ が成立することを示せ.

定理 1.20 (絶対値の性質) 絶対値に関して次の性質が成り立つ:

- (1) $|-a| = |a|$.
- (2) $|ab| = |a||b|$.
- (3) $|a + b| \leq |a| + |b|$.

$$(4) |a - b| \geq |a| - |b|.$$

問 1.21 (絶対値の性質) 性質 (1)–(4) を示せ .

(証明) a と b とをそれぞれ正 , 負 , 零の場合に分け , 全ての組合わせにおいて議論を行なう .

2 関数

2.1 写像

定義 2.1 (写像) 集合 X の各元に対して , 集合 Y の元を対応させる規則 f を写像 (mapping) といい ,

$$f : X \rightarrow Y,$$

または

$$X \xrightarrow{f} Y$$

と表記する . さらに $X \ni x, Y \ni y$ のとき

$$f : x \mapsto y,$$

または

$$y = f(x)$$

と表記する .

注意 2.2 (写像) X のすべての元に対して対応規則を定める . Y の元に対しては対応づけされていない元があってもよい . また , Y のあるひとつの元 y に対して X の複数の元 x_1, x_2, \dots, x_n が対応づけされていてもよい .

注意 2.3 (写像) 写像 f が $y = f(x)$ の形の式で表されるとき f を関数 (function) とも呼ぶ .

注意 2.4 (変換) 写像 $f : X \rightarrow X$ に対しては f を変換 (transformation) とも呼ぶ .

例 2.5 (写像の具体例) 集合

$$X = \{ \text{ひらがな全体} \}, \quad X = \{ \text{カタカナ全体} \},$$

をとり , 写像 $f : X \rightarrow Y$ をひらがなをカタカナに対応させる規則とする . このとき

$$\text{ア} = f(\text{あ}), \quad \text{ツ} = f(\text{つ})$$

などが成り立つ .

例 2.6 (写像の具体例) 関数 $y = f(x) = ax + b$ は $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の写像である .

2.2 写像の分類

定義 2.7 (全射) 写像 $f: X \rightarrow Y$ において, X のすべての元が Y のすべての元に対応づけられているとき, f を上への写像 (**onto mapping**) または全射 (**surjection**) という. ただし X の複数の元が Y の同じ元へ対応づけられていてもよい.

定義 2.8 (単射) 写像 $f: X \rightarrow Y$ において, Y の元への対応が重ならないとき, f を 1 対 1 写像 (**one-to-one mapping**) または単射 (**injection**) という. ただし Y の元の中に対応づけがない元があってもよい.

定義 2.9 (全単射) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が全射かつ単射であれば, f を上への 1 対 1 写像または全単射 (**bijection**) という.

例 2.10 (写像の分類)

- 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = ax + b$ は全単射である.
- 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = x(x-1)(x-2)$ は全射である.
- 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = e^x$ は単射である.
- 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = x^2$ は全射でも単射でもない.

2.3 合成写像

定義 2.11 (合成写像) 写像 $f: X \rightarrow Y; y = f(x)$ と $g: Y \rightarrow Z; z = g(y)$ に対して $z = g(f(x)) = h(x)$ により定まる写像 $h: X \rightarrow Z$ を f と g の合成写像 (**composite**) といい,

$$h = g \circ f, \quad z = h(x) = (g \circ f)(x) = g \circ f(x) = g(f(x))$$

と表記する. $h = g \circ f$ は合成関数ともいう.

例 2.12 (合成写像の具体例) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y = f(x) = ax + b$ と $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; z = g(y) = y^2$ の合成写像は

$$h(x) = g \circ f(x) = g(f(x)) = g(ax + b) = (ax + b)^2$$

である.

定理 2.13 (合成写像の性質) 写像の合成に対して結合則

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

が成り立つ.

2.4 恒等写像

定義 2.14 (恒等写像) 写像 $f: X \rightarrow X$ において $x = f(x)$ をみたすとき, すなわち f が変化をおよぼさない変換であるとき, f を恒等写像 (**identity mapping**) といい,

$$f = \text{id}.$$

と表記する.

例 2.15 (恒等写像の具体例) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y = f(x) = x$ は恒等写像である.

2.5 逆写像

定義 2.16 (逆写像) 写像 f に対して

$$g \circ f = \text{id}.$$

をみたす写像 g が存在するとき, 写像 g を $g = f^{-1}$ と表記し, f の逆写像 (inverse mapping) という.

定理 2.17 (逆写像) 写像 f が全単射のとき逆写像 f^{-1} は存在する.

例 2.18 (逆写像) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = f(x) = ax + b$ の逆写像は $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y \mapsto x = f^{-1}(y) = (y - b)/a$ である.

例 2.19 (逆写像) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto y = f(x) = x^2$ は全単射ではないので逆写像は存在しない. ただし, 集合 \mathbb{R} を非負に制限した集合 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ における写像 $f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}; x \mapsto y = f(x) = x^2$ を考えれば, この逆写像は $f^{-1}: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}; y \mapsto x = f^{-1}(y) = \sqrt{x}$ となる.

2.6 関数

関数 (function) とは, ある値 x が与えられたとき, 何らかの演算規則 f に従って値 y を定め, その値 y を返す機能のことである. 関数は

$$y = f(x)$$

と書き表される. 例えばある関数を $f(x) = x^3 - 2x + 5$ と書くことにすると,

$$\begin{array}{lll} f(1) = 1^3 - 2 \times 1 + 5 = 4x & \rightarrow & y = 4 \\ f(0) = 0^3 - 2 \times 0 + 5 = 5 & \rightarrow & y = 5 \\ f(-2) = (-2)^3 - 2 \times (-2) + 5 = 1 & \rightarrow & y = 1 \\ f(a) = a^3 - 2a + 5 & \rightarrow & y = a^3 - 2a + 5 \end{array}$$

のように, $f(x)$ の左辺の括弧内の x がある数に書き置き換われば, 右辺の x もその数に置き換わる. そしてそれぞれの x に応じて値 y が定まる.

入力 x にある変換 f を作用させ出力 y を返す. これを

$$f: x \mapsto y \quad \text{または} \quad x \xrightarrow{f} y$$

と表す.

定義 2.20 (関数に関する名称) 関数 $y = f(x)$ に関連して次の名称を定義する:

- 定数 (constant) ... 一定の値を表す数.
- 変数 (variable) ... 変化する値を表す数.
- 独立変数 (independent variable) ... 自由に値を定めることができる変数 x のこと.
- 従属変数 (dependent variable) ... 独立変数 x に応じて値が変化する変数 y のこと.
- 定義域, 変域 (domain) ... 独立変数 x がとり得る範囲 I .

- 値域 (range) … 従属変数 y がとり得る範囲 J .

例 2.21 (関数に関する名称の具体例) 関数 $y = f(x) = ax^2 + b$ を考える . このとき a, b は定数であり , x, y は変数である . また x は独立変数であり , y は従属変数である . 定義域は $-\infty < x < \infty$ であり , 値域は $b \leq y < \infty$ である .

定義 2.22 (グラフ) x 軸と y 軸を直角に交わるように描き xy 平面 を用意する . 変数 x の値を定義域内で変化させ , 点 $(x, y) = (x, f(x))$ の軌跡を xy 平面内に描く . この曲線に関数 $f(x)$ のグラフ (graph) と呼ぶ .

2.7 逆関数

定義 2.23 (逆関数) $y = f(x)$ を方程式とみなし , x について解いたとき $x = g(y)$ が得られたとする . このとき $g(y)$ を逆関数 (inverse function) と呼び $g(y) = f^{-1}(y)$ と書く . 変数の表し方が本質的でない場合は y と x を取り替えて $f^{-1}(x)$ と書く .

注意 2.24 (逆関数) 逆関数の定義より明らかに

$$f(f^{-1}(x)) = x, \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

が成り立つ . これは f を写像と考えれば

$$f \circ f^{-1} = \text{id.}, \quad f^{-1} \circ f = \text{id.},$$

と表される .

例 2.25 (逆関数の具体例) 関数

$$y = f(x) = ax + b$$

の逆関数を考える . $y = ax + b$ について解くと , $x = (y - b)/a$ となるので , 逆関数は

$$x = f^{-1}(y) = \frac{y - b}{a}$$

となる . y と x を入れ替えると

$$y = f^{-1}(x) = \frac{x - b}{a}$$

である .

例 2.26 (逆関数の具体例) 関数

$$y = f(x) = x^2$$

の逆関数は

$$y = f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$$

である .

例 2.27 (逆関数の具体例) 関数 $f(x) = e^x$ の逆関数は $f^{-1}(x) = \log x$ であり , $g(x) = \log x$ の逆関数は $g^{-1}(x) = e^x$ である .

問 2.28 (逆関数のグラフ) 関数 $y = f(x)$ のグラフとその逆関数 $y = f^{-1}(x)$ のグラフは , 直線 $y = x$ に関して線対称である . これを示せ .

2.8 多価関数

定義 2.29 (一価関数, 多価関数) ある一つの x の値に対して $y = f(x)$ の値が n 個定まるとき, y は n 価 (n -valued function) であるという. すべての x に対して y が 1 価であるとき f を 1 価関数 (single valued function) という. 1 価関数ではないとき多価関数 (many valued function) という. y が最大で n 価となるとき f を n 価関数 (n -valued function) という.

定義 2.30 (枝, 主枝, 主値) 多価関数が一価関数となるように値域を限定する. このとき得られる一価関数それぞれを分枝 (branch) と呼ぶ. この分枝のうち代表する一つを主分枝 (principal branch) と呼ぶ. 主分枝は主値 (principal value) ともいう.

例 2.31 (一価関数, 多価関数, 逆関数, 分枝の具体例) $y = f(x) = x^2$ は一価関数である. この関数の逆関数は $y = f^{-1}(x) = \pm\sqrt{x}$ であり 2 価関数となる. 値域を $y \geq 0$ と $y \leq 0$ とに限定すると一価関数が二つ得られる. すなわち分枝は $y = \sqrt{x}$ と $y = -\sqrt{x}$ である.

2.9 関数のかたち

定義 2.32 (単調関数) 関数 $f(x)$ が $x_1 < x_2$ をみたく任意の点 x_1, x_2 ($\forall x_1, x_2 \in I$) に対して

- $f(x_1) < f(x_2)$ が成り立つとき, 関数 $f(x)$ は単調増加 (monotonic increasing) であると呼ぶ.
- $f(x_1) \leq f(x_2)$ が成り立つとき, 関数 $f(x)$ は広義の単調増加 (monotonic increasing in the wider sense) であると呼ぶ.
- $f(x_1) > f(x_2)$ が成り立つとき, 関数 $f(x)$ は単調減少 (monotonic decreasing) であると呼ぶ.
- $f(x_1) \geq f(x_2)$ が成り立つとき, 関数 $f(x)$ は広義の単調減少 (monotonic decreasing in the wider sense) であると呼ぶ.

単調増加または単調減少である関数を総称して単調関数 (monotonic function) と呼ぶ.

例 2.33 (単調関数の具体例) 関数 $y = f(x) = ax$ を考える. $a > 0$ のとき $f(x)$ は $-\infty < x < \infty$ において単調増加である. また $a < 0$ のときは $f(x)$ は $-\infty < x < \infty$ において単調減少となる. なぜなら $f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)$ であり, $x_2 - x_1 > 0$ であることより, a の符号により $f(x_2)$ と $f(x_1)$ の大小関係が定まるからである.

定義 2.34 (周期関数) $f(x+T) = f(x)$ をみたく関数を周期関数 (periodic function) と呼ぶ. T を周期 (period) と呼ぶ.

定義 2.35 (奇関数, 偶関数) $f(-x) = -f(x)$ をみたく関数を奇関数 (odd function) と呼ぶ. $f(-x) = f(x)$ をみたく関数を偶関数 (even function) と呼ぶ.

問 2.36 奇関数は原点に関して点対称のグラフとなる. 偶関数は y 軸に関して線対称なグラフとなる. これを示せ.

2.10 関数の上限, 下限, 最大値, 最小値

定義 2.37 (上限, 下限) 区間 I に含まれるすべての点 x に対して, $f(x) \leq M$ をみたす最小の $M \in R$ を上限 (supremum), $f(x) \geq m$ をみたす最大の $m \in R$ を下限 (infimum), といい,

$$\sup_{x \in I} f(x) = \sup \{ f(x) \mid x \in I \}, \quad \inf_{x \in I} f(x) = \inf \{ f(x) \mid x \in I \}$$

と表記する.

定義 2.38 (最大値, 最小値) 区間 I に含まれるすべての点 x に対して, $f(x)$ の値が最大となる値を最大値 (maximum), 最小となる値は最小値 (minimum) といい,

$$\max_{x \in I} f(x) = \max \{ f(x) \mid x \in I \}, \quad \min_{x \in I} f(x) = \min \{ f(x) \mid x \in I \}$$

と表記する.

例 2.39 (上限, 下限, 最大値, 最小値の具体例)

$$\begin{array}{llll} \sup_{x \in [-1,1]} x^2 = 1, & \inf_{x \in [-1,1]} x^2 = 0, & \max_{x \in [-1,1]} x^2 = 1, & \min_{x \in [-1,1]} x^2 = 0 \\ \sup_{x \in (-1,1)} x^2 = 1, & \inf_{x \in (-1,1)} x^2 = 0, & \max_{x \in (-1,1)} x^2 : \text{存在しない}, & \min_{x \in (-1,1)} x^2 = 0 \end{array}$$

2.11 初等関数

本講義では初等関数 (elementary function) の一部のみを取り扱う. 初等関数とは, 代数関数, 指数関数, 対数関数, 三角関数, 逆三角関数, およびこれらの関数の有限回の合成から得られる関数のことである (本当のところは初等教育で取り扱う関数のことを初等関数と呼ぶ).

以下に初等関数のいくつかを列挙する.

2.12 一次関数

一次関数 (linear function) は

$$y = ax + b$$

により与えられる関数である. ただし, a, b は定数である.

2.13 べき関数

べき (べき) 関数 (power function) は

$$y = ax^n$$

により与えられる関数である. ただし, a は定数であり, n は整数である. n をべき関数の次数と呼ぶ.

2.14 多項式関数

多項式関数 (polynomial function) は正の次数をもつべき関数の線形結合で与えられ,

$$y = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

と表される. ただし, a_0, \dots, a_n は定数であり, n は正の整数である. 多項式の次数はべきの最大次数を指す. この場合の多項式の次数は n である.

2.15 有理式関数

有理式関数 (rational polynomial function) は

$$y = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

により与えられる関数である. ただし, $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_m$ は定数であり, n, m は正の整数である.

2.16 指数関数

指数関数 (exponential function) は

$$y = a^x$$

により与えられる関数である. ただし, a は定数である. 特に $a = e$ の場合が重要である. ここで e は

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2.718281828459041 \cdots$$

により定義されるネピア数と呼ばれる定数である. このとき

$$y = e^x = \exp(x)$$

と表される. 単に指数関数と呼ぶときはこの式を指す場合が多い.

定理 2.40 (指数関数の性質) 指数関数の次の性質をもつ:

- (1) $a^x a^y = a^{x+y}$.
- (2) $(a^x)^y = a^{xy}$.
- (3) $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$.
- (4) $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$.

問 2.41 (指数関数のグラフ) 指数関数のグラフを書け.

2.17 対数関数

指数関数の逆関数を対数関数 (**logarithmic function**) といい、

$$y = \log_a x \quad (x > 0)$$

と表される。 y は a を底 (**base**) とする x の対数 (**logarithm**) であると読む。特に $a = 10$ のとき常用対数 (**common logarithm**) と呼び $y = \log x$ と書く。また $a = e$ のとき自然対数 (**natural logarithm**) と呼び $y = \log x$ または $y = \ln x$ と書く。

定理 2.42 (対数関数の性質) 対数関数は次の性質をもつ：

- (1) $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$.
- (2) $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$.
- (3) $\log_a x^y = y \log_a x$.
- (4) $\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$.

問 2.43 (対数関数の性質) この性質を示せ。

(答え) 対数関数は指数関数の逆関数であることと指数関数の性質を用いて示す。

問 2.44 (対数関数のグラフ) 対数関数のグラフを書け。

2.18 角度

定義 2.45 (円周率) 半径 1 の円の長さを 2π と定義する。このとき π を円周率と呼び、その値は

$$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288 \dots$$

である。

定義 2.46 (弧度法による角度) 2つの直線が交わる時、この交点と中心が等しい半径 1 の円を描く。このとき 2つの直線が切り取る円弧の長さを 2直線が成す角度 (**angle**) と定義する。この角度の単位をラジアン (**radian**) といい、rad と表記する。

注意 2.47 (度とラジアン) 度 (**degree**) とラジアンの関係は

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

である。

2.19 三角関数

単位円（半径 1 で中心が原点 O にある円） C と原点 O を通る直線 L を用意する．円 C と直線 L の交点を P とする．点 P より x 軸に下ろした垂線と x 軸との交点を Q とする．点 $(1, 0)$ を Q' とし， Q' を通り y 軸に平行な直線と直線 L との交点を P' とする． Q' から点 P への円弧の（方向付き）長さを x とする．このとき，点 P の座標を $(\cos x, \sin x)$ と定義し，点 P' の座標を $(1, \tan x)$ と定義する．この定義により得られる関数を三角関数（**trigonometric function**）と呼ぶ．読み方は $\sin x, \cos x, \tan x$ の順に sine, cosine, tangent である．

三角関数のべき乗 $(\sin x)^n$ は $\sin^n x$ のように略記する．しかし $n = -1$ のときはこの表記は用いない． $\sin^{-1} x$ は逆三角関数を意味する．このとき表記は $(\sin x)^{-1}$ や $1/\sin x$ とするか新たな記号

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{1}{\tan x}$$

を用いる．

定理 2.48 (三角関数は単位円上の点)

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

（証明）単位円の半径の長さは 1 なので $\overline{OP}^2 = 1$ より導出される．

定理 2.49 (三角関数の偶奇)

$$\begin{aligned}\sin(-x) &= -\sin(x), \\ \cos(-x) &= \cos(x), \\ \tan(-x) &= -\tan(x).\end{aligned}$$

$\sin x, \tan x$ は奇関数であり， $\cos x$ は偶関数である．

定理 2.50 (三角関数の周期性)

$$\begin{aligned}\sin(x + 2\pi) &= \sin(x), \\ \cos(x + 2\pi) &= \cos(x), \\ \tan(x + \pi) &= \tan(x).\end{aligned}$$

$\sin x, \cos x$ は周期 2π の周期関数であり， $\tan x$ は周期 π の周期関数である．

定理 2.51 (三角関数の加法公式) 三角関数の加法公式：

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin x \cos y \pm \cos x \sin y, \\ \cos(x \pm y) &= \cos x \cos y \mp \sin x \sin y, \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}.\end{aligned}$$

定理 2.52 (三角関数の性質) 三角関数どうしの互いの関係：

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x}.$$

問 2.53 (三角関数の性質) これを示せ .

(答え) 加法公式から導出される .

定理 2.54 (三角関数の合成)

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \theta), \quad \theta = \text{Tan}^{-1} \left(\frac{b}{a} \right),$$

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \theta), \quad \theta = \text{Tan}^{-1} \left(\frac{b}{a} \right).$$

問 2.55 (三角関数の合成) これを示せ .

(答え) 加法公式から導出される .

問 2.56 (三角関数のグラフ) 三角関数の概形を書け .

例 2.57 (三角関数の値)

$$\begin{aligned} \sin 0 = 0, \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1, \quad \sin \pi = 0, \quad \sin 2\pi = 0, \\ \cos 0 = 1, \quad \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos \pi = -1, \quad \cos 2\pi = 1, \\ \tan 0 = 0, \quad \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \tan \frac{\pi}{4} = 1, \quad \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \quad \tan \frac{\pi}{2} = \infty, \quad \tan \pi = 0, \quad \tan 2\pi = 0. \end{aligned}$$

問 2.58 (n 倍角の公式) $\cos 2x, \cos 3x, \cos 4x, \dots$ を $\cos x$ の多項式で表せ .

(答え)

$$\begin{aligned} \cos 2x &= 2 \cos^2 x - 1, \\ \cos 3x &= 4 \cos^3 x - 3 \cos x, \\ \cos 4x &= 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1. \end{aligned}$$

問 2.59 (n 倍角の公式) $\cos^2 x, \cos^3 x, \cos^4 x, \dots$ を $\cos 2x, \cos 3x, \cos 4x, \dots$ の線形結合で表せ .

(答え)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \cos x \\ \cos 2x \\ \cos 3x \\ \cos 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -8 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \cos x \\ \cos^2 x \\ \cos^3 x \\ \cos^4 x \end{bmatrix}$$

より

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \cos x \\ \cos^2 x \\ \cos^3 x \\ \cos^4 x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -8 & 0 & 8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ \cos x \\ \cos 2x \\ \cos 3x \\ \cos 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \cos x \\ \cos 2x \\ \cos 3x \\ \cos 4x \end{bmatrix}$$

となるので

$$\begin{aligned}\cos^2 x &= \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}, \\ \cos^3 x &= \frac{1}{4} \cos 3x + \frac{3}{4} \cos x, \\ \cos^4 x &= \frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{8}\end{aligned}$$

を得る.

2.20 逆三角関数

三角関数の逆関数を逆三角関数 (**inverse trigonometric function**) と呼び、 $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$ の逆関数をそれぞれ

$$\begin{aligned}y &= \sin^{-1} x = \arcsin x & (-1 \leq x \leq 1) \\ y &= \cos^{-1} x = \arccos x & (-1 \leq x \leq 1) \\ y &= \tan^{-1} x = \arctan x & (-\infty < x < \infty)\end{aligned}$$

と書き表す. 読み方は上から sine inverse, cosine inverse, tangent inverse または arc sine, arc cosine, arc tangent である. 逆三角関数は多価関数となる. 任意の x に対して無限個の y が存在する. 主値をとり一価関数とした逆三角関数を表すには特に

$$\begin{aligned}y &= \text{Sin}^{-1} x = \text{Arcsin } x & (-1 \leq x \leq 1) & \left(-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}\right) \\ y &= \text{Cos}^{-1} x = \text{Arccos } x & (-1 \leq x \leq 1) & (0 \leq y \leq \pi) \\ y &= \text{Tan}^{-1} x = \text{Arctan } x & (-\infty < x < \infty) & \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

と書く.

問 2.60 (逆三角関数のグラフ) 逆三角関数の概形を書け.

例 2.61 (逆三角関数の値)

$$\begin{aligned}\text{Sin}^{-1} \frac{1}{2} &= \frac{\pi}{6}, & \text{Sin}^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{\pi}{4}, & \text{Sin}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{\pi}{3}, \\ \text{Cos}^{-1} \frac{1}{2} &= \frac{\pi}{3}, & \text{Cos}^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} &= \frac{\pi}{4}, & \text{Cos}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{\pi}{6}, \\ \text{Sin}^{-1}(0) &= 0, & \text{Cos}^{-1}(0) &= \frac{\pi}{2}, & \text{Cos}^{-1}(1) &= 0, & \text{Sin}^{-1}(1) &= \frac{\pi}{2}, \\ \text{Tan}^{-1}(0) &= 0, & \text{Tan}^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} &= \frac{\pi}{6}, & \text{Tan}^{-1}(1) &= \frac{\pi}{4}, & \text{Tan}^{-1} \sqrt{3} &= \frac{\pi}{3}, \\ \text{Sin}^{-1} \left(\frac{-1}{2}\right) &= \frac{-\pi}{6}, & \text{Sin}^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) &= \frac{-\pi}{4}, & \text{Sin}^{-1} \left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{-\pi}{3}, & \text{Sin}^{-1}(-1) &= \frac{-\pi}{2}, \\ \text{Cos}^{-1} \left(\frac{-1}{2}\right) &= \frac{2\pi}{3}, & \text{Cos}^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) &= \frac{3\pi}{4}, & \text{Cos}^{-1} \left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right) &= \frac{5\pi}{6}, & \text{Cos}^{-1}(-1) &= \pi, \\ \text{Tan}^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) &= \frac{-\pi}{6}, & \text{Tan}^{-1}(-1) &= \frac{-\pi}{4}, & \text{Tan}^{-1}(-\sqrt{3}) &= \frac{-\pi}{3}.\end{aligned}$$

2.21 双曲線関数

双曲線関数 (hyperbolic function) とは

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad y = \tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

により定義される関数である。関数の読み方は上から hyperbolic sine, hyperbolic cosine, hyperbolic tangent である。また双曲線関数の逆数を

$$\operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}$$

と定義する。

注意 2.62 (三角関数と双曲線関数) 三角関数は複素関数を用いて次のようにも定義される：

$$\begin{aligned} \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \\ \cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \\ \tan x &= \frac{1}{i} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}} = \frac{\sin x}{\cos x}. \end{aligned}$$

双曲線関数の定義との類似に注意せよ。

問 2.63 (双曲線関数の概形) 双曲線関数の概形を書け。

定理 2.64 (双曲線関数の性質) 双曲線関数は次の性質をもつ。

$$\begin{aligned} \sinh(-x) &= -\sinh(x) && \text{奇関数} \\ \cosh(-x) &= \cosh(x) && \text{偶関数} \\ \tanh(-x) &= -\tanh(x) && \text{奇関数} \\ \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ \sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \\ \tanh(x \pm y) &= \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y} \end{aligned}$$

問 2.65 (双曲線関数の性質) この性質を証明せよ。

(証明) 双曲線関数の定義をそのまま用いれば証明できる。

問 2.66 (双曲線関数の性質) 次の式を導け。

$$\begin{aligned} \cosh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1) \\ \sinh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1) \\ \sinh x \cosh x &= \frac{1}{2} \sinh 2x \\ \tanh^2 x &= 1 - \frac{1}{\cosh^2 x} \end{aligned}$$

問 2.67 (n 倍角の公式) $\cosh 2x, \cosh 3x, \cosh 4x, \dots$ を $\cosh x$ の多項式で表せ .

(答え)

$$\begin{aligned}\cosh 2x &= 2 \cosh^2 x - 1, \\ \cosh 3x &= 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x, \\ \cosh 4x &= 8 \cosh^4 x - 8 \cosh^2 x + 1.\end{aligned}$$

問 2.68 (n 倍角の公式) $\cosh^2 x, \cosh^3 x, \cosh^4 x, \dots$ を $\cosh 2x, \cosh 3x, \cosh 4x, \dots$ の線形結合で表せ .

(答え)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \cosh x \\ \cosh 2x \\ \cosh 3x \\ \cosh 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -8 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \cosh x \\ \cosh^2 x \\ \cosh^3 x \\ \cosh^4 x \end{bmatrix}$$

より

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \cosh x \\ \cosh^2 x \\ \cosh^3 x \\ \cosh^4 x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -8 & 0 & 8 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ \cosh x \\ \cosh 2x \\ \cosh 3x \\ \cosh 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \cosh x \\ \cosh 2x \\ \cosh 3x \\ \cosh 4x \end{bmatrix}$$

となるので

$$\begin{aligned}\cosh^2 x &= \frac{1}{2} \cosh 2x + \frac{1}{2}, \\ \cosh^3 x &= \frac{1}{4} \cosh 3x + \frac{3}{4} \cosh x, \\ \cosh^4 x &= \frac{1}{8} \cosh 4x + \frac{1}{2} \cosh 2x - \frac{1}{8}\end{aligned}$$

を得る .

問 2.69 (円と双曲線) 円 $x^2 + y^2 = 1$ をパラメータ表示すると

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t$$

と表わせる . 双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ をパラメータ表示するには

$$x(t) = \pm \cosh t, \quad y(t) = \sinh t$$

とおけばよい . これを示せ .

注意 2.70 (円関数) 双曲線関数に対して三角関数は円関数と呼ぶこともある .

2.22 逆双曲線関数

双曲線関数の逆関数は逆双曲線関数 (inverse hyperbolic function) と呼び、

$$y = \sinh^{-1} x = \operatorname{arcsinh} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad (-\infty < x < \infty) \quad (1)$$

$$y = \cosh^{-1} x = \operatorname{arccosh} x = \log(x \pm \sqrt{x^2 - 1}) \quad (1 \leq x) \quad (2)$$

$$y = \tanh^{-1} x = \operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad (|x| < 1) \quad (3)$$

と表される。読み方は上から inverse hyperbolic sine, inverse hyperbolic cosine, inverse hyperbolic tangent と hyperbolic arc sine, hyperbolic arc cosine, hyperbolic arc tangent である。 $\sinh^{-1} x, \tanh^{-1} x$ は一価関数であり、 $\cosh^{-1} x$ は二価関数である。 $\cosh^{-1} x$ の枝は $\log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ と $\log(x - \sqrt{x^2 + 1})$ である。通常は前者を主値にとり $\operatorname{Cosh}^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ とおく。

問 2.71 (逆双曲線関数のグラフ) 逆双曲線関数の概形を書け。

問 2.72 (逆双曲線関数の対数関数表示) 逆双曲線関数が (1)–(3) のように対数関数を用いて書き表されることを示せ。

(答え) $y = \sinh^{-1} x$ とおく。逆に書けば $x = \sinh y = (e^y - e^{-y})/2$ である。これより

$$2x = e^y - e^{-y}$$

$$2x e^y = e^{2y} - 1$$

$$e^{2y} - 2x e^y - 1 = 0$$

$$(e^y - x)^2 = x^2 + 1 \geq 0$$

$$e^y - x = \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

$$0 \leq e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1}$$

この条件のもとでは複合の “-” は不適

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1} \geq 0$$

$$y = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

を得る。

2.23 演習 ~ 初等関数

問 2.73 (関数の種類) 次の写像 (1)–(3) は、単射 (1 対 1 写像)、全射 (上への写像)、全単射 (上への 1 対 1 写像)、いずれでもない、のどれであるか答えよ。

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y = f(x) = ax + b$ (2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y = f(x) = e^x$

(3) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y = f(x) = x^2$

問 2.74 (対数関数) 次の値を求めよ。

(1) $\log_{10} 800$ ($\log_{10} 2 \simeq 0.3010$ を用いよ)

問 2.75 (三角関数) 次の値を求めよ .

- (1) $\sin \frac{2\pi}{3}$ (2) $\sin \frac{\pi}{12}$ (3) $\sin \frac{\pi}{6}$ (4) $\sin \left(\frac{-2\pi}{3} \right)$ (5) $\sin \frac{5\pi}{12}$ (6) $\cos \left(\frac{-3\pi}{4} \right)$
 (7) $\cos \frac{\pi}{12}$ (8) $\cos \frac{\pi}{4}$ (9) $\cos \left(\frac{-\pi}{4} \right)$ (10) $\cos \frac{5\pi}{12}$ (11) $\tan \left(-\frac{\pi}{3} \right)$ (12) $\tan \frac{5\pi}{6}$
 (13) $\tan \frac{7\pi}{12}$ (14) $\text{Sin}^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$ (15) $\text{Sin}^{-1} \left(\frac{-1}{2} \right)$ (16) $\text{Sin}^{-1}(0)$ (17) $\text{Sin}^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$
 (18) $\text{Sin}^{-1} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2} \right)$ (19) $\text{Sin}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ (20) $\text{Sin}^{-1} \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} \right)$ (21) $\text{Sin}^{-1}(1)$ (22) $\text{Cos}^{-1}(0)$
 (23) $\text{Cos}^{-1} \frac{1}{2}$ (24) $\text{Cos}^{-1} \left(\frac{-1}{2} \right)$ (25) $\text{Cos}^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$ (26) $\text{Cos}^{-1} \left(\frac{-\sqrt{3}}{2} \right)$ (27) $\text{Cos}^{-1}(1)$
 (28) $\text{Tan}^{-1}(0)$ (29) $\text{Tan}^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$ (30) $\text{Tan}^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right)$ (31) $\text{Tan}^{-1}(1)$ (32) $\text{Tan}^{-1} \sqrt{3}$
 (33) $\text{Tan}^{-1} \left(-\sqrt{3} \right)$

問 2.76 (三角関数) 次の等式を証明せよ .

- (1) $\sin(x+y+z) = \sin x \cos y \cos z + \cos x \sin y \cos z + \cos x \cos y \sin z - \sin x \sin y \sin z$
 (2) $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \theta)$, $\theta = \text{Tan}^{-1}(b/a)$
 (3) $a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \theta)$, $\theta = \text{Tan}^{-1}(b/a)$
 (4) $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ (5) $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ (6) $\cos 4x = 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$
 (7) $\cos^2 x = \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2}$ (8) $\cos^3 x = \frac{1}{4} \cos 3x + \frac{3}{4} \cos x$ (9) $\cos^4 x = \frac{1}{8} \cos 4x + \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{8}$
 (10) $\text{Sin}^{-1} \frac{4}{5} + \text{Sin}^{-1} \frac{5}{13} + \text{Sin}^{-1} \frac{16}{65} = \frac{\pi}{2}$ (ヒント : $16^2 = 256$, $65^2 = 4225$, $63^2 = 3969$)
 (11) $\text{Sin}^{-1} 2x = \text{Sin}^{-1} 2x \sqrt{1-x^2}$ (12) $\text{Cos}^{-1} 2x = \text{Cos}^{-1}(2x^2 - 1)$
 (13) $\text{Tan}^{-1} x + \text{Tan}^{-1} y = \text{Tan}^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ (14) $\text{Tan}^{-1} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \text{Tan}^{-1} x$

問 2.77 (逆三角関数) 次の条件をみたす x を求めよ .

- (1) $\text{Sin}^{-1} x = \text{Cos}^{-1} \frac{3}{5}$ (2) $\text{Cos}^{-1} x = \text{Tan}^{-1} \sqrt{5}$ (3) $\text{Cos}^{-1} x = \text{Sin}^{-1} \frac{1}{3} + \text{Sin}^{-1} \frac{7}{9}$

問 2.78 (双曲線関数) 次の定義を書け .

- (1) $\sinh x$ (2) $\cosh x$ (3) $\tanh x$

問 2.79 (双曲線関数) 次を証明せよ .

- (1) $\sinh^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$ (2) $\text{Cosh}^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 - 1})$ (3) $\tanh^{-1} x = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

問 2.80 (双曲線関数) 次の等式を証明せよ .

- (1) $\sinh(-x) = -\sinh x$ (2) $\cosh(-x) = \cosh x$ (3) $\tanh(-x) = -\tanh x$
 (4) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ (5) $\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$
 (6) $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$ (7) $\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \tanh y}$
 (8) $\cosh 2x = 2 \cosh^2 x - 1$ (9) $\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x$
 (10) $\cosh 4x = 8 \cosh^4 x - 8 \cosh^2 x + 1$ (11) $\sinh x \cosh x = \frac{1}{2} \sinh 2x$
 (12) $\sinh^2 x = \frac{1}{2} \cosh 2x - \frac{1}{2}$ (13) $\cosh^2 x = \frac{1}{2} \cosh 2x + \frac{1}{2}$ (14) $\cosh^3 x = \frac{1}{4} \cosh 3x + \frac{3}{4} \cosh x$
 (15) $\cosh^4 x = \frac{1}{8} \cosh 4x + \frac{1}{2} \cosh 2x - \frac{1}{8}$ (16) $\tanh^2 x = 1 - \frac{1}{\cosh^2 x}$

問 2.81 (双曲線関数) t を任意の実数とするととき, $x = 3 \cosh t, y = 2 \sinh t$ をみたす (x, y) のグラフを描け.

問 2.82 (関数の性質) 関数 $f(x) = x^2$ は $x < 0$ において単調減少であり, $x > 0$ において単調増加であることを示せ.

問 2.83 (関数の性質) 次の関数が単調増加または単調減少となる x の区間を述べよ.

- (1) $\sin x$ (2) $\cos x$ (3) $\tan x$ (4) $\text{Sin}^{-1}x$ (5) $\text{Cos}^{-1}x$ (6) $\text{Tan}^{-1}x$ (7) e^x
 (8) $a^x (a > 1)$ (9) $a^x (0 < a < 1)$ (10) $\log x$ (11) $\log_a x (a > 1)$ (12) $\log_a x (0 < a < 1)$

問 2.84 (関数の性質) 次を求めよ.

- (1) $\sup(1, 2], \inf(1, 2], \max(1, 2], \min(1, 2]$ (2) $\sup[-2, 4), \inf[-2, 4), \max[-2, 4), \min[-2, 4)$
 (3) $\sup_{x \in [-1, 1]} x^2, \inf_{x \in [-1, 1]} x^2, \max_{x \in [-1, 1]} x^2, \min_{x \in [-1, 1]} x^2$ (4) $\sup_{x \in (-1, 1)} x^2, \inf_{x \in (-1, 1)} x^2, \max_{x \in (-1, 1)} x^2, \min_{x \in (-1, 1)} x^2$

問 2.85 (関数の性質) 次の関数についてグラフを描け. (i)–(iv) についても述べよ. (i) 定義域と値域を述べよ. (ii) 多価関数であるか述べよ. また多価関数である場合は何価であるか述べよ. (iii) 周期関数の場合はその周期を述べよ. (iv) 偶関数または奇関数である場合はその種別を述べよ.

- (1) $x^2 + 5x + 6$ (2) $x^2 + 3x + 2$ (3) $2x + 3$ の逆関数 (4) x^2 の逆関数
 (5) $x^2 + 2x + 4$ の逆関数 (6) e^x (7) $\log x$ (8) $1 + e^{-x}$ (9) $\frac{1}{1 + e^{-x}}$
 (10) $e^x + e^{-x}$ (11) $e^x - e^{-x}$ (12) e^{-x} の逆関数 (13) e^{-2x-1} の逆関数 (14) $\frac{x+1}{x-1}$
 (15) $\frac{2x-1}{x+3}$ の逆関数 (16) $\sin x$ (17) $\cos x$ (18) $\tan x$ (19) $\sin^{-1}x$ (20) $\cos^{-1}x$
 (21) $\tan^{-1}x$ (22) $\text{Sin}^{-1}x$ (23) $\text{Cos}^{-1}x$ (24) $\text{Tan}^{-1}x$ (25) $\sinh x$ (26) $\cosh x$
 (27) $\tanh x$ (28) $\sinh^{-1}x$ (29) $\cosh^{-1}x$ (30) $\tanh^{-1}x$ (31) $\text{Cosh}^{-1}x$ (32) $x \sin x$
 (33) $\sin x^2$

問題	定義域	値域	価数	周期 (注 1)	偶・奇関数 (注 2)
(例 1)	$-\infty < x < \infty$	$0 \leq y < \frac{\pi}{2}$	2 価	周期 π	奇
(例 2)	$0 < x$	$y \geq 1$	1 価	周期 2π	偶
(例 3)	$-1 \leq x \leq 1$	$-\infty < y < \infty$	無限多価	×	×
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					
(8)					
(9)					
(10)					
(11)					
(12)					
(13)					
(14)					
(15)					
(16)					
(17)					
(18)					
(19)					
(20)					
(21)					
(22)					
(23)					
(24)					
(25)					
(26)					
(27)					
(28)					
(29)					
(30)					
(31)					
(32)					
(33)					

(注 1) 周期関数である場合は周期の値を書き，周期関数ではない場合は×とする。

(注 2) 偶関数である場合は偶，奇関数である場合は奇，どちらでもない場合は×と書く。

2.24 関数の極限

定義 2.86 (右極限，左極限) 変数 x を右から a に近づけたときの $f(x)$ の値が b に近づくと

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$$

と書き，右極限 (right-hand limit) と呼ぶ。同様に，変数 x を左から a に近づけたときの $f(x)$ の値が b に近づくと

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$$

と書き，左極限 (left-hand limit) と呼ぶ。

また略記として

$$f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x), \quad f(a-0) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$$

と書くこともある。

定義 2.87 (関数の極限) 変数 x を a に近づけるととき、その近づけ方に依らず全て同じ極限となるととき、すなわち

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$$

が成り立つとき、そのときに限り $x \rightarrow a$ における関数 $f(x)$ の極限が存在し、

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad (4)$$

と書く。極限が存在するとき次のように表現する：

x が a に限りなく近づくとき、

関数 $f(x)$ には極限が存在し、その極限值は b である。

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

$$\Leftrightarrow f(x) \rightarrow b \quad (x \rightarrow a).$$

$$\Leftrightarrow f(x) \text{ は } x \rightarrow a \text{ において } b \text{ に収束する (convergent) .}$$

収束しないとき発散する (divergent) という。

例 2.88 (関数の極限の具体例) 関数 $f(x) = x^2$ を考える。このとき

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = 4$$

となる。右からの極限も左からの極限も存在し同じ値となる。よって

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

である。

例 2.89 (関数の極限の具体例) 関数

$$f(x) = \frac{|x|}{x} \quad (x \neq 0)$$

を考える。 $x > 0$ のとき $f(x) = x/x = 1$ であるから右極限は

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = 1$$

となる。 $x < 0$ のとき $f(x) = (-x)/x = -1$ であるから左極限は

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -1$$

となる。右極限と左極限が一致しないので、極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない。

例 2.90 (関数の極限の具体例) 関数

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

を考える. $x \rightarrow +0$ のとき $1/x \rightarrow +\infty$ である. $1/x \rightarrow +\infty$ であるから $f(x)$ は 1 と -1 の間を振動する. よって右極限 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ は存在しない. $x \rightarrow -0$ のとき $1/x \rightarrow -\infty$ である. 以下同様で左極限 $\lim_{x \rightarrow -0} f(x)$ は存在しない. 右極限も左極限も存在しないので, 極限 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ は存在しない.

2.25 ϵ - δ 論法

定義 2.91 (関数の極限) 関数 $f(x)$ が次の条件 (i) をみたすとき,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

と表記する.

(i) $\forall \epsilon > 0$ に対して

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \epsilon$$

をみたす $\delta > 0$ が存在する.

定義 2.92 (関数の連続) 関数 $f(x)$ が点 $x = a$ で連続であるとは, $\forall \epsilon > 0$ に対して

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

をみたす $\delta > 0$ が存在するときをいう.

定義 2.93 (一様連続) 関数 $f(x)$ が定義域 I において一様連続であるとは, $\forall \epsilon > 0$ に対して

$$\forall x, y \in I, \quad 0 < |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

をみたす $\delta > 0$ が存在するときをいう.

定理 2.94 (連続と一様連続) 関数 $f(x)$ が区間 $I = [a, b]$ 連続なとき, $f(x)$ は I において一様連続である.

注意 2.95 (連続と一様連続) 开区間 (a, b) において連続なときは一様連続になるとは限らない.

2.26 関数の極限の性質

定理 2.96 (関数の極限に関する性質) 関数 $f(x), g(x)$ に関して極限

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$$

が存在するならば,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \alpha f(x) &= \alpha \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha A, \\ \lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = A + B, \\ \lim_{x \rightarrow a} (\alpha f(x) + \beta g(x)) &= \alpha \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \beta \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha A + \beta B, \\ \lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) &= \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right) = AB, \\ \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{A}{B}\end{aligned}$$

が成り立つ. ただし, α, β は定数である.

定理 2.97 (はさみうちの定理) 関数 $h(x), f(x), g(x)$ が

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

をみたし, 極限

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \alpha$$

が存在するとき,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$$

が成立する.

例 2.98 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 5) &= 3 \lim_{x \rightarrow 2} x + 5 = 11. \\ \lim_{x \rightarrow 2} (x + 7)(x - 3) &= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 7) \times \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = 9 \times (-1) = -9. \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2} &= \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 2)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

2.27 関数の極限の確定と不確定

定義 2.99 (無限大) 変数 x の値が正で限りなく大きくなる時 $x \rightarrow +\infty$ と書く. 変数 x の値が負で限りなく小さくなる時 $x \rightarrow -\infty$ と書く. また, 変数 $f(x)$ の値が正で限りなく大きくなる時 $f(x) \rightarrow +\infty$ と書く. 変数 $f(x)$ の値が負で限りなく小さくなる時 $f(x) \rightarrow -\infty$ と書く.

注意 2.100 (確定, 不確定) 極限 $f(x)$ ($x \rightarrow a$) を特徴づける性質として, 収束, 発散以外にも次の条件を考える:

収束	有限確定	確定	(例) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \sin x = 0$
発散	無限確定	確定	(例) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$
発散	無限不確定	不確定	(例) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \sin x$
発散	有限不確定	不確定	(例) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$

注意 2.101 (不定形) 極限操作をし不定形

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, \infty \cdot 0, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

と呼ばれる形になるときは注意が必要である．このままではまだ有限確定とも無限確定とも分らない．もしこの形のになるときは式変形をした後に極限操作を行う．極限が有限確定または無限確定

$$\frac{1}{\infty} = 0, \frac{0}{\infty} = 0, \frac{\infty}{1} = \infty, \frac{1}{0} = \infty, \frac{\infty}{0} = \infty, \\ 1 + \infty = \infty, 0 + \infty = \infty, \infty + \infty = \infty, 1 \cdot \infty = \infty$$

するように計算方法を工夫する．

例 2.102 (無限大の具体例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, & \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0, & \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0, & \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0, & \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \infty, & \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty, & \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \\ \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{1}{x-a} = \infty, & \quad \lim_{x \rightarrow a-0} \frac{1}{x-a} = -\infty, & \quad \lim_{x \rightarrow a \pm 0} \frac{1}{(x-a)^2} = \infty, & \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{(x-a)^2} = \infty. \end{aligned}$$

注意 2.103 (関数の増加の速さ) $x \rightarrow \infty$ における関数の増加の速さは次の通りである：

$$e^x \gg x^n \gg x^2 \gg x \gg \sqrt{x} \gg \sqrt[3]{x} \gg \sqrt[n]{x} \gg \log x$$

2.28 代入だけの極限の計算

例 2.104 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} (c_N x^N + c_{N-1} x^{N-1} + \cdots + c_2 x^2 + c_1 x + c_0) \\ = c_N a^N + c_{N-1} a^{N-1} + \cdots + c_2 a^2 + c_1 a + c_0. \end{aligned}$$

例 2.105 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+3}{x^2-1} = \frac{0+3}{0-1} = -3.$$

2.29 有理式の極限の計算

例 2.106 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-2/x}{1+1/x} = \frac{1-0}{1+0} = 1.$$

例 2.107 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-2/x}{1+1/x} = \frac{\infty-0}{1+0} = \frac{\infty}{1} = \infty.$$

例 2.108 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^5 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^3 + 1/x^4 + 1/x^5}{1 - 1/x^4} = \frac{0 + 0 + 0}{1 - 0} = 0.$$

例 2.109 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 1}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 3/x + 1/x^2}{1/x - 5/x^2} = \frac{1 + 0 + 0}{0 - 0} = \frac{1}{0} = \infty.$$

例 2.110 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 1/x}{2 + 3/x^2} = \frac{1 - 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}.$$

例 2.111 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^5 - 4x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 2/x^2}{x^3 - 4 + 1/x^2} = \frac{1 + 0}{\infty - 4 + 0} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

例 2.112 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x}{x^5 - 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 + 2)}{x^2(x^3 - 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2}{x(x^3 - 3)} = \frac{0 + 2}{0(0 - 3)} = \frac{2}{0} = \infty.$$

例 2.113 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^4 - x^3}{2x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(5x^2 - x)}{x^2(2x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2 - x}{2x - 1} = \frac{0 - 0}{0 - 1} = 0.$$

例 2.114 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x + 2} = \frac{1 + 1}{1 + 2} = \frac{2}{3}.$$

例 2.115 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/x}{\sqrt{1 + 1/x^2}} = \frac{1 + 0}{\sqrt{1 + 0}} = 1.$$

2.30 関数の収束の速さを比較して極限の計算

例 2.116 (関数の極限の計算例) $x \rightarrow +\infty$ のとき $e^x \gg x$ より

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

例 2.117 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1 + e^x}{x^3 - 5x + 1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1}{x^3 - 5x + 1} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3 - 5x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2/x^2 - 1/x^3}{1 - 5/x^2 + 1/x^3} + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3 - 5x + 1} \quad (e^x \gg x^3 \text{ より}) \\ &= \frac{0 + 0}{1 - 0 + 0} + \infty = 0 + \infty = \infty. \end{aligned}$$

例 2.118 (関数の極限の計算例) $x \rightarrow \infty$ のとき $x \gg \log x$ より

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} = 0.$$

例 2.119 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5x + 1}{2x - 1 + \log x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5 + \frac{1}{x}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{\log x}{x}} \quad (x \gg \log x \text{ より}) \\ &= \frac{-5 + 0}{2 - 0 + 0} = -\frac{5}{2}. \end{aligned}$$

例 2.120 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 1 + e^x}{2x - 1 + \log x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - 1/x + e^x/x}{2 - 1/x + (\log x)/x} \quad (e^x \gg x \gg \log x \text{ より}) \\ &= \frac{2 - 0 + \infty}{2 - 0 + 0} = \frac{\infty}{2} = \infty. \end{aligned}$$

2.31 はさみうちの定理による極限の計算

例 2.121 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x = 0.$$

(証明) $0 \leq |\sin x| \leq 1$ より, $\left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$ が成り立つ. また, 右辺は 0 に収束する. よって, はさみうちの定理より $\frac{\sin x}{x}$ も 0 に収束する.

2.32 根号の有理化による極限の計算

例 2.122 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1-0}} = 1. \end{aligned}$$

例 2.123 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(1+x) - (1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}) = \frac{1}{2}(\sqrt{1+0} + \sqrt{1-0}) = 1. \end{aligned}$$

2.33 変数をおきかえて極限の計算

注意 2.124 (零への極限) 極限をおきかえて計算を行う：

- $x \rightarrow a$ のとき $t = x - a$ とおき $t \rightarrow 0$ とする .
- $x \rightarrow 0$ のとき $t = 1/x$ とおき $t \rightarrow \infty$ とする .

例 2.125 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1 + e^{-1/x}} \quad (t = 1/x \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{e^t}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\infty}} = \frac{1}{1 + 0} = 1. \end{aligned}$$

例 2.126 (極限の計算例)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +0} x \log x \quad (t = 1/x \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \log \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\log t^{-1}}{t} = - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\log t}{t} = 0. \end{aligned}$$

例 2.127 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{(x-1)(x+2)} \quad (t = x - 1 \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)^3 - (t+1)^2 - (t+1) + 1}{t(t+3)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 + 2t^2}{t(t+3)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 + 2t}{t+3} \\ &= \frac{0+0}{0+3} = 0. \end{aligned}$$

例 2.128 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 2} \quad (t = x - 1 \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)^2 - 1}{(t+1)^3 - 3(t+1) + 2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 + 2t}{t^3 + 3t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t+2}{t^2 + 3t} = \frac{0+2}{0+0} = \frac{2}{0} = \infty. \end{aligned}$$

2.34 自然対数の底の公式を用いた極限の計算

公式 2.129 (ネピア数)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

例 2.130 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x/2}\right)^{x/2} \right)^2 \quad (t = x/2 \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \right)^2 = (e)^2 = e^2. \end{aligned}$$

例 2.131 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \log(1+x) = \lim_{x \rightarrow +0} \log(1+x)^{\frac{1}{x}} \quad (t = 1/x \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t = \log e = 1. \end{aligned}$$

例 2.132 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \quad (t = e^x - 1 \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} \log(t+1) \right)^{-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\log(1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{-1} \quad (z = 1/t \text{ とおく}) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\log \left(1 + \frac{1}{z} \right)^z \right)^{-1} = (\log e)^{-1} = 1^{-1} = 1. \end{aligned}$$

例 2.133 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = 1.$$

(証明) $y = x^x$ とおく. さらに $Y = \log y = \log x^x = x \log x$ とおくと, $y = e^Y$ と書ける. このとき,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} Y &= \lim_{x \rightarrow +0} x \log x \quad (t = 1/x \text{ とおく}) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \log \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\log t^{-1}}{t} = - \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\log t}{t} = 0 \end{aligned}$$

であるから,

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \lim_{x \rightarrow +0} y = \lim_{Y \rightarrow -0} e^Y = e^0 = 1$$

を得る.

2.35 sinc 関数を用いた極限の計算

公式 2.134 (sinc 関数)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

例 2.135 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x} \frac{\sin x}{x} = 0 \cdot 1 = 0.$$

例 2.136 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + x \cos x + \tan 4x}{x + \sin 3x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + \cos x + \frac{4}{\cos 4x} \frac{\sin 4x}{4x}}{1 + 3 \frac{\sin 3x}{3x}} \\ &= \frac{2 \cdot 1 + 1 + \frac{4}{1} \cdot 1}{1 + 3 \cdot 1} = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

例 2.137 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x) - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 1 \cdot \frac{0}{1 + 1} = 0. \end{aligned}$$

2.36 双曲線関数の極限の計算

例 2.138 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1. \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1. \end{aligned}$$

例 2.139 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} \frac{1}{e^x} = 1 \cdot \frac{1}{e^0} = 1.$$

例 2.140 (関数の極限の計算例)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 1 - 2e^x}{2xe^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)^2}{2xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2 \frac{x}{2e^x} = 1^2 \cdot \frac{0}{2e^0} = 0. \end{aligned}$$

例 2.141 (関数の極限の計算例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} \frac{1}{\cosh x} = 1 \cdot \frac{1}{\cosh 0} = 1.$$

2.37 連続と不連続

定義 2.142 (関数の連続性) 次の条件をみたすとき, 関数 $f(x)$ は点 $x = a$ において連続 (continuous) であるという.

- (i) $f(a)$ が定義されている.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ が存在する.
すなわち $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ と $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ が存在し, それらの値が等しい.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ が成立する.
すなわち $f(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ が成立する.

連続ではない場合は不連続 (discontinuous) であるという.

例 2.143 (連続な点の具体例) $f(x) = x^2$ は $x = 2$ において連続である. なぜなら

$$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = 4$$

が成り立つからである.

例 2.144 (不連続な点の具体例) $f(x) = \frac{1}{x-2}$ ($x \neq 2$) は $x = 2$ において不連続である．なぜなら $f(2)$ は定義されていない．さらには $\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x)$ となるからである．

2.38 みかけ上の不連続点

例 2.145 (不連続点の除去の具体例) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($x \neq 0$) は $x = 0$ において不連続である．なぜなら $f(0)$ が定義されていないからである．しかし $f(x)$ を

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$$

と定義すると $f(x)$ は $x = 0$ において連続となる．なぜなら $f(0) = \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 1$ が成立するからである．再定義することにより不連続な点 $x = 0$ は取り除かれた．

例 2.146 (不連続点を除去できない具体例) $f(x) = \frac{1}{x-a}$ ($x \neq a$) は点 $x = a$ において不連続である．点 $x = a$ における値を $f(a) = b$ と定義することにする．うまく b を定めることにより不連続点は取り除くことができるであろうか． $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ であるので，点 $x = a$ の左右で極限がことなる．よってどのように $f(a) = b$ を定めても不連続な点を取り除くことはできない．

例 2.147 (不連続点の除去の具体例) $f(x) = \frac{x-1}{x-1}$ ($x \neq 1$) を考える． $f(x)$ は点 $x = 1$ において不連続である．しかし $f(x)$ は分子分母が等しいので， $x \neq 1$ となる点において $f(x) = 1$ である．よって $\lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} f(x) = 1$ となる．ゆえに点 $x = 1$ の値を $f(1) = 1$ と定義すれば不連続点は取り除かれる．結局，点 $x = 1$ はみかけ上の不連続点であり本質的な不連続点ではない．

2.39 連続関数

定義 2.148 (連続関数) 関数 $f(x)$ が定義内の任意の点において連続であるとき， $f(x)$ は連続関数 (continuous function) であるという．

例 2.149 (連続関数の具体例) 次の関数は連続関数である．

$$f(x) = x^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$f(x) = \log x \quad (x > 0)$$

$$f(x) = \sin(x) \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$f(x) = \cos(x) \quad (-\infty < x < \infty)$$

$$f(x) = \tan(x) \quad \left(\frac{2n-1}{2}\pi < x < \frac{2n+1}{2}\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \right)$$

定義 2.150 (閉区間における連続関数) 関数 $f(x)$ の定義域が閉区間 $a \leq x \leq b$ のとき，その端点では条件

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$$

をみたすとき連続であるとする．

例 2.151 (閉区間における連続関数の具体例) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ ($-2 \leq x \leq 2$) は連続関数である。なぜなら

$$f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2+0} f(x) = 0, \quad f(2) = \lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = 0$$

が成立するからである。

定理 2.152 (連続関数に関する性質) 関数 $f(x)$ と $g(x)$ が連続関数のであるとき, 関数

$$f(x) + g(x), \quad \alpha f(x) + \beta g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)}, \quad f(g(x))$$

もすべて連続関数である。ただし $f(x)/g(x)$ の定義域は $g(x) = 0$ とならないものをとることにする。

例 2.153 (連続関数に関する性質の具体例) べき関数 x^n は連続関数である。よってべき関数の線形結合である多項式 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ も連続関数である。

例 2.154 (連続関数に関する性質の具体例) 多項式 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ と $b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m$ は連続関数である。よってそれらの商である有理関数

$$\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m}$$

も連続関数である。

例 2.155 (連続関数に関する性質の具体例) x^2 と $\sin x$ は連続関数である。よってそれらの合成関数である $\sin(x^2)$ も連続関数である。

2.40 演習 ~ 極限, 連続

問 2.156 (極限) 次の関数について (i) 関数 $f(x)$ のグラフを描け。(ii) 右極限 $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ と左極限 $\lim_{x \rightarrow -0} f(x)$ を求めよ。

$$(1) f(x) = \frac{|x|}{x} \quad (2) f(x) = \tanh\left(\frac{1}{x}\right) \quad (3) f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad (4) f(x) = \text{Tan}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$$

問 2.157 (代入だけで極限の計算) 次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (3x + 5) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} (x + 7)(x - 3) \quad (3) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 2) \quad (4) \lim_{x \rightarrow -2} (2x^3 - x + 5)$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 3}{x^2 - 1} \quad (6) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2} \quad (7) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 2x + 2}$$

問 2.158 (グラフから極限の計算) 次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} \quad (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \quad (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \quad (6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} \quad (7) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \quad (9) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \quad (10) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \quad (11) \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Tan}^{-1}x \quad (12) \lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Tan}^{-1}x$$

問 2.159 (有理式の極限の計算) 次の極限值を求めよ。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{x + 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2}{x + 1} \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x + 1}{x^5 - x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 3x + 1}{x - 5} \quad (5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 3}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x^5 - 4x^2 + 1} \quad (7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + 3x^2}{5x^4 + 2x^3 + 2x^2} \quad (8) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 1} \quad (9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x}{x^5 - 3x^2}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^4 - x^3}{2x^3 - x^2} \quad (11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 4x - 1}{x^4 - x^2} \quad (12) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

問 2.160 (収束の速さを比較して極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} \quad (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1+e^x}{x^3-5x+1} \quad (4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{x} \quad (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x+1}{2x-1+\log x}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1+e^x}{2x-1+\log x}$$

問 2.161 (はさみうちの定理による極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$$

問 2.162 (根号の有理化による極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{x+1}}{x} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x}-\sqrt{2+x}}{x} \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x+a}-\sqrt{x})$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x}(\sqrt{x}-\sqrt{x+1})$$

問 2.163 (変数をおきかえて極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1+e^{-1/x}} \quad (t=1/x \text{ とおく}) \quad (2) \lim_{x \rightarrow +0} x \log x \quad (t=1/x \text{ とおく})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^2+x-2} \quad (t=x-1 \text{ とおく}) \quad (4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-x^2-x+1}{x^2+x-2} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^3-3x+2}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x^2-1} \quad (7) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2-5x+3}{x^2-4x+3} \quad (8) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3+3x^2}{x^2+2x-3}$$

問 2.164 (公式による極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{1}{x}} \quad (6) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\log(1+x)}{x} \quad (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log(1+3x) \quad (8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x} \quad (t=e^x-1)$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad (10) \lim_{x \rightarrow +0} x^x \quad (y=x^x \text{ とおき } Y=\log y \text{ の極限を考える}) \quad (11) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$$

問 2.165 (公式による極限の計算) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 3x} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x} \quad (6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin 4x}{\sin 3x + 5x}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + x \cos x + \tan 4x}{x + \sin 3x} \quad (8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \quad (9) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \quad (10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

問 2.166 (双曲線関数の極限) 次の極限值を求めよ.

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh x \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{x} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{x}$$

問 2.167 (連続) 次の関数が連続となる x の範囲を定めよ.

$$(1) \frac{1}{x-2} \quad (2) \frac{x^2}{x-1} \quad (3) \frac{4x}{x^2-1} \quad (4) \frac{1-|x|}{x} \quad (5) \sqrt{x-3} \quad (6) \frac{\sin x}{x} \quad (7) \frac{1+\sin x}{1+\cos x}$$

$$(8) \frac{1}{\sin x}$$

問 2.168 (連続) 次の関数が連続関数となるように不連続点での値を定義せよ.

$$(1) \frac{\sin x}{x} \quad (2) \frac{\tan x}{x} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right) \quad (3) \frac{\sin(3x+2)}{3x+2} \quad (4) x \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0)$$

$$(5) \frac{x^2-1}{x-1} \quad (6) \frac{x^3-1}{x} + \frac{x+1}{x} \quad (x \neq 0)$$

3 微分法

3.1 微分係数

定義 3.1 (微分と微分係数) 関数 $f(x)$ が $x = a$ において連続で、極限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

が存在するとき、 $f(x)$ は $x = a$ において微分可能 (differentiable) であるという。このとき有限確定した極限を $f'(a)$ と表記し、 $x = a$ における $f(x)$ の微分係数 (differential coefficient) と呼ぶ。

定義 3.2 (右微分係数, 左微分係数) 右極限による関数 $f(x)$ の微分係数を

$$f'(a+0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

と書き、右微分係数 (right differential coefficient) と呼ぶ。左極限による関数 $f(x)$ の微分係数を

$$f'(a-0) = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

と書き、左微分係数 (left differential coefficient) と呼ぶ。

注意 3.3 (微分係数の存在) $f'(a)$ が存在するとは、すなわち $f'(a+0)$, $f'(a-0)$ が存在し、かつ $f'(a+0) = f'(a-0)$ が成り立つことを意味する。

例 3.4 (微分係数の具体例) $f(x) = x^2$ の $x = a$ における微分係数を求める。まず

$$g(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

とおく。 $g(h)$ を計算すると

$$g(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

を得る。よって

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} g(h) = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a$$

により微分係数 $f'(a) = 2a$ が求まる。

例 3.5 (微分不可能な点の具体例) 関数 $f(x) = |x|$ は $x = 0$ において連続であるが、微分可能ではない。以下これを示す。まず

$$g(x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{|x+h| - |x|}{h}$$

とおく。 $x \geq 0, h > 0$ のとき

$$g(x, h) = \frac{|x+h| - |x|}{h} = \frac{x+h-x}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

である． $x \leq 0, h < 0$ のとき

$$g(x, h) = \frac{|x+h| - |x|}{h} = \frac{-(x+h) - (-x)}{h} = \frac{-h}{h} = -1$$

となる．これより

$$f'(+0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow +0} g(0, h) = 1,$$

$$f'(-0) = \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow -0} g(0, h) = -1$$

を得る．右微分係数と左微分係数は存在するがその値は異なる．よって $x = 0$ における微分係数 $f'(0)$ は存在しない． $f(x)$ は $x = 0$ において微分不可能である．

例 3.6 (微分不可能な点の具体例) 関数 $f(x) = |x(x-1)|$ は $x = 0, 1$ において連続であるが，微分可能ではない．なぜなら，

$$g(x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{|(x+h)(x+h-1)| - |x(x-1)|}{h}$$

より

$$g(0, h) = \frac{|h(h-1)|}{h} = \begin{cases} \frac{-h(h-1)}{h} = -h+1 & (0 < h < 1) & \rightarrow 1 & (h \rightarrow +0) \\ \frac{h(h-1)}{h} = h-1 & (h < 0) & \rightarrow -1 & (h \rightarrow -0) \end{cases}$$

となり $f'(+0) = 1, f'(-0) = -1$ を得る． $x = 0$ で微分不可能である．また

$$g(1, h) = \frac{|(h+1)h|}{h} = \begin{cases} \frac{(h+1)h}{h} = h+1 & (h > 0) & \rightarrow 1 & (h \rightarrow +0) \\ \frac{-(h+1)h}{h} = -h-1 & (h < 0) & \rightarrow -1 & (h \rightarrow -0) \end{cases}$$

となり $f'(1+0) = 1, f'(1-0) = -1$ を得る． $x = 1$ で微分不可能である．

3.2 導関数

定義 3.7 (導関数) 関数 $y = f(x)$ が連続関数であり，定義域内の任意の点において微分可能であるとする．このとき関数

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

が存在する． $f'(x)$ を $f(x)$ の導関数 (**derived function, derivative**) と呼ぶ．導関数はまた

$$\frac{d}{dx}y, \quad \frac{dy}{dx}, \quad y', \quad f'(x), \quad \frac{d}{dx}f(x), \quad \frac{df(x)}{dx}$$

という表記も用いる． $f(x)$ から導関数 $f'(x)$ を求めることを微分する (**differentiate**) という．

例 3.8 (導関数の計算例) 関数 $f(x) = x^2$ の導関数を求める．まず

$$g(x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

とおく． $g(x, h)$ を計算すると

$$g(x, h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2hx + h^2}{h} = 2x + h$$

を得る．これより

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} g(x, h) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x$$

となる．極限 $f'(x)$ は $-\infty < x < \infty$ の任意の点において有限確定である．よって導関数 $f'(x)$ が存在し $f'(x) = 2x$ が求まる．

3.3 導関数の計算

定理 3.9 (微分演算に関する性質) 関数 $f = f(x)$, $g = g(x)$ が微分可能なとき，次の関係が成り立つ：

- (1) (和の微分) $(f + g)' = f' + g'$.
- (2) (微分の線形性) $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$ (α, β : 定数).
- (3) (積の微分) $(fg)' = f'g + fg'$.
- (4) (商の微分) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ($g(x) \neq 0$).
- (5) (合成関数の微分) $y = f(g(x))$ のとき $y = f(z)$, $z = g(x)$ とおけば

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = f'(z) \frac{dz}{dx} = f'(g(x))g'(x).$$

この演算規則をチェインルール (**chain rule**) と呼ぶ．

- (6) (逆関数の微分) $y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$ のとき

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}, \quad \frac{d}{dy} f^{-1}(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

問 3.10 微分演算に関する性質を示せ．

(証明) (1) $F(x) = f(x) + g(x)$ とおく．定義に従い計算すると

$$\begin{aligned} (f + g)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(x) + g'(x) \end{aligned}$$

を得る．

(2) $F(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$ とおく．定義に従い計算すると

$$\begin{aligned} (f + g)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha f(x+h) + \beta g(x+h) - \alpha f(x) - \beta g(x)}{h} \\ &= \alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \beta \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \alpha f'(x) + \beta g'(x) \end{aligned}$$

を得る .

(3) $F(x) = f(x)g(x)$ とおく . 定義に従い計算すると

$$\begin{aligned}
 (fg)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))g(x+h) + f(x)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x+h) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) + f(x) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)
 \end{aligned}$$

を得る .

(4) $F(x) = f(x)/g(x)$ とおく . 定義に従い計算すると ,

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{f}{g}\right)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)/g(x+h) - f(x)/g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{h g(x+h)g(x)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(x+h) - f(x))g(x) - f(x)(g(x+h) - g(x))}{h g(x+h)g(x)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{g(x+h)g(x)} \\
 &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) - f(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h)g(x)} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}
 \end{aligned}$$

を得る .

(5) $F(x) = f(g(x))$ とおく . 定義に従い計算すると

$$\begin{aligned}
 (f(g(x)))' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x) + g(x+h) - g(x)) - f(g(x))}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x) + g(x+h) - g(x)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}
 \end{aligned}$$

を得る . ここで $\tilde{h} = g(x+h) - g(x)$ とおくと ,

$$\begin{aligned}
 (f(g(x)))' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g + \tilde{h}) - f(g)}{\tilde{h}} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g + \tilde{h}) - f(g)}{\tilde{h}} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}
 \end{aligned}$$

となる．ここで

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \tilde{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} (g(x+h) - g(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \times h \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} h \\ &= g'(x) \times 0 = 0\end{aligned}$$

が成り立つ．よって $h \rightarrow 0$ のとき $\tilde{h} \rightarrow 0$ である．以上より

$$(f(g(x)))' = \lim_{\tilde{h} \rightarrow 0} \frac{f(g+\tilde{h}) - f(g)}{\tilde{h}} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f'(g(x))g'(x).$$

を得る．

(6) $y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$ より

$$y = f(x) = f(f^{-1}(y))$$

となる． $y = f(f^{-1}(y))$ の両辺は y に関する関数である．両辺を y で微分すると

$$\begin{aligned}\frac{d}{dy} y &= f'(f^{-1}(y)) \frac{df^{-1}(y)}{dy} \\ 1 &= f'(x) \frac{dx}{dy} \\ 1 &= \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dy}\end{aligned}$$

を得る．よって

$$\frac{dx}{dy} = \frac{d}{dx} f^{-1}(y) = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

となる．

3.4 定数の微分

定理 3.11 (定数の微分)

$$\frac{d}{dx} c = 0 \quad (c : \text{定数})$$

問 3.12 これを示せ．

(証明) $y = f(x) = c$ とおき定義に従い計算すると，

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

を得る．

3.5 自然数べきのべき関数の微分

定理 3.13 (べき関数の微分)

$$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1} \quad (n : \text{自然数})$$

問 3.14 これを示せ .

(証明) $y = f(x) = x^n$ とおき定義に従い計算すると ,

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

を得る . ここで

$$\begin{aligned} (x+h)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k \\ &= x^n + n x^{n-1} h + \frac{1}{2} n(n-1) x^{n-2} h^2 + \cdots + n x h^{n-1} + h^n \\ &= x^n + n x^{n-1} h + h^2 \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-2} \end{aligned}$$

であることを用いると

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = n x^{n-1} + h \left\{ \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-2} \right\}$$

となる . $h \rightarrow 0$ のとき $n x^{n-1}$ の項は生き残り , その後ろの項は消える . よって

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = n x^{n-1}$$

を得る .

3.6 負べきのべき関数の微分

定理 3.15 (負べき関数の微分)

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{x^n} = \frac{d}{dx} x^{-n} = \frac{-n}{x^{n+1}} = -n x^{-n-1} \quad (n : \text{自然数})$$

問 3.16 これを示せ .

(証明) $y = f(x) = 1/x^n$ とおく . このとき

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \frac{1}{(x+h)^n} - \frac{1}{x^n} = \frac{x^n - (x+h)^n}{(x+h)^n x^n} \\ &= \frac{x^n - x^n - n x^{n-1} h - h^2 \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-2}}{(x+h)^n x^n} \\ &= -h \frac{n x^{n-1} + h \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-2}}{(x+h)^n x^n} \end{aligned}$$

となる．これを用いて

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1} + h \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^{k-2}}{(x+h)^n x^n} = - \frac{nx^{n-1} + 0}{(x+0)^n x^n} = \frac{-n}{x^{n+1}} \end{aligned}$$

を得る．

3.7 有理数べきのべき関数の微分

定理 3.17 (m 乗根関数の微分)

$$\frac{d}{dx} \sqrt[m]{x} = \frac{d}{dx} x^{\frac{1}{m}} = \frac{\sqrt[m]{x}}{m x} = \frac{1}{m} x^{\frac{1}{m}-1} \quad (m : \text{自然数})$$

問 3.18 これを示せ．

(証明) $y = f(x) = \sqrt[m]{x} = x^{\frac{1}{m}}$ とおく．このとき

$$f(x+h) - f(x) = (x+h)^{\frac{1}{m}} - x^{\frac{1}{m}}$$

である．ここで

$$\begin{aligned} a^m - b^m &= (a-b)(a^{m-1} + a^{m-2}b + a^{m-3}b^2 + \cdots + ab^{m-2} + b^{m-1}) \\ &= (a-b) \sum_{k=1}^m a^{m-k} b^{k-1} \\ \Rightarrow a-b &= \frac{a^m - b^m}{\sum_{k=1}^m a^{m-k} b^{k-1}} \end{aligned}$$

であることを用いる． $a = (x+h)^{\frac{1}{m}}$, $b = x^{\frac{1}{m}}$ とおくと

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \frac{\left((x+h)^{\frac{1}{m}}\right)^m - \left(x^{\frac{1}{m}}\right)^m}{\sum_{k=1}^m (x+h)^{\frac{m-k}{m}} x^{\frac{k-1}{m}}} = \frac{(x+h) - x}{\sum_{k=1}^m \left((x+h)^{m-k} x^{k-1}\right)^{\frac{1}{m}}} \\ &= \frac{h}{\sum_{k=1}^m \left((x+h)^{m-k} x^{k-1}\right)^{\frac{1}{m}}} \end{aligned}$$

を得る．よって

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sum_{k=1}^m \left((x+h)^{m-k} x^{k-1}\right)^{\frac{1}{m}}} \\ &= \frac{1}{\sum_{k=1}^m \left((x+0)^{m-k} x^{k-1}\right)^{\frac{1}{m}}} = \frac{1}{\sum_{k=1}^m x^{\frac{m-1}{m}}} = \frac{1}{m x^{\frac{m-1}{m}}} = \frac{1}{m} x^{\frac{1}{m}-1} \end{aligned}$$

となる．

3.8 対数関数の微分

定理 3.19 (対数関数の微分)

$$\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}$$

問 3.20 これを示せ .

(証明) $y = f(x) = \log x$ とおき定義に従い計算すると ,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) - \log(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\log(x+h) - \log(x)) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \log \frac{x+h}{x} = \lim_{h \rightarrow 0} \log \left(\frac{x+h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \log \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \log \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h} \frac{1}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{x} \log \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h}} \\ &= \frac{1}{x} \log \left\{ \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{h}} \right)^{\frac{x}{h}} \right\} = \frac{1}{x} \log \left\{ \lim_{z = \frac{x}{h} \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{z} \right)^z \right\} \\ &= \frac{1}{x} \log e = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

を得る .

3.9 指数関数の微分

定理 3.21 (指数関数の微分)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a^x &= (\log a) a^x \\ \frac{d}{dx} e^x &= e^x \end{aligned}$$

関数 e^x は微分演算 $\frac{d}{dx}$ に関して恒等的である .

問 3.22 これを示せ .

(証明) $f(x) = e^x$ とおく . このとき

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \cdot 1 = e^x$$

を得る . $f(x) = a^x$ とおく . このとき

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \quad (a^h = t + 1 \text{ とおく}) \\ &= a^x \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\log_a(t+1)} = a^x \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\log(t+1)/\log a}{t} \right)^{-1} = (\log a) a^x \lim_{t \rightarrow 0} \left(\log(1+t)^{\frac{1}{t}} \right)^{-1} \\ &= (\log a) a^x \lim_{z \rightarrow \infty} \left(\log \left(1 + \frac{1}{z} \right)^z \right)^{-1} = (\log a) a^x (\log e)^{-1} = (\log a) a^x \end{aligned}$$

を得る .

(別の証明) $y = f(x) = a^x$ とおく . このとき逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \log_a y = \frac{\log y}{\log a}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{\frac{1}{y}}{\log a} = \frac{1}{(\log a)y}$$

である . これと逆関数の微分公式より

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{1}{(\log a)y}} = (\log a)y = (\log a)a^x$$

を得る .

3.10 実数べきのべき関数の微分

定理 3.23 (べき関数の微分)

$$\frac{d}{dx} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R})$$

(証明) $(\log x)' = 1/x$ と $(e^x)' = e^x$ は証明済みである . これを用いて証明をする . このとき

$$y = f(x) = x^\alpha = (e^{\log x})^\alpha = e^{\alpha \log x}$$

と表されるのでこれを微分すると

$$y' = (e^{\alpha \log x})' = (e^{\alpha \log x}) \times (\alpha \log x)' = e^{\alpha \log x} \frac{\alpha}{x} = x^\alpha \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}$$

を得る .

3.11 三角関数の微分

定理 3.24 (三角関数の微分)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin x &= \cos x \\ \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x \\ \frac{d}{dx} \tan x &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

問 3.25 これを示せ .

(証明) $y = f(x) = \sin x$ とおく . 定義に従い計算すると ,

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

を得る．ここで

$$\begin{aligned}\sin(x+h) - \sin(x) &= \sin\left(x + \frac{h}{2} + \frac{h}{2}\right) - \sin\left(x + \frac{h}{2} - \frac{h}{2}\right) \\ &= \sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\cos\left(\frac{h}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right) \\ &\quad - \sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\cos\left(\frac{h}{2}\right) + \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right) \\ &= 2\cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)\end{aligned}$$

であることを用いると

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h/2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \times \lim_{\frac{h}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = \cos(x) \times 1 = \cos(x)\end{aligned}$$

を得る．

次に $y = f(x) = \cos x$ とおく．定義に従い計算すると，

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h}$$

を得る．ここで

$$\begin{aligned}\cos(x+h) - \cos(x) &= \cos\left(x + \frac{h}{2} + \frac{h}{2}\right) - \cos\left(x + \frac{h}{2} - \frac{h}{2}\right) \\ &= \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\cos\left(\frac{h}{2}\right) - \sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right) \\ &\quad - \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)\cos\left(\frac{h}{2}\right) - \sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right) \\ &= -2\sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)\end{aligned}$$

であることを用いると

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2\sin\left(x + \frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = -\lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h/2} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \times \lim_{\frac{h}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = -\sin(x) \times 1 = -\sin(x)\end{aligned}$$

を得る．

最後に $y = f(x) = \tan(x)$ を考える．このとき

$$y = f(x) = \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

であるから商の微分公式より

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{(\sin(x))' \cos(x) - \sin(x) (\cos(x))'}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{1}{\cos^2(x)}\end{aligned}$$

を得る．

3.12 逆三角関数の微分

定理 3.26 (逆三角関数の微分)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \operatorname{Sin}^{-1} x &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{Cos}^{-1} x &= \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{Tan}^{-1} x &= \frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

問 3.27 これを示せ .

(証明) $y = f(x) = \operatorname{Sin}^{-1}(x)$ とおく . 主値を考えているので値域は

$$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

である . このとき $f(x)$ の逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \sin(y), \quad \frac{dx}{dy} = (\sin(y))' = \cos(y)$$

である . ここで $\cos(y)$ を x の関数で表すことを考える . $\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1$ と $x = \sin(y)$ より

$$\cos(y) = \pm \sqrt{1 - \sin^2(y)} = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

となる . 符号を片方のみ採用する . $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$ より $\cos y \geq 0$ となるので , 上式の右辺も 0 以上でなければならない . よって

$$\cos y = \sqrt{1 - x^2}$$

である . 以上より

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos(y)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

を得る .

次に $y = f(x) = \operatorname{Cos}^{-1}(x)$ ($0 \leq y \leq \pi$) とおく . この逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \cos(y), \quad \frac{dx}{dy} = -\sin(y)$$

である . 主値 $0 \leq y \leq \pi$ に注意して $\sin(y)$ を x の関数で表わすと

$$\sin(y) = \sqrt{1 - \cos^2(y)} = \sqrt{1 - x^2}$$

である . ここで $\sin(y) \geq 0$ ($0 \leq y \leq \pi$) を用いた . 以上より

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{-\sin(y)} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

を得る .

最後に $y = f(x) = \text{Tan}^{-1}(x)$ を考える．この逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \tan y,$$
$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos^2 y} = \frac{\cos^2 y + \sin^2 y}{\cos^2 y} = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$$

となる．これより

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{1 + x^2}$$

を得る．

3.13 双曲線関数の微分

定理 3.28 (双曲線関数の微分)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sinh x &= \cosh x \\ \frac{d}{dx} \cosh x &= \sinh x \\ \frac{d}{dx} \tanh x &= \frac{1}{\cosh^2 x}\end{aligned}$$

問 3.29 これを示せ．

$y = f(x) = \sinh(x)$ とおく．このとき

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f'(x) &= \frac{d}{dx} \sinh(x) = \frac{d}{dx} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} e^x - \frac{d}{dx} e^{-x} \right) \\ &= \frac{1}{2} (e^x + e^{-x}) = \cosh(x)\end{aligned}$$

を得る．次に $y = f(x) = \cosh(x)$ とおく．このとき

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f'(x) &= \frac{d}{dx} \cosh(x) = \frac{d}{dx} \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} e^x + \frac{d}{dx} e^{-x} \right) \\ &= \frac{1}{2} (e^x - e^{-x}) = \sinh(x)\end{aligned}$$

を得る．最後に $y = f(x) = \tanh(x)$ とおく．このとき

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} = f'(x) &= \frac{d}{dx} \tanh(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} \right) = \frac{(\sinh x)' \cosh x - \sinh x (\cosh x)'}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}\end{aligned}$$

を得る．

3.14 逆双曲線関数の微分

定理 3.30 (逆双曲線関数の微分)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{Cosh}^{-1} x &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ \frac{d}{dx} \tanh^{-1} x &= \frac{1}{1 - x^2}\end{aligned}$$

問 3.31 これを示せ .

$y = f(x) = \sinh^{-1}(x)$ とおく . このとき逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \sinh(y), \quad \frac{dx}{dy} = \cosh(y)$$

である . ここで $\cosh(y)$ を x の関数で表わす . $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ より

$$\cosh y = \pm \sqrt{1 + \sinh^2 y} = \pm \sqrt{1 + x^2}$$

である . $e^{\pm y} \geq 0$ であり $\cosh y = (e^y + e^{-y})/2 \geq 1$ となることに考慮すると , 複合は正のみが採用される . よって $\cosh y = \sqrt{1 + x^2}$ となる . 以上より

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cosh y} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

を得る .

次に $y = f(x) = \operatorname{Cosh}^{-1} x \geq 0$ とおく . このとき逆関数とその微分は

$$x = f^{-1}(y) = \cosh y, \quad \frac{dx}{dy} = \sinh y$$

となる . ここで $\sinh(y)$ を x の関数で表わす . $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ より

$$\sinh y = \pm \sqrt{\cosh^2 y - 1} = \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

である . $y \geq 0$ のとき $\sinh y \geq 0$ であるから複合は正を採用する . よって $\sinh y = \sqrt{x^2 - 1}$ となる . 以上より

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\sinh y} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

を得る .

最後に $y = \tanh^{-1} x$ とおく . この逆関数とその微分は

$$\begin{aligned}x &= f^{-1}(y) = \tanh y, \\ \frac{dx}{dy} &= \frac{1}{\cosh^2 y} = \frac{\cosh^2 y - \sinh^2 y}{\cosh^2 y} = 1 - \left(\frac{\sinh y}{\cosh y}\right)^2 = 1 - \tanh^2 y = 1 - x^2\end{aligned}$$

となる . よって

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{1 - x^2}$$

を得る .

3.15 接線の方程式

定義 3.32 (接線) 関数 $y = f(x)$ のグラフ上の点 $P(a, f(a))$, $Q(a + h, f(a + h))$ を通る直線 l を考える . 極限 $h \rightarrow 0$ において直線 l が直線 L に近づくとする . このとき直線 L を関数 $f(x)$ の点 $x = a$ における接線 (tangent) と呼ぶ .

定理 3.33 (接線の方程式) 関数 $f(x)$ の点 $x = a$ における接線の方程式は

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

である .

(証明) 点 $(a, f(a))$ と $(a + h, f(a + h))$ を通る直線の方程式は

$$y = f(a) + \frac{f(a + h) - f(a)}{(a + h) - a}(x - a)$$

である . $h \rightarrow 0$ の極限をとると微分係数の定義より

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

を得る .

注意 3.34 (関数の線形近似) 接線の方程式は点 $x = a$ における関数 $f(x)$ の 1 次 (線形) 近似ともいう . ちなみに関数 $f(x)$ の $x = a$ における 0 次近似は $y = f(a)$ である .

例 3.35 (接線の方程式の具体例) 関数 $f(x) = x^3$ の点 $x = 2$ における接線の方程式は

$$y = 12x - 16$$

である .

3.16 曲線のパラメータ表示

定理 3.36 (パラメータ表示) $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$ のとき ,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\phi'(t)}{\psi'(t)}$$

が成り立つ .

3.17 ロピタルの定理

問 3.37 (ロピタルの定理) 次の極限をロピタルの定理を用いて求めよ .

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\log x)^3}{x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x^2 + x}\right)^{x^2}$$

3.18 演習 ~ 微分

問 3.38 (微分係数) 次の定義を述べよ .

- (1) 点 $x = a$ における関数 $f(x)$ の微分係数 $f'(a)$. (2) 関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$.

問 3.39 (微分の性質) 次の証明せよ . ただし , f, g は微分可能とする .

- (1) $(\alpha f(x) + \beta g(x))' = \alpha' f(x) + \beta g'(x)$ (2) $(fg)' = f'g + fg'$

問 3.40 (微分可能) 次の関数について (i) 関数 $f(x)$ のグラフを描け . (ii) $f(x)$ の微分不可能な点を述べよ . また , この点における右微分係数 , 左微分係数を求めよ . (iii) 微分可能な範囲で導関数 $f'(x)$ を求めよ . (iv) $f'(x)$ のグラフを描け .

- (1) $f(x) = x^2$ (2) $f(x) = |x|$ (3) $f(x) = |x - 1|$ (4) $f(x) = |x - x^2|$
 (5) $f(x) = |\log x| (x > 0)$

問 3.41 (初等関数の導関数) 次の関数の導関数を書け .

- (1) c (c : 定数) (2) $x^n (n \in \mathbb{N})$ (3) $\frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N})$ (4) $\sqrt[n]{x} (n \in \mathbb{N})$ (5) $x^\alpha (\alpha \in \mathbb{R})$
 (6) e^x (7) $a^x (a > 0)$ (8) $\log x$ (9) $\log_a x$ (10) $\sin x$ (11) $\cos x$ (12) $\tan x$
 (13) $\sin^{-1} x$ (14) $\cos^{-1} x$ (15) $\tan^{-1} x$ (16) $\sinh x$ (17) $\cosh x$ (18) $\tanh x$
 (19) $\sinh^{-1} x$ (20) $\tanh^{-1} x$ (21) $\text{Cosh}^{-1} x$

問 3.42 (導関数の導出) 次の証明せよ . ただし , c は定数 , n は自然数とする .

- (1) $\frac{d}{dx} c = 0$ (2) $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$ (3) $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^n} = \frac{-n}{x^{n+1}}$ (4) $\frac{d}{dx} \sqrt[n]{x} = \frac{\sqrt[n]{x}}{nx}$
 (5) $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ (6) $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$ (7) $\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x}$
 (8) $\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (9) $\frac{d}{dx} \cos^{-1} x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ (10) $\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}$
 (11) $\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x$ (12) $\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x$ (13) $\frac{d}{dx} \tanh x = \frac{1}{\cosh^2 x}$
 (14) $\frac{d}{dx} \sinh^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ (15) $\frac{d}{dx} \text{Cosh}^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ (16) $\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2}$
 (17) $\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}$ (18) $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ (19) $\frac{d}{dx} x^\alpha = \alpha x^{\alpha-1} (\alpha \in \mathbb{R})$

問 3.43 (微分の計算) 次の関数の導関数を求めよ .

- (1) $(x^2 - 1)(x^3 + 2)$ (2) $(3x^2 - x - 1)^4$ (3) $(x^3 + 2x + 1)^4$ (4) $(x - 2)^2(x + 2)$
 (5) $(x^2 + 1)^5(x^3 - 2)^3$ (6) $4x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} - 2x^{\frac{3}{2}}$ (7) $x^3(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$ (8) $\frac{x-2}{x^2+x+2}$ (9) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$
 (10) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-2)^2}$ (11) $\sqrt{x^2+8x+1}$ (12) $\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$ (13) $\sqrt[3]{\frac{x+2}{x^2+1}}$
 (14) $\sqrt[3]{\frac{x^2+1}{(x-1)^2}}$ (15) $\sin x^2$ (16) $\sin^3 4x$ (17) $x^3 \sin 4x$ (18) $x^2 \sin 2x$ (19) $\sin(2x^2 - 3x)$
 (20) $\frac{\sin x}{x^2+2}$ (21) $\cos x^2$ (22) $\cos(2x + 3x^2)$ (23) $\cos^3 x$ (24) $x^2 \cos 2x$ (25) $3 \cos 4x + 2 \sin 2x$
 (26) $\sin^{-1}(x^3 + 1)$ (27) $\sin^{-1} \sqrt{x}$ (28) $x\sqrt{1-x^2} + \sin^{-1} x$ (29) $\frac{1}{2} \left(x\sqrt{a^2-x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right)$
 (30) $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ (31) $\cos^{-1} x^2$ (32) $2 \cos^{-1} \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ (33) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{x} \right)$ (34) $\tan^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$
 (35) 2^x (36) $\frac{1}{x^2} + x^5 - e^x + 3$ (37) $e^{\sin x}$ (38) $\exp(\exp(x))$ (39) $\exp(\tan^{-1} x)$

$$(40) \exp\left(-\left(\frac{x-2}{5}\right)^2\right) \quad (41) \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma}\right) \quad (42) \log\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) \quad (43) \log\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$$

$$(44) \log(\log x) \quad (45) \sqrt{1+2\log x} \quad (46) x^x \quad (x > 0) \quad (47) e^{x^x} \quad (48) (\sin x)^{\cos x} \quad (49) (\log x)^x$$

問 3.44 (接線) 次の関数について (i) $f(x)$ のグラフを書け . (ii) $x = a$ における接線の方程式を求めよ . (iii) 接線のグラフを書け .

$$(1) f(x) = x^2 + 2x - 3, a = 2 \quad (2) f(x) = x^3, a = 2$$

$$(3) f(x) = \log(x^2 + 1), a = 1, a = 0, a = \sqrt{e-1} \quad (4) f(x) = x \log x, a = 1, a = e$$

$$(5) f(x) = \tan\left(2x - \frac{\pi}{2}\right), a = \frac{\pi}{3} \quad (6) f(x) = e^x \cosh x, a = \pi$$

$$(7) f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right), a = \frac{\pi}{3} \quad (8) f(x) = \text{Tan}^{-1} \frac{x^2}{2}, a = \sqrt{2}$$

問 3.45 (接線) 次の曲線 C の点 P における接線の方程式を求めよ .

$$(1) C: x = t^2 + 1, y = e^t; P(2, e) \quad (2) C: x = \log(t^3 + t), y = \text{Tan}^{-1}t; P\left(2, \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(3) C: x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t; P \text{ は } t \neq \frac{n\pi}{2} \quad (n \in \mathbb{Z}) \text{ の点}$$

問 3.46 (なめらかさ) 次の関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ は連続関数であるか述べてよ .

$$(1) f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \quad (2) f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

問 3.47 (増減) 次の関数の増減, 極値, 最大値, 最小値を調べグラフを描け .

$$(1) \frac{x^2-1}{x^2+1} \quad (2) x + \sqrt{1-x^2} \quad (3) x \log x \quad (4) x^{\frac{1}{x}}$$

問 3.48 (不等式) 次の不等式を示せ .

$$(1) \frac{x}{1+x} \leq \log(1+x) \quad (x \geq 0) \quad (2) 1+x \leq e^x \leq \frac{1}{1-x} \quad (x < 1)$$

$$(3) \frac{x}{1+x^2} < \text{Tan}^{-1}x < x \quad (x > 0) \quad (4) x - \sin x < \tan x - x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$$

3.19 高階導関数

定義 3.49 (高階導関数) 関数 $f'(x)$ が微分可能のとき, $f'(x)$ の導関数

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h}$$

を 2 階導関数 (second order derivative) という . このとき $f(x)$ は 2 回微分可能 (two times differentiable) と呼ぶ . 同様に $f(x)$ を n 回繰り返して微分した関数を n 階導関数 (n -th order derivative) といひ, $f^{(n)}(x)$ と書き表わす . 関数 $f^{(n)}(x)$ は

$$f^{(n)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x+h) - f^{(n-1)}(x)}{h} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

と再帰的に定義する . ただし $f^{(0)}(x) = f(x)$ とする . $f^{(n)}(x)$ が存在するとき $f(x)$ は n 回微分可能 (n times differentiable) という .

注意 3.50 (高階導関数) 高階導関数 $f^{(n)}(x)$ は関数 $y = f(x)$ に n 回微分演算 $\frac{d}{dx}$ を作用させたものであるから、記号の表記は次のように行う：

$$f^{(n)} = \underbrace{\frac{d}{dx} \frac{d}{dx} \cdots \frac{d}{dx}}_n f = \left(\frac{d}{dx} \right)^n f = \frac{d^n}{dx^n} f = \frac{d^n f}{dx^n} = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

例 3.51 (高階導関数の計算例) $y = x^\alpha$ の高階導関数を求める． α が自然数ではないとき，

$$\begin{aligned} y' &= \alpha x^{\alpha-1}, \\ y'' &= \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}, \\ y''' &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}, \\ &\vdots \\ y^{(n)} &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, \\ y^{(n+1)} &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)x^{\alpha-n-1} \\ &\vdots \end{aligned}$$

を得る．よって一般的に

$$y^{(n)} = \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!} x^{\alpha-n}$$

と表される．

定義 3.52 (階乗の拡張) $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して

$$\alpha! = \alpha(\alpha-1)!, \quad 0! = 1$$

と定義する．

例 3.53 (高階導関数の計算例) 自然数 n とする． x^n の高階導関数は

$$\begin{aligned} y &= x^n, \\ y' &= n x^{n-1}, \\ y'' &= n(n-1) x^{n-2}, \\ y''' &= n(n-1)(n-2) x^{n-3}, \\ &\vdots \\ y^{(n-1)} &= n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot x, \\ y^{(n)} &= n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1, \\ y^{(n+1)} &= 0, \\ y^{(n+2)} &= 0 \\ &\vdots \end{aligned}$$

より, 一般的に

$$y^{(k)} = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} & (k \leq n) \\ 0 & (k > n) \end{cases}$$

と表される.

例 3.54 (高階導関数の計算例) $y = e^{ax}$ の高階導関数を求める. 合成関数の微分を繰り返して

$$\begin{aligned} y &= e^{ax}, \\ y' &= a e^{ax}, \\ y'' &= a^2 e^{ax}, \\ y''' &= a^3 e^{ax}, \\ &\vdots \\ y^{(n)} &= a^n e^{ax} \end{aligned}$$

を得る.

例 3.55 (高階導関数の計算例)

$$\begin{aligned} y &= \sin x, \\ y' &= \cos x, \\ y'' &= -\sin x, \\ y''' &= -\cos x, \\ y^{(4)} &= \sin x, \\ &\dots \\ y^{(n)} &= \begin{cases} \sin x & (n = 4k) \\ \cos x & (n = 4k + 1) \\ -\sin x & (n = 4k + 2) \\ -\cos x & (n = 4k + 3) \end{cases} \\ y^{(n)} &= \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

問 3.56 (高階導関数の例) $y = \cos x, y = \sinh x, y = \cosh x$ の $y^{(n)}$ を求めよ.

例 3.57 (高階導関数の計算例)

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{1-x}, \\ y' &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2} \frac{(-1)}{\sqrt{1-x}}, \\ y'' &= -\frac{1}{2 \cdot 2} \frac{1}{\sqrt{(1-x)^3}} = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{-1}{2}\right) \frac{(-1)^2}{\sqrt{(1-x)^3}}, \\ y''' &= -\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 2} \frac{1}{\sqrt{(1-x)^5}} = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{-1}{2}\right) \left(\frac{-3}{2}\right) \frac{(-1)^3}{\sqrt{(1-x)^5}}, \end{aligned}$$

$$y^{(4)} = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \frac{1}{\sqrt{(1-x)^7}} = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{-1}{2}\right) \left(\frac{-3}{2}\right) \left(\frac{-5}{2}\right) \frac{(-1)^4}{\sqrt{(1-x)^7}},$$

$$\vdots$$

$$y^{(n)} = -\frac{(2n-3)!!}{2^n} \frac{1}{\sqrt{(1-x)^{2n-1}}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)!}{\left(\frac{1}{2}-n\right)!} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(1-x)^{2n-1}}}$$

定義 3.58 (階乗の拡張) 整数 n に対して $n!!$ を

$$n!! = n(n-2)!!, \quad 0!! = 1, \quad (-1)!! = 1$$

と定義する．すなわち奇数，偶数に対しては

$$(2n+1)!! = (2n+1)(2n-1)(2n-3)\cdots 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1,$$

$$(2n)!! = (2n)(2n-2)(2n-4)\cdots 8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 2$$

と表される．

問 3.59 (高階導関数) $f(x) = \log|x|$ の高階導関数を求めよ．

3.20 C^n 級関数

定理 3.60 (微分可能性と連続性) $f(x)$ が $x = a$ で微分可能なとき， $f(x)$ は $x = a$ で連続である．

(証明) 点 $x = a$ で微分が可能なので

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

が成り立つ．これより

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0$$

となる．ここで

$$\varepsilon(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \tag{5}$$

とおく．このとき

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

である．(5) 式を変形すると

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a)$$

となる．右辺を $x \rightarrow a$ の極限をとる．すると

$$\lim_{x \rightarrow a} (f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a)) = f'(a) \times 0 + 0 \times 0 = 0$$

である．よって左辺も 0 となるので

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

を得る．よって $f(x)$ は $x = a$ で連続である．

定義 3.61 (C^m 級関数) $f(x)$ が連続関数のとき $f(x)$ を C^0 級の関数という。関数 $f(x)$ が n 回微分可能であり、 $f^{(n)}(x)$ が連続関数であるとき、 $f(x)$ を n 回連続微分可能な関数といい、 C^n 級の関数という。また何回でも微分が可能な関数を無限回微分可能な関数といい、 C^∞ 級の関数という。

例 3.62 (C^m 級関数の具体例) 多項式関数、 $\sin x$ 、 e^x は C^∞ 級の関数である。

注意 3.63 (C^m 級関数の集合) C^m 級の関数全体の集合を C^m と書くとする。このとき

$$C^0 \subset C^1 \subset C^2 \subset \dots \subset C^n \subset \dots \subset C^\infty$$

が成り立つ。

例 3.64 (C^m 級関数の具体例)

$$C^0 \ni f_1(x) = |x|, \quad C^1 \ni f_2(x) = \begin{cases} -x^2 & (x \geq 0) \\ x^2 & (x \leq 0) \end{cases} \quad C^2 \ni f_3(x) = |x^3|$$

問 3.65 (C^m 級関数) 次の関数はどの C^n 級に含まれるか述べよ。

$$(1) f(x) = 2x^3 + 3x + 5$$

$$(2) f(x) = \tan^{-1}(x)$$

3.21 演習 ~ 高階導関数

問 3.66 (高階導関数) 次の関数の高階導関数を求めよ。

- (1) e^x (2) e^{2x} (3) e^{-2x} (4) $\sinh x$ (5) $\cosh x$ (6) $\sin x$ (7) $\cos x$ (8) x^n ($n \in \mathbb{N}$)
 (9) x^α ($\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \notin \mathbb{N}$) (10) \sqrt{x} (11) $(1+x)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \notin \mathbb{N}$) (12) $\sqrt{1-x}$ (13) $\log|x|$
 (14) $\log(1-x)$

問 3.67 (高階導関数) 次の関数の 3 階までの導関数を求めそのグラフを描け。

- (1) \sqrt{x} (2) $\log|x|$ (3) $\cosh x$

問 3.68 (なめらかさ) 次の関数は不連続関数、 C^0 級関数、 C^1 級関数、 C^2 級関数、 \dots 、 C^∞ 級関数のうちどれか答えよ (ヒント: すべての高階導関数を求めグラフを描く。)

- (1) $2x^3 + 3x + 5$ (2) $3x^4 + 2x^2 + 4x + 5$ (3) x^n (4) n 次多項式 (5) e^x
 (6) a^x ($a > 0$) (7) $\sin x$ (8) $\cos x$ (9) $\tan^{-1}x$ (10) $|x|$ (11) $|x|$ (12) $|x^3|$
 (13) $\begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$ (14) $\begin{cases} -x^2 & (x \geq 0) \\ x^2 & (x \leq 0) \end{cases}$ (15) $\begin{cases} -x^3 & (x < 0) \\ x^2 & (x \geq 0) \end{cases}$ (16) $\begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$

問 3.69 (ライプニッツ則) $f(x), g(x) \in C^n$ に対して次の関係式が成立することを示せ。

$$\frac{d^n}{dx^n}(fg) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^{n-k}f}{dx^{n-k}} \frac{d^k g}{dx^k}$$

問 3.70 (ライプニッツ則) 次の関数の高階導関数をライプニッツ則を用いて求めよ。

- (1) $(x^2 + x) \cos x$ (2) $x^2 \cos 2x$ (3) $x^2 e^{2x}$ (4) $3^x(x^2 + x)$ (5) $\frac{e^x}{1-x}$ (6) $\frac{1}{x^2 - x - 2}$

問 3.71 (合成関数の高階導関数) 次の関係式が成立すること示せ .

$$(1) z = g(y), y = f(x) \text{ に対して } \frac{d^2z}{dx^2} = \frac{d^2z}{dy^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{dz}{dy} \frac{d^2y}{dx^2}$$

$$(2) y = f(x), x = f^{-1}(y) \text{ に対して } \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{-\frac{d^2y}{dx^2}}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^3}$$

問 3.72 (凹凸, 変曲点) 次の関数の増減, 極値, 凹凸, 変曲点を調べグラフを描け .

$$(1) x^3 \quad (2) 2x^2\sqrt{x} - 5x^2 \quad (3) \frac{\log x}{x}$$

問 3.73 (高階導関数) 次の表の空いている個所を埋めよ .

$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$	$f^{(n)}(x)$
c (定数)	0	0	0	0
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$	$\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$	$\frac{\alpha!}{(\alpha-n)!}x^{\alpha-n}$ ($n \leq \alpha \in \mathbb{N}$) 0 ($n < \alpha \in \mathbb{N}$) $\frac{\alpha!}{(\alpha-n)!}x^{\alpha-n}$ ($\alpha \notin \mathbb{N}$)
$\log x$	$\frac{1}{x}$			
$\log_a x$	$\frac{1}{(\log a)x}$			
e^x	e^x	e^x	e^x	e^x
a^x	$(\log a)a^x$	$(\log a)^2 a^x$	$(\log a)^3 a^x$	$(\log a)^n a^x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$\sin x$	
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$			
$\text{Sin}^{-1}x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$			
$\text{Cos}^{-1}x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$			
$\text{Tan}^{-1}x$	$\frac{1}{1+x^2}$			
$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh x$	$\cosh x$	
$\cosh x$	$\sinh x$	$\cosh x$	$\sinh x$	
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$			
$\sinh^{-1}x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$			
$\text{Cosh}^{-1}x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$			
$\tanh^{-1}x$	$\frac{1}{1-x^2}$			

4 数列

4.1 数列

定義 4.1 (数列) 数列 (sequence) とは数を順番に並べたものであり,

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

$$= \{a_n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$$

$$= \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a_n\}$$

と書き表す． n 番目の数を第 n 項と呼ぶ．第 n 項を n に関する式で書き下したものを一般項 (general term) と呼ぶ．第 n 項，第 $n+1$ 項， \dots ，第 $n+k$ 項の間の関係を書き下した式を漸化式 (recurrence relation) と呼ぶ．

例 4.2 (数列の一般項と漸化式の具体例)

$$\{a_n\} = 1, 2, 3, 4, 5, \dots \quad \text{一般項: } a_n = n, \quad \text{漸化式: } a_{n+1} - a_n = 1. \quad (6)$$

$$\{a_n\} = 1, 4, 7, 10, 13, \dots \quad \text{一般項: } a_n = 3n - 2, \quad \text{漸化式: } a_{n+1} - a_n = 3. \quad (7)$$

$$\{a_n\} = 2, 4, 8, 16, 32, \dots \quad \text{一般項: } a_n = 2^n, \quad \text{漸化式: } a_{n+1} = 2a_n. \quad (8)$$

数列についていくつか種類をあげる．

定義 4.3 (等差数列) 数列 $\{a_n\}$ の隣り合う項の差が一定の数列を等差数列 (arithmetical progression sequence) と呼ぶ．すなわち，漸化式と一般項とがそれぞれ

$$a_{n+1} - a_n = a, \quad a_n = a n + b$$

と表される数列を指す．

定義 4.4 (等比数列) 数列 $\{a_n\}$ の隣り合う項の比が一定の数列を等比数列 (geometrical progression sequence) と呼ぶ．すなわち，漸化式と一般項とがそれぞれ

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r, \quad a_n = a r^{n-1}$$

と表される数列を指す．

例 4.5 (等差数列と等比数列の具体例) 数列 (6) は $a_{n+1} - a_n = 1$ をみたすので等差数列である．数列 (7) は $a_{n+1} - a_n = 3$ をみたすので等差数列である．数列 (8) は $a_{n+1}/a_n = 2$ をみたすので等比数列である．

4.2 数列の極限

数列 $\{a_n\}$ が

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \quad (9)$$

と与えられたとする．この数列 $\{a_n\}$ は n が限りなく大きくなるにつれて 0 にどんどんと近づいて行く．このことを数学的には，数列 $\{a_n\}$ は極限 (limit) が存在し 0 に収束する (convergent)，という．一般的には次のように表現する．

定義 4.6 (数列の極限)

n が限りなく大きくなるにつれて，

a_n は限りなくある確定した有限値 a に近づいて行く．

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$\Leftrightarrow a_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\Leftrightarrow a_n$ の極限は a である．

$\Leftrightarrow a_n$ は a に収束する．

収束しない場合を発散する (divergent) という .

注意 4.7 (数列の極限に関する注意) 数列 (9) は $a_n = 1/n > 0$ であるので , a_n がいかに 0 に近づいたとしても , 決して 0 になることはない . $a_n \neq 0$ である . $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ の意味はあくまでも , 数列 a_n は 0 に近づいて行く , という意味である .

例 4.8 (負べきで表される数列の極限) 次の一般項をもつ数列をそれぞれ考える :

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad a_n = \frac{1}{n^2}, \quad a_n = \frac{1}{n^3}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{1}{n^p}, \quad \dots$$

すべての数列に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ である . これは標語的に書くと $a_\infty = \frac{1}{\infty} = 0$ である . このとき数列は有限確定である .

4.3 ϵ 論法

定義 4.9 (数列の極限) 数列 $\{a_n\}$ と実数 α が次の条件 (i) をみたすとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

と表記する .

(i) 任意の正の数 ϵ に対して , $n \geq N$ のとき $|a_n - \alpha| < \epsilon$ をみたす自然数 N が存在する .

例 4.10 (数列の極限の証明の例) 数列 $a_n = \frac{1}{n}$ の極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

の証明をする . 任意の $\epsilon > 0$ に対して自然数 N を $N > \frac{1}{\epsilon}$ となるように選ぶ . このとき $n \geq N$ ならば

$$0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$$

となるので

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| \leq \frac{1}{N} < \epsilon$$

より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

を得る .

問 4.11 (数列の極限) 数列 $\{a_n\}$ が

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

をみたすとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = \alpha$$

となることを示せ .

4.4 発散する数列のいろいろ

例 4.12 (プラス無限大に無限確定な数列)

$$\{a_n\} = 1, 2, 3, \dots, n, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty.$$

a_n はプラス無限大 (∞) に発散する. a_n は無限確定である.

例 4.13 (マイナス無限大に無限確定な数列)

$$\{a_n\} = -1, -2, -3, \dots, -n, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty.$$

a_n はマイナス無限大 ($-\infty$) に発散する. a_n は無限確定である.

例 4.14 (有限不確定な数列)

$$\{a_n\} = 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} \quad : \text{発散.}$$

有限な値に確定しないので a_n は発散する. $-1 \leq a_n \leq 1$ が成立している. a_n は有限の範囲内に押さえられ振動的なふるまいをする. a_n は有限不確定である.

例 4.15 (無限不確定な数列)

$$\{a_n\} = 1, -2, 3, -4, \dots, (-1)^{n-1}n, \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1}n \quad : \text{発散.}$$

a_n は有限な値に確定しない. $|a_n|$ は増大して行く. ゆえに a_n は無限不確定である.

4.5 不定形, 有限確定, 無限確定

注意 4.16 (不定形) 四則演算と極限の操作は一般に交換可能ではない. 極限操作をし不定形

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty, \quad \infty \cdot 0, \quad 0^0, \quad \infty^0, \quad 1^\infty$$

と呼ばれる形になるときは注意が必要である. このままではまだ有限確定とも無限確定とも分らない. もしこの形のになるときは式変形をした後に極限操作を行う. 極限が有限確定または無限確定

$$\begin{array}{ccccc} \frac{0}{\infty} = 0, & \frac{1}{\infty} = 0, & \frac{1}{0} = \infty, & \frac{\infty}{1} = \infty, & \frac{\infty}{0} = \infty, \\ 0 + \infty = \infty, & 1 + \infty = \infty, & \infty + \infty = \infty, & 1 \cdot \infty = \infty, & \infty \cdot \infty = \infty \end{array}$$

するように計算方法を工夫する.

4.6 収束するときにかぎり四則演算と極限は可換

次の定理はある条件の下では方程式の項の移行が可能であることを意味する。

定理 4.17 (数列の極限に関する定理)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

一般には極限操作と四則演算は交換可能ではないがある条件の下では可能である。次の定理はそれを保証する。

定理 4.18 (数列の極限に関する定理) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ に関して極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

が存在するとき，次の関係式が成り立つ：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a + b. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n + \beta b_n) &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha a + \beta b. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) &= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \right) = ab. \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0 \text{ のとき}). \end{aligned}$$

ただし α, β は定数とする。

4.7 収束する数列のいろいろ

例 4.19 (有理式で表される数列の極限) 一般項が

$$a_n = \frac{2n^2 + 1}{3n^2 + 5n - 1}$$

により与えられる数列を考える。定理を適用して計算を試みる。分子分母の極限をとり，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{3n^2 + 5n - 1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (2n^2 + 1)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^2 + 5n - 1)} = \frac{\infty}{\infty}. \quad \text{不確定}$$

を得るがこれは誤りである。そもそも分子分母はそれぞれ発散するので定理は適用不可である。あらためて計算を行なうと，

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{3n^2 + 5n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n^2} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{5}{n} - \frac{1}{n^2} \right)} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (2) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (3) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)} = \frac{2 + 0}{3 + 0 - 0} = \frac{2}{3} \quad \text{有限確定} \end{aligned}$$

となる．今回は有限確定となり極限が求まる．計算の途中においては，定理が適用可能であるかの判断は難しい．最終形まで計算した結果が有限確定または無限確定であれば，途中の計算も定理が適用可能であることが多い．有理式で表される数列の極限は，有理式の最大次数のべきで分子分母を割った後に極限をとればよい．

例 4.20 (有理式で表される数列の極限) 一般項が

$$a_n = \frac{n^2 + 5n + 1}{n + 2}$$

で与えられる数列を考える．式を変形して極限

$$a_n = \frac{n^2 + 5n + 1}{n + 2} = \frac{n + 5/n + 1/n^2}{1 + 2/n} \rightarrow \frac{\infty}{1} = \infty \quad \text{無限確定}$$

が求まる．

例 4.21 (有理式で表される数列の極限) 一般項が

$$a_n = \frac{n + 4}{n^2 - 3n + 1}$$

である数列の極限を考える．式を変形して極限

$$a_n = \frac{n + 4}{n^2 - 3n + 1} = \frac{1/n + 4/n^2}{1 - 3/n + 1/n^2} \rightarrow \frac{0 + 0}{1 - 0 + 0} = \frac{0}{1} = 0 \quad \text{有限確定}$$

が求まる．

例 4.22 (根号を含む数列の極限) 一般項が

$$a_n = \frac{\sqrt{n}}{n + 3}$$

で与えられる数列の極限を考える．式を変形して極限

$$a_n = \frac{\sqrt{n}}{n + 3} = \frac{\sqrt{n/n^2}}{1 + 3/n} = \frac{\sqrt{1/n}}{1 + 3/n} \rightarrow \frac{0}{1 + 0} = \frac{0}{1} = 0$$

が求まる．

4.8 等比数列の極限

例 4.23 (等比数列の極限) 等比数列 $a_n = r^n$ ($r > 0$) の極限を考える．(i) $r > 1$, (ii) $r = 1$, (iii) $r < 1$ の場合に分けて議論する．まず，(i) $r = 1$ のとき，常に $a_n = 1$ である．極限は 1 である．つぎに，(iii) $r < 1$ のとき， $r = 1 + h$ ($h < 0$) とおく．このとき $r < 1$ をみたく． a_n を h を用いて書き下すと

$$a_n = (1 + h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} h^k$$

を得る．ここで $\binom{n}{k}$ は二項係数 (binomial coefficient) であり，

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

と定義する． $n!$ は階乗 (factorial number) であり，

$$n! = n \times (n-1)!, \quad 0! = 1$$

と再帰的に定義する． a_n をあらためて書き直すと

$$a_n = (1 + nh) + \left(\frac{n(n-1)}{2} h^2 + \dots + n h^{n-1} + h^n \right)$$

となる．第三項以降を足したものは正となるので，

$$a_n > 1 + nh$$

を得る． $n \rightarrow \infty$ のとき $1 + nh \rightarrow \infty$ より $a_n \rightarrow \infty$ を得る．最後に，(i) $r < 1$ のときを考える． $h > 0$ を用いて r を $r = 1/(1+h)$ と置き換える．このとき $r < 1$ をみたく． h を用いて a_n を書き下すと，

$$a_n = \frac{1}{(1+h)^n} = \frac{1}{(1+nh) + \left(\frac{n(n-1)}{2} h^2 + \dots + h^n \right)} < \frac{1}{1+nh}$$

を得る．不等式

$$0 < a_n < \frac{1}{1+nh}$$

が成立する． $n \rightarrow \infty$ のとき $1/(1+nh) \rightarrow 0$ であるから，はさみうちの定理より $a_n \rightarrow 0$ を得る．以上をまとめると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & (r < 1) \\ 1 & (r = 1) \\ \infty & (r > 1) \end{cases}$$

が求まる．

例 4.24 (極限) 漸化式 $a_{n+1} = p a_n + q$ で与えられる数列の一般項は

$$a_n = \begin{cases} p^{n-1} \left(a_1 - \frac{q}{1-p} + \frac{a}{1-p} \right) & (p \neq 1) \\ (n-1)q + a_1 & (p = 1) \end{cases}$$

と表され，その極限は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \begin{cases} \infty & (|p| \geq 1) \\ 0 & (|p| < 1) \end{cases}$$

となる．

例 4.25 (極限) 漸化式 $a_{n+2} = 2p a_{n+1} + q a_n$ により与えられる数列の一般項は

$$a_n = c_1 \lambda_1^{n-1} + c_2 \lambda_2^{n-1}$$

$$\lambda_1 = p + \sqrt{p^2 + q}, \quad \lambda_2 = p - \sqrt{p^2 + q}, \quad c_1 = \frac{a_1 \lambda_2 - a_2}{-2\sqrt{p^2 + q}}, \quad c_2 = \frac{a_2 - a_1 \lambda_1}{-2\sqrt{p^2 + q}}$$

と表される．よって， $|\lambda_1| < 1$ かつ $|\lambda_2| < 1$ のとき a_n は 0 に収束する．それ以外は発散する．

4.9 はさみうちの定理

定理 4.26 (はさみうちの定理) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ が

$$a_n \leq c_n \leq b_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

をみたすとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

ならば,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$$

が成り立つ.

4.10 数列の速さ

注意 4.27 (数列の速さ)

$$n! \gg e^n \gg n^m \gg n^2 \gg n \gg \sqrt{n} \gg \sqrt[3]{n} \gg \sqrt[m]{n} \gg \log n$$

4.11 ネピア数

公式 4.28 (ネピア数)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

この定数 e をネピア数 (Napier's number) という.

4.12 数列の有界性と単調性

定義 4.29 (有界数列) 数列 $\{a_n\}$ に対して次の性質を定義する.

- $a_n \leq M$ をみたすとき, 数列 $\{a_n\}$ は上に有界 (bounded from above) であるという. M を上界 (upper bound) と呼ぶ.
- $m \leq a_n$ をみたすとき, 数列 $\{a_n\}$ は下に有界 (bounded from below) であるという. m を下界 (lower bound) と呼ぶ.
- $m \leq a_n \leq M$ をみたすとき, 数列 $\{a_n\}$ は有界 (bounded) であるという.

有界な数列を有界数列 (bounded sequence) と呼ぶ.

例 4.30 (有界な数列の具体例) $a_n = (-1)^{n-1}$ は $-1 \leq a_n \leq 1$ をみたすので有界である.

定義 4.31 (単調数列) 数列 $\{a_n\}$ に対して次の性質を定義する.

- $a_n < a_{n+1}$ をみたすとき, 数列 $\{a_n\}$ は単調増加 (monotonic increasing) であるという.

- $a_n \leq a_{n+1}$ をみたすとき，数列 $\{a_n\}$ は広義の単調増加 (monotonic increasing in the wider sense) であるという。
- $a_n > a_{n+1}$ をみたすとき，数列 $\{a_n\}$ は単調減少 (monotonic decreasing) であるという。
- $a_n \geq a_{n+1}$ をみたすとき，数列 $\{a_n\}$ は広義の単調減少 (monotonic decreasing in the wider sense) であるという。

単調増加もしくは単調減少な数列を総称して単調数列 (monotonic sequence) と呼ぶ。

定理 4.32 (有界な単調数列の収束性) 有界な広義の単調数列は収束する。

例 4.33 (有界な単調数列の具体例) 数列

$$a_n = \frac{2n-3}{5n+1}$$

を考える。

$$a_{n+1} - a_n = \frac{17}{(5n+6)(5n+1)} > 0 \quad \Rightarrow \quad a_n < a_{n+1}$$

をみたすので a_n は単調増加である。初項 $a_1 = -1/6$ は下界となる。上界は

$$\frac{2}{5} - a_n = \frac{17}{5(5n+1)} > 0 \quad \Rightarrow \quad a_n < \frac{2}{5}$$

により求まる。 $-1/6 \leq a_n < 2/5$ となるので a_n は有界である。定理より a_n は収束する。実際，極限を求めると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-3}{5n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-3/n}{5+1/n} = \frac{2-0}{5+0} = \frac{2}{5}$$

と得られる。

4.13 演習 ~ 数列

問 4.34 (数列の極限) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ の定義を述べよ。

問 4.35 (数列) 次の数列について (i) 概形を書け。(ii) 一般項を表せ。(iii) 極限を求めよ。

- (1) $1, 3, 9, 27, 81, 243, \dots$ (2) $2, 4, 8, 16, 32, 64, \dots$ (3) $3, 7, 11, 15, 19, 23, \dots$ (4) $1, \frac{1}{2}, \frac{3}{7}, \frac{2}{5}, \frac{5}{13}, \frac{3}{8}, \dots$
 (5) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{11}, \frac{1}{14}, \dots$ (6) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots$ (7) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{1}{11}, \frac{1}{14}, \dots$ (8) $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \frac{1}{11}, \dots$
 (9) $\frac{1}{3}, \frac{5}{9}, \frac{5}{7}, \frac{17}{21}, \frac{13}{15}, \frac{37}{41}, \dots$ (10) $\frac{1}{3}, \frac{3}{4}, 1, \frac{6}{7}, \frac{9}{8}, \dots$ (11) $1, \frac{3}{4}, \frac{5}{7}, \frac{7}{10}, \frac{9}{13}, \frac{11}{16}, \dots$
 (12) $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{7}, \frac{1}{10}, \frac{1}{13}, \frac{1}{16}, \dots$ (13) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots$

問 4.36 (数列) 次の一般項で定義される数列について (i) 概形を書け。(ii) 有限確定，有限不確定，無限確定，無限不確定のいずれであるか答えよ。

- (1) $a_n = n$ (2) $a_n = -n$ (3) $a_n = (-1)^{n-1}$ (4) $a_n = (-1)^{n-1}n$ (5) $a_n = (-1)^n 2^{-n}$
 (6) $a_n = \frac{1}{n}$ (7) $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$

問 4.37 (等比数列) 等比数列 $a_n = r^n$ ($0 < r < 1$) の極限が 0 になることを証明せよ .

問 4.38 (数列の極限) 次の極限值を求めよ .

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+5}{1-2n} \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+5n-3}{n^2+3n} \quad (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+3n-1}{n-2} \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+7n-4}{n^2+n+1} \\
 (5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)(n-4)}{(n-1)(n-2)} \quad (6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^4+3n^2}{n^2+2n-3} \quad (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n)^4}{(1+2n^2)^2} \quad (8) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1}-1}{n} \\
 (9) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+2}}{3n-1} \quad (10) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n+2^n}{3^n} \quad (11) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n-1}}{1+2^n} \quad (12) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\
 (13) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \quad (14) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)^n \quad (15) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \\
 (16) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1+\frac{\alpha}{n}\right)^n \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \quad (17) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1-\frac{1}{6n}\right)^{-3n} \quad (18) \lim_{n \rightarrow \infty} n \log \left(1+\frac{1}{n}\right)
 \end{aligned}$$

問 4.39 (数列の性質) 数列 (1)–(3) について次の問い (i)–(iv) に答えよ .

$$\begin{aligned}
 (1) a_n = \frac{n+1}{2^n} \quad (2) a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{a_n+1} \quad (3) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{3a_n+4}{2a_n+3} \\
 (i) \text{ 数列 } \{a_n\} \text{ の概形を書け .} \\
 (ii) \text{ 数列 } \{a_n\} \text{ は単調数列 (単調減少または単調増加) であることを示せ .} \\
 (iii) \text{ 数列 } \{a_n\} \text{ は (上または下に) 有界であることを示せ .} \\
 (iv) \text{ 極限 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ を求めよ .}
 \end{aligned}$$

問 4.40 (数列の性質) 次の数列 A の $\sup A, \inf A, \max A, \min A$ を求めよ .

$$\begin{aligned}
 (1) A = \{(-1)^n \mid n \in \mathbb{N}\} \quad (2) A = \{\frac{1}{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} \quad (3) A = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \\
 (4) A = \{\frac{1}{n} - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}
 \end{aligned}$$

4.14 級数

級数 (series) とは数列 $\{a_n\}$ の和である . 式では

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots \tag{10}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum a_n \tag{11}$$

と書き表す . 加法 (足し算) は有限回の演算においてのみ定義されているので , 式 (10) は形式的な和である . 厳密に級数を定義するには次のように考える . まず第 n 項までの有限和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

を考える . これを第 n 部分和 (the n -th partial sum) と呼ぶ . S_n に関する数列

$$\{S_n\} = S_1, S_2, \cdots, S_n$$

を考える . 数列 $\{S_n\}$ の極限

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

が存在したとする . このとき級数 $\sum a_n$ は存在し , その値は

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

で与えられると定義する．極限 S が存在するとき級数 $\sum a_n$ は収束すると呼ぶ．極限 S が存在しない場合は級数 $\sum a_n$ は発散すると呼ぶ．

定義 4.41 (級数) 数列 $\{a_n\}$ の和 $\sum a_n$ を級数 (series) と呼び，その値は

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

で定義する．この極限が存在するとき級数 $\sum a_n$ は収束する (convergent) といい，収束しない場合を級数 $\sum a_n$ は発散する (divergent) という．

例 4.42 (調和級数) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ を考える．部分 and $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ は

$$S_1 = 1, \quad S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}, \quad S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{50}{24},$$

$$S_5 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{255}{120}, \quad \dots$$

となる．数列 $\{S_n\}$ は発散する．

例 4.43 (級数の計算) 級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$$

を考える．この部分 and は

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

である．よって，級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1$$

と求まる．

例 4.44 (級数の計算) 級数

$$S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n}$$

を考える．この部分 and は

$$S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2 - k} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{n}$$

である．よって，級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1$$

と求まる．

例 4.45 (級数の計算) 級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$$

を考える．この部分積和は

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + 3k + 2} = - \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} - \frac{k+1}{k+2} \right) \\ &= - \left\{ \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{4} \right) + \cdots + \left(\frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n+2} \right) \right\} = -\frac{1}{2} + \frac{n+1}{n+2} \end{aligned}$$

である．よって，級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} + \frac{n+1}{n+2} \right) = -\frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+1/n}{1+2/n} \right) = -\frac{1}{2} + \frac{1+0}{1+0} = \frac{1}{2}$$

と求まる．

4.15 収束するときにかぎり極限と四則演算は可換

定理 4.46 (級数の収束) $\sum a_n, \sum b_n$ が収束するとき， $\sum(\alpha a_n + \beta b_n)$ もまた収束する．ただし α, β は定数とする．このとき

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

が成り立つ．

注意 4.47 (順番の入れ替え) 定理 4.46 は級数が収束するとき限り，各項を足し合わせる順番を入れ替えてもよいことを意味する．発散する場合は足し算の順番を入れ替えることはできない．

例 4.48 (無限級数の結合則) 数列 $a_n = (-1)^{n-1}$ の級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ を考える．すなわち

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

である．足し算の順を入れ替えると

$$\begin{aligned} S &= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \cdots \\ &= 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots = 0 \end{aligned}$$

となる．また別の順で足し合わせると

$$\begin{aligned} S &= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \cdots \\ &= 1 + 0 + 0 + 0 + \cdots = 1 \end{aligned}$$

となる．また，

$$\begin{aligned} S &= +1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + \cdots \\ S - 1 &= -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots \end{aligned}$$

の2式を足し合わせると $2S - 1 = 0$ となり， $S = 1/2$ となる．これらは矛盾する．どこが誤りであろうか？有限の項の和の常識は無限の項の和には通用しない．この場合の間違いは足し算の順を変えたことである．この例では結合則が成り立たない．定義 4.41 に従えば級数 S は発散である．

問 4.49 (順番の入れ換え) 次の計算は誤りである．どこが間違っているか考えよ．

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ (-1)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\} \quad (n = 2k, n = 2k + 1 \text{ として偶奇に分ける}) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ (-1)^{2k-1} + (-1)^{2k} + \left(\frac{1}{2}\right)^{2k-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} \right\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ -1 + 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^k + \left(\frac{1}{4}\right)^k \right\} \\ &= \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{3}{2} \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

4.16 等比級数

例 4.50 (等比級数) 等比数列 $\{a_n = ar^{n-1}\}$ の無限和を等比級数 (geometrical progression series) と呼び，

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

と書き表す．等比級数は

$$S = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & (|r| < 1) \\ \text{発散} & (|r| \geq 1) \end{cases}$$

となる．

(証明) 第 n 部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a(1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1})$$

を考える． $r = 1$ のとき，

$$S_n = a(1 + 1 + \cdots + 1) = an$$

となる．つぎに $r \neq 1$ のとき，等式

$$1 - r^n = (1 - r)(1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1})$$

を用いると S_n は

$$S_n = a \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

と書ける．以上より

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} an & (r = 1) \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} & (r \neq 1) \end{cases} = \begin{cases} \pm\infty & (r = 1) \\ \frac{a}{1 - r} & (-1 < r < 1) \\ \text{不確定} & (r \leq -1) \end{cases}$$

となる．ただし無限大の符号は a の符号 $\text{sgn}(a) = a/|a|$ で決まる．証明終り．

問 4.51 (1 を根にもつ多項式の因数分解) 次の等式を示せ .

$$1 - r^n = (1 - r)(1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1}).$$

注意 4.52 (初項が異なる級数) 級数が

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} ar^n$$

と定義されるとき値を考える . 部分和は

$$S_n = \sum_{k=0}^n ar^k = a(1 + r + r^2 + \cdots + r^n) = a \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

となるから , 結局級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} = \begin{cases} \frac{a}{1-r} & (|r| < 1) \\ \text{発散} & (|r| \geq 1) \end{cases}$$

と得られる .

注意 4.53 (等比級数の有理式表現) $|r| < 1$ のとき

$$\frac{1}{1-r} = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots$$

となる . この式は 1 を $1-r$ で割ることで導出される . すなわち ,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-r} &= 1 + \frac{r}{1-r} \\ &= 1 + r + \frac{r^2}{1-r} \\ &= 1 + r + r^2 + \frac{r^3}{1-r} \\ &= 1 + r + r^2 + r^3 + \frac{r^4}{1-r} \\ &= 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots \end{aligned}$$

のように低次項を主項として割り算を無限回続ける .

例 4.54 (等比級数の具体例) 等比級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ を考える . 部分和は

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n} \end{aligned}$$

となるので , 級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) = 1$$

と得られる．または，等比級数の公比 $r = \frac{1}{2}$ が $|r| < 1$ をみたすので，級数は収束する．よって，公式を用いて級数は

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots \right) = a(1 + r + r^2 + \cdots) \\ &= \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1. \end{aligned}$$

と得られる．

例 4.55 (等比級数の具体例) 級数 $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ を考える．部分和は

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{3^k} = 1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n}$$

であるから，級数は

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^n} \right) = \frac{3}{2}$$

と得られる．または，比級数の公比 $r = \frac{1}{3}$ が $|r| < 1$ をみたすので，級数は収束する．よって，公式を用いて級数は

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} = 1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots = a(1 + r + r^2 + r^3 + \cdots) \\ &= \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

と得られる．

例 4.56 (等比級数の具体例)

$$0.9999 \cdots = 1.$$

(証明)

$$\begin{aligned} 0.999 \cdots &= 9 \times (0.111 \cdots) = 9 \times \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{9}{10} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots \right) \\ &= a(1 + r + r^2 + \cdots) = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{9}{10}}{1-\frac{1}{10}} = 1. \end{aligned}$$

4.17 正項級数

定義 4.57 (正項級数) 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ のうち $a_n \geq 0$ ($n = 1, 2, \dots$) をみたすものを正項級数 (positive term series) と呼ぶ．

注意 4.58 (正項級数の単調性) 正項級数 $\sum a_n$ の部分和の数列 $\{S_n\}$ は単調増加である .

(証明) $S_{n+1} - S_n = a_n \geq 0$ より S_n は広義の単調増加である . 証明終了 .

定理 4.59 (正項級数の収束定理) 正項級数 $\sum a_n$ の部分和から得られる数列 $\{S_n\}$ が上に有界なとき , $\sum a_n$ は収束する .

(証明) S_n は広義の単調増加である . 有界な単調数列は収束するので , S_n が上に有界なとき $\sum a_n$ は収束する . 証明終了 .

例 4.60 (正項級数の収束定理の具体例) 正項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ を考える . 部分和は

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = a(1 + r + r^2 + \cdots + r^{n-1}) \\ &= a \frac{1 - r^{n-1}}{1 - r} = \left(\frac{1}{2}\right) \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{aligned}$$

となるので

$$1 - S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 0 \quad \Rightarrow \quad S_n < 1$$

を得る . $\{S_n\}$ は上に有界である . よって定理より級数 $\sum (1/2)^n$ は収束する . 実際 , 極限を計算すると前述の例題より $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$ である .

定理 4.61 (正項級数の収束定理) 正項級数 $\sum a_n$ に関して $\{S_n\}$ が有界なとき $\sum a_n$ は収束する .

定理 4.62 (正項級数の収束定理) 正項級数 $\sum a_n$ が収束するとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ が成り立つ .

4.18 正項級数に関する収束性の比較判定法

定理 4.63 (比較判定法) 二つの正項級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

を考える .

数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ がある正の整数 N に対して

$$0 \leq a_n \leq b_n \quad (n \geq N)$$

をみたすとき , 次の関係が成り立つ :

- (i) T が収束するとき , S も収束する .
- (ii) S が発散するとき , T も発散する .

例 4.64 (比較判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^n}$ を考える . 数列 $a_n = \frac{1}{1+2^n}, b_n = \frac{1}{2^n}$ とする . このとき $0 < a_n < b_n$ をみたす . また , 級数 $T = \sum b_n = \sum 1/2^n$ は収束する . よって定理より級数 $S = \sum 1/(1+2^n)$ もまた収束する .

定理 4.65 (比較判定法) 二つの正項級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad T = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

を考える．数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ が

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L < \infty$$

を満たし，かつ級数 $T = \sum b_n$ が収束するとき，級数 $S = \sum a_n$ も収束する．

例 4.66 (調和級数) 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ を調和級数 (harmonic series) という．調和級数は発散する．

(証明) 調和級数の部分和

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{n}$$

の各項を括り直して

$$\begin{aligned} T_n = \sum_{k=1}^m \tilde{b}_k &= 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{15}\right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{31}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^m} + \cdots + \frac{1}{2^{m+1}-1}\right) \end{aligned}$$

とおき直す．ただし $n = 2^{m+1} - 1$ であり $m = \log(n+1)/\log 2 - 1$ とおく．ここで，数列 $\{\tilde{b}_k\}$ と $a_m < \tilde{b}_m$ をみたく数列 $\{a_m\}$ を

$$\begin{aligned} \tilde{b}_1 &= 1 &> \frac{1}{2} = a_1 \\ \tilde{b}_2 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} &> \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_2 = \frac{1}{2} = a_2 \\ \tilde{b}_3 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} &> \underbrace{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}}_4 = \frac{1}{2} = a_3 \\ \tilde{b}_4 &= \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} &> \underbrace{\frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{16}}_8 = \frac{1}{2} = a_4 \\ &\vdots &&\vdots \\ \tilde{b}_m &= \underbrace{\frac{1}{2^m} + \frac{1}{2^m+1} + \frac{1}{2^m+2} + \cdots + \frac{1}{2^{m+1}-1}}_{2^m} &> \underbrace{\frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2^{m+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{m+1}}}_{2^m} \\ &&&= \frac{2^m}{2^{m+1}} = \frac{1}{2} = a_m \end{aligned}$$

とおく．このとき，

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^m a_k = \sum_{k=1}^m \frac{1}{2} = \frac{m}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\log(n+1)}{\log 2} - 1 \right), \\ S &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m}{2} = \infty \end{aligned}$$

が成り立つ． $0 < a_m < \tilde{b}_m$ であり $S_n < T_n$ であるから，比較判定法より

$$T = \sum_{m=1}^{\infty} \tilde{b}_m = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$$

を得る．以上証明終り．

例 4.67 (収束判定の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ は

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < T = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 2$$

をみたく． T は収束するので， S も収束する．

例 4.68 (収束判定の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ は

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} < T = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

をみたく． T は収束するので S も収束する．

定理 4.69 (級数の収束)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{発散} & (p = 1) \\ \text{収束} & (p = 2, 3, 4, \dots) \end{cases}$$

例 4.70 (比較判定法の具体例) 級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots$$

は， $\frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{n}$ より， $S > T = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ となる． T は発散するので S も発散する．

定理 4.71 (級数の収束) $p \in \mathbb{R}$ に対して

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{発散} & (0 < p \leq 1) \\ \text{収束} & (p > 1) \end{cases}$$

例 4.72 (比較判定法) 級数 $T = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^2 - 1}$ は

$$\frac{n}{n^2 - 1} > \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

より $T > S = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ をみたく． S は調和級数であり発散するので T も発散する．

例 4.73 (比較判定法) 級数 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1}$ は

$$\frac{n+2}{n^2+1} > \frac{n+2}{n(n+2)+1} = \frac{n+2}{(n+1)^2} > \frac{n+1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n+1}$$

より $T > S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = -1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ をみたく． S は調和級数であり発散するので T も発散する．

4.19 正項級数に関するダランベールの収束判定法

定理 4.74 (ダランベールの収束判定法) 正項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \geq 0$) は, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

により, 級数の収束性の判定ができる:

- (i) $0 \leq L < 1$ のとき, $\sum a_n$ は収束する.
- (ii) $L > 1$ のとき, $\sum a_n$ は発散する.
- (iii) $L = 1$ のとき, $\sum a_n$ の収束性は判定できない.

例 4.75 (ダランベールの判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ を考える. $a_n = \frac{1}{n!}$ とおくと,

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

が成り立つ. ダランベールの収束判定法を用いる. $L < 1$ であるから S は収束する.

例 4.76 (ダランベールの判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ を考える.

$$a_n = \frac{n^2}{n!}, \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{(n+1)!}}{\frac{n^2}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 n!}{n^2 (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = 0$$

より, ダランベールの収束判定法を用いると, $L < 1$ であるから S は収束する.

例 4.77 (ダランベールの判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ を考える. $a_n = \frac{n^n}{n!}$ より

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1} n!}{n^n (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

となり, ダランベールの収束判定法を用いると, $L = e > 1$ であるから S は発散する.

例 4.78 (ダランベールの判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$ を考える. $a_n = \frac{n!}{2^n}$ より

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{2^{n+1}}}{\frac{n!}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! 2^n}{2^{n+1} n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = \infty$$

となり, ダランベールの収束判定法を用いると, $L = \infty > 1$ であるから S は発散する.

例 4.79 (ダランベールの判定法の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{2^n}$ を考える. $a_n = n \sin \frac{\pi}{2^n}$ より

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{n \sin \frac{\pi}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \frac{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{\sin \frac{\pi}{2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin \frac{\pi}{2^{n+1}}}{2 \sin \frac{\pi}{2^{n+1}} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}} = \frac{1+0}{2 \times 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

となり, ダランベールの収束判定法を用いると, $L = 1/2 < 1$ であるから S は収束する.

例 4.80 (ダランベールの判定法の具体例) 級数

$$S = 1 + |x| + \frac{|x|^2}{2} + \frac{|x|^3}{3!} + \cdots + \frac{|x|^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^{n-1}}{(n-1)!} \quad (x \in \mathbb{R})$$

を考える. $a_n = \frac{|x|^{n-1}}{(n-1)!} > 0$ であるから, S は正項級数である. よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n (n-1)!}{n! |x|^{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n} = 0$$

が成り立つので, ダランベールの判定法より級数は収束する.

例 4.81 (ダランベールの判定法で判定できない例) 調和級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ を考える. 隣り合う項の比の極限は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \times \frac{n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$$

となるのでダランベールの判定法では判定できない. 前述のように別の方法で行う.

4.20 正項級数に関するコーシーの収束判定法

定理 4.82 (コーシーの収束判定法) 正項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \geq 0$) は, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$$

により, 級数の収束性の判定ができる:

- (i) $0 \leq L < 1$ のとき, $\sum a_n$ は収束する.
- (ii) $L > 1$ のとき, $\sum a_n$ は発散する.
- (iii) $L = 1$ のとき, $\sum a_n$ の収束性は判定できない.

例 4.83 (コーシーの収束判定法) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{3n-5}\right)^n$ を考える.

$$a_n = \left(\frac{n-2}{3n-5}\right)^n,$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n-2}{3n-5}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-2}{3n-5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-2/n}{3-5/n} = \frac{1-0}{3-0} = \frac{1}{3}$$

が成り立つので, コーシーの収束判定法より, $L = 1/3 < 1$ となるので S は収束する.

例 4.84 (コーシーの収束判定法) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ を考える .

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}, \quad L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

が成り立つので , コーシーの収束判定法より , $L = e > 1$ となるので S は発散する .

4.21 交項級数

定義 4.85 (交項級数) 級数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n \quad (b_n \geq 0)$$

を交項級数 (alternative term series) と呼ぶ .

定理 4.86 (交項級数の収束定理) 交項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ は条件 (i) $b_n \geq b_{n+1}$, (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ をみたすとき収束する .

(証明) n が偶数のときの有限部分 and は

$$S_{2n} = (b_1 - b_2) + (b_3 - b_4) + \cdots + (b_{2n-1} - b_{2n}) = \sum_{k=1}^n (b_{2k-1} - b_{2k}),$$

$$S_{2n+2} - S_{2n} = b_{2n+1} - b_{2n+2} \geq 0$$

と書ける . $S_{2n+2} \geq S_{2n}$ となるので , 数列 $S_2, S_4, \dots, S_{2n}, \dots$ は正項級数でかつ単調増加となる . さらに S_{2n} は

$$S_{2n} = b_1 - \sum_{k=1}^{n-1} (b_{2k} - b_{2k+1}) - b_{2n}$$

とも書ける . $b_{2k} - b_{2k+1} \geq 0, b_{2k} \geq 0$ であるから , $S_{2n} \leq b_1$ となる . よって S_n は

$$0 \leq S_{2n} \leq b_1$$

をみたく . S_{2n} は有界な単調増加数列である . よって S_{2n} は極限 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$ が存在する . 次に n が奇数になる場合を考える . S_{2n+1} の極限は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + b_{2n+1}) = S + 0 = S$$

と得られる . 以上で証明終了 .

例 4.87 (交項級数の収束定理の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n}$ は収束する . なぜなら $b_n = 1/2^n > b_{n+1} = 1/2^{n+1}$ であり , $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ であるから , 定理より級数は収束する .

例 4.88 (交項級数の収束定理の具体例) 級数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ は収束する . なぜなら $b_n = 1/n > b_{n+1} = 1/(n+1)$ であり , $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ であるから , 定理より級数は収束する .

4.22 絶対収束級数

定理 4.89 (絶対収束級数の収束定理) 級数 $\sum |a_n|$ が収束するとき, 級数 $\sum a_n$ も収束する.

(証明) 有限部分和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \quad T_n = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$

を考える. 絶対値の性質より

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| = T_n$$

が成り立つ. これより

$$S_n + T_n = (a_1 + |a_1|) + (a_2 + |a_2|) + \cdots + (a_n + |a_n|) \leq 2T_n$$

となる. $a_n + |a_n| \geq 0$ より $S_n + T_n$ は正項級数である. 正項級数 $2T_n$ が収束するとき $S_n + T_n$ もまた収束する. よって T_n が収束するとき, S_n も収束する.

定義 4.90 (絶対収束級数) $\sum a_n$ が収束し, かつ $\sum |a_n|$ も収束するとき, $\sum a_n$ は絶対収束する (**absolutely convergent**) という. このとき級数 $\sum a_n$ を絶対収束級数 (**absolutely convergent series**) と呼ぶ.

定義 4.91 (条件収束級数) $\sum a_n$ は収束するが $\sum |a_n|$ が収束しない場合は, $\sum a_n$ は条件収束する (**conditionally convergent**) という. このとき級数 $\sum a_n$ は条件収束級数 (**conditionally convergent series**) と呼ぶ.

例 4.92 (絶対収束級数の具体例) 等比級数の例題で示したように $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ は収束する. 交項級数の例題で示したように $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n}$ は収束する. よって $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n}$ は絶対収束級数である.

例 4.93 (条件収束級数の具体例) 交項級数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ は前述の例題で示したように収束する. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ は調和級数であり前述の例題のとおり発散する. よって $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ は条件収束級数である.

例 4.94 (絶対収束級数の収束定理の具体例) 級数

$$S = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \quad (x \in \mathbb{R})$$

を考える. このとき

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^{n-1}}{(n-1)!} = 1 + |x| + \frac{|x|^2}{2} + \frac{|x|^3}{3!} + \cdots + \frac{|x|^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots$$

が成り立つ. ダランベールの判定法の例題で示したように, T は収束する. $\sum |a_n|$ が収束するとき $\sum a_n$ も収束するので, T が収束するとき S もまた収束する. S は絶対収束級数である.

4.23 ベキ級数

定義 4.95 (ベキ級数) 定数 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ と変数 x を考える. このとき級数

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

をベキ級数 (power series) または整級数 (polynomial series) と呼ぶ. 同様に級数

$$c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \dots + c_n (x - a)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$$

を $x - a$ のベキ級数と呼ぶ.

定理 4.96 (ベキ級数) 級数 $\sum c_n x^n$ が $x = u$ で収束するとき, 絶対級数 $\sum |c_n x^n|$ は $|x| < |u|$ で収束する. よって級数 $\sum c_n x^n$ も $|x| < |u|$ で収束する.

(証明)

$$\begin{aligned} \sum c_n x^n : \text{収束} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c_n x^n = 0 \Rightarrow |c_n x^n| \leq M : \text{有界} \Rightarrow |c_n x^n| = |c_n u^n| \left| \frac{x}{u} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{u} \right|^n \\ &\Rightarrow \sum |c_n x^n| \leq M \sum \left| \frac{x}{u} \right|^n \Rightarrow \rho = \left| \frac{x}{u} \right| < 1 \text{ のとき, } \sum |c_n x^n| \leq \frac{M}{1 - \rho} \\ &\Rightarrow |x| < |u| \text{ のとき, } \sum |c_n x^n| \text{ は収束} \end{aligned}$$

定義 4.97 (収束半径) ベキ級数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$ は $|x - a| < r$ において絶対収束し, $|x - a| > r$ において発散する. 定数 $r \geq 0$ を収束半径 (radius of convergence) と呼ぶ.

例 4.98 (収束半径の具体例) ベキ級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

を考える. $\sum |x^n|$ は $|x| < 1$ のとき収束する (公比が x の等比級数であるから). よって $\sum x^n$ は $|x| < 1$ のとき絶対収束する. よって収束半径は $r = 1$ である.

例 4.99 (収束半径の具体例) ベキ級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

は任意の有限の実数 x に対して絶対収束する (例題 4.94). すなわち $|x| < \infty$ において収束する. このとき収束半径は $r = \infty$ と表わす.

定理 4.100 (収束半径の計算法) ベキ級数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n$ を考える. 極限

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

または

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$$

が存在するとき，べき級数 $\sum c_n(x-a)^n$ の収束半径は r である．

(証明) 級数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ とその絶対級数 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(x-a)^n|$ を考える．このとき

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n(x-a)^n|$$

であるので， $\sum |c_n(x-a)^n|$ が収束するとき $\sum c_n(x-a)^n$ も収束する． $\sum a_n = \sum |c_n(x-a)^n|$ とおくと， $a_n = |c_n(x-a)^n| \geq 0$ であるから $\sum a_n$ は正項級数となる．ゆえにダランベールの収束判定法 (定理 4.74) より，級数 $\sum a_n$ は

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$$

のとき収束する．よって

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}(x-a)^{n+1}|}{|c_n(x-a)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| \frac{|x-a|^{n+1}}{|x-a|^n} \\ &= |x-a| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| < 1 \end{aligned}$$

となる．これより

$$|x-a| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

を得る．以上より収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

と求まる．同様にしてコーシーの収束判定法 (定理 4.82) より $r = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/\sqrt[n]{|c_n|}$ が求まる．

例 4.101 (収束半径の計算例) べき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

の収束半径を求める． $c_n = 1$ であるから，収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1} \right| = 1$$

と求まる．べき級数 $\sum x^n$ は $|x| < r = 1$ のとき収束し， $|x| > r = 1$ のとき発散する．

例 4.102 (収束半径の計算例) べき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

の収束半径を求める． $c_n = 1/n!$ であるから，収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

と求まる．収束半径は $r = \infty$ である．べき級数 $\sum x^n/n!$ は任意の実数 x に対して収束する．

例 4.103 (収束半径の計算例) べき級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \cdots$$

の収束半径を求める． $c_n = (-1)^{n-1}/n$ であるから，収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} n+1}{n (-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

と求まる．べき級数 $\sum (-1)^{n-1} x^n/n$ は $|x| < r = 1$ のとき収束し， $|x| > r = 1$ のとき発散する．

例 4.104 (収束半径の計算例) べき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{2n}$$

の収束半径を求める． $y = x^2$ とおくと，べき級数は

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n y^n$$

と書ける． y の級数の収束半径は， $c_n = 2^n$ とおくと

$$\tilde{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

と求まる．級数は

$$|y| = |x^2| \leq \tilde{r} = \frac{1}{2}$$

のとき収束する．よって， x については

$$|x| \leq r = \sqrt{\tilde{r}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

のとき収束するので， x についての収束半径は $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ である．

4.24 演習 ~ 級数, べき級数

問 4.105 (級数) 級数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ の定義を述べよ.

問 4.106 (級数) 次の級数について (i) 級数の第 n 部分和 S_n を求めよ. (ii) 数列 $\{S_n\}$ の概形を書け. (iii) 級数の値を求めよ.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} ar^n \quad (4) \sum_{n=2}^{\infty} ar^n \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n} \quad (6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-n}$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3n+2} \quad (8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \quad (9) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n^2+n}$$

問 4.107 (級数) 次の級数の値を求めよ.

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}} \quad (5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3^n} \quad (6) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \quad (7) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} \quad (9) \sum_{n=0}^{\infty} \left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^n + \left(\frac{1}{4} \right)^n \right\} \quad (10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + 3^n}{4^n} \quad (11) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 3^n + 4^n}{5^n}$$

$$(12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + 3^n + 5^n}{6^n} \quad (13) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2 \cdot 3^n + 3 \cdot 4^n}{4 \cdot 5^n} \quad (14) 0.999999999 \dots$$

問 4.108 (比較判定) 次の級数は収束するか発散するか述べよ.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$$

$$(7) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n^2-1} \quad (8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1}$$

問 4.109 (ダランベールの収束判定) 次の級数は収束するか発散するか述べよ.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \quad (5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n} \quad (6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n} \quad (7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{2^n} \quad (9) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \quad (a > 0) \quad (10) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{n!} \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (11) \sum_{n=1}^{\infty} a^n b^n \quad (a, b > 0)$$

$$(12) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(2a+1) \cdots (na+1)}{(b+1)(2b+1) \cdots (nb+1)} \quad (a, b > 0)$$

問 4.110 (コーシーの収束判定) 次の級数は収束するか発散するか述べよ.

$$(1) \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{n-2}{3n-5} \right)^n \quad (2) \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{4n-2}{3n-5} \right)^n \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n} \right)^n \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \quad (6) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n^2} \quad (7) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2} 2^{-n} \quad (8) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+2} \right)^{n^2} e^n$$

$$(9) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2} \quad (10) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^n}$$

問 4.111 (交項級数) 次の級数は収束するか発散するか述べよ.

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n}$$

問 4.112 (級数の収束) 次の級数が絶対収束級数か条件収束級数か答えよ.

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} & (2) & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-1} & (3) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} & (4) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} & (5) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^n}{n!} \\
 (6) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \quad (a > 0) & (7) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} a^n}{n!} \quad (a > 0) & (8) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \log n}{n} & (9) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \log n}{n^2} \\
 (10) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}
 \end{aligned}$$

問 4.113 (べき級数) べき級数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ は極限 $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ または $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}$ が存在するとき $|x-a| < r$ において絶対収束することを示せ.

問 4.114 (べき級数) 次のべき級数の収束半径を求めよ.

$$\begin{aligned}
 (1) & \sum_{n=0}^{\infty} x^n & (2) & \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n \\
 (3) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n & (4) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n & (5) & \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n & (6) & \sum_{n=0}^{\infty} n! (x+2)^n & (7) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n \\
 (8) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n & (9) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} & (10) & \sum_{n=0}^{\infty} n x^n & (11) & \sum_{n=0}^{\infty} n (x+1)^n & (12) & \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n (x-1)^n \\
 (13) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} x^n & (14) & \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n & (15) & \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{2n} & (16) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n} & (17) & \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^n \\
 (18) & \sum_{n=0}^{\infty} (3^n - 2^{n+1}) x^n & (19) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n n^2} x^n & (20) & \sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} x^n \quad (a > 0) \\
 (21) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n & (22) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} (x-2)^n & (23) & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n!} x^n & (24) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} x^n & (25) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{n^n} x^n \\
 (26) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} x^n & (27) & \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) x^n
 \end{aligned}$$

5 テイラー級数

5.1 テイラー級数

べき級数 $\sum c_n(x-a)^n$ は x についての関数である. これを

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \quad (|x-a| < r) \\
 &= c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + \cdots
 \end{aligned}$$

とおく. 数列 $\{c_n\}$ が一つ与えられると関数 $f(x)$ が一つ定まる. すなわち

$$\text{数列: } \{c_n\} \rightarrow \text{関数: } f(x) \quad (|x-a| < r)$$

との対応関係がある. それでは関数 $f(x)$ が一つ与えられたとき, べき級数 $\sum c_n(x-a)^n$ の係数である $\{c_n\}$ はどのような値に定まるであろうか. すなわち, 問題として対応関係

$$\text{関数: } f(x) \rightarrow \text{数列: } \{c_n\} = ?$$

を考える .

定理 5.1 (テイラー級数) 関数 $f(x)$ が ∞ 回微分可能なとき ,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \\ &\quad \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \quad (|x-a| < r) \end{aligned}$$

が成り立つ . ただし点 $x = a$ は定義内のある点とする . このべき級数を関数 $f(x)$ に関する $x = a$ まわりのテイラー級数 (Taylor series) と呼ぶ . 特に $a = 0$ のときは , マクローリン級数 (Maclaurin series) と呼ぶ .

注意 5.2 (テイラー級数の収束半径) テイラー級数はべき級数 $\sum c_n(x-a)^n$ を

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

とおいたものである . よってテイラー級数の収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \frac{(n+1)!}{f^{(n+1)}(a)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (n+1) \frac{f^{(n)}(a)}{f^{(n+1)}(a)} \right|$$

により求まる .

5.2 テイラー級数の導出

べき級数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

を考える . 関数 $f(x)$ が与えられたとし , テイラー級数の係数 $\{c_n\}$ を導出する . x が a に十分近いとき $(x-a)^n$ は次数 n が大きいほど小さくなる . つまり小さい次数の項が主要な項となる . よって小さい次数の係数より順に値を定めて行く .

まずべき級数

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + c_5(x-a)^5 + \dots$$

に $x = a$ を代入する . すると

$$f(a) = c_0 + 0 + 0 + \dots = c_0$$

となる . よって係数を $c_0 = f(a)$ と定める . べき級数は

$$f(x) = f(a) + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + c_5(x-a)^5 + \dots$$

となる . 両辺を微分すると

$$f'(x) = c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + 5c_5(x-a)^4 + \dots$$

を得る．ここに $x = a$ を代入すると

$$f'(a) = c_1 + 0 + 0 + \cdots = c_1$$

となるので係数を $c_1 = f'(a)$ と定める．このときべき級数とその導関数は

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + c_4(x-a)^4 + c_5(x-a)^5 + \cdots \\ f'(x) &= f'(a) + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + 4c_4(x-a)^3 + 5c_5(x-a)^4 + \cdots \end{aligned}$$

となる．これで1次の項までの係数が定まった． $f(x)$ の最初の二つの項までをみると $x = a$ における接線の方程式となっている．次に2階，3階の導関数と求めて行くと

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2 \cdot c_2 + 3 \cdot 2 \cdot c_3(x-a) + 4 \cdot 3 \cdot c_4(x-a)^2 + 5 \cdot 4 \cdot c_5(x-a)^3 + \cdots \\ f'''(x) &= 3 \cdot 2 \cdot c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_4(x-a) + 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot c_5(x-a)^2 + \cdots \\ f^{(4)}(x) &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_4 + 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_5(x-a) + \cdots \\ f^{(5)}(x) &= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_5 + \cdots \end{aligned}$$

となる． $x = a$ を代入すると

$$\begin{aligned} f''(a) &= 2 \cdot c_2 + 0 + 0 + \cdots \\ f'''(a) &= 3 \cdot 2 \cdot c_3 + 0 + 0 + \cdots \\ f^{(4)}(a) &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_4 + 0 + 0 + \cdots \\ f^{(5)}(a) &= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot c_5 + 0 + 0 + \cdots \end{aligned}$$

となるので係数が

$$c_2 = \frac{f''(a)}{2!}, \quad c_3 = \frac{f'''(a)}{3!}, \quad c_4 = \frac{f^{(4)}(a)}{4!}, \quad c_5 = \frac{f^{(5)}(a)}{5!}$$

と定まる．同様な操作を繰り返せば

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

を得る．

5.3 指数関数のテイラー級数

例 5.3 (指数関数のテイラー級数)

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad (|x| < \infty).$$

(導出) $f(x) = e^x$ とおく．導関数を計算すると

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x, \quad f'''(x) = e^x, \quad \cdots \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

となる．点 $x = 0$ における微分係数は

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 1, \quad f'''(0) = 1, \quad \cdots \quad f^{(n)}(0) = 1$$

である．よってテーラー級数は

$$f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

と求まる．べき級数 $\sum c_n(x-a)^n$ の収束半径 r を求める．係数は

$$c_n = \frac{1}{n!}$$

であるから，収束半径として

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

を得る．

例 5.4 (指数関数のテイラー級数) e^x の $x=1$ まわりでのテイラー級数は，

$$f(1) = e, \quad f'(1) = e, \quad f''(1) = e, \quad f'''(1) = e, \quad \cdots \quad f^{(n)}(1) = e$$

より，

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n \\ &= e + e(x-1) + \frac{e}{2}(x-1)^2 + \frac{e}{6}(x-1)^3 + \cdots + \frac{e}{n!}(x-1)^n + \cdots \end{aligned}$$

である．収束半径は

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e}{n!} \frac{(n+1)!}{e} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty$$

である．

5.4 三角関数のテイラー級数

例 5.5 (三角関数のテイラー級数)

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots \quad (|x| < \infty). \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \cdots \quad (|x| < \infty). \end{aligned}$$

(導出) $f(x) = \sin x$ とおく．導関数を計算すると

$$f(x) = \sin x, \quad f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x, \quad \cdots$$

である．一般的に書くと

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin x & (n = 4k) \\ \cos x & (n = 4k + 1) \\ -\sin x & (n = 4k + 2) \\ -\cos x & (n = 4k + 3) \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

である．点 $x = 0$ における微分係数は

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & (n = 4k) \\ 1 & (n = 4k + 1) \\ 0 & (n = 4k + 2) \\ -1 & (n = 4k + 3) \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

と求まる．これを用いてテラー級数を求めると

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &\quad (n = 4k, n = 4k + 1, n = 4k + 2, n = 4k + 3; k = 0, 1, 2, \dots) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(4k)}(0)}{(4k)!} x^{4k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(4k+1)}(0)}{(4k+1)!} x^{4k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(4k+2)}(0)}{(4k+2)!} x^{4k+2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(4k+3)}(0)}{(4k+3)!} x^{4k+3} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)!} x^{4k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-1}{(4k+3)!} x^{4k+3} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2(2k)+1)!} x^{2(2k)+1} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-1}{(2(2k+1)+1)!} x^{2(2k+1)+1} \\ &\quad (l = 2k, l = 2k + 1; k = 0, 1, 2, \dots) \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(2l+1)!} x^{2l+1} \\ &\quad (l = n - 1; n = 1, 2, 3, \dots) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} \end{aligned}$$

を得る．収束半径を求める．

$$c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$$

とおくと

$$\begin{aligned} r &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} (2n+1)!}{(2n-1)! (-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)!}{(2n-1)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)(2n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2 + 2n) = \infty \end{aligned}$$

が得られる．

例 5.6 (三角関数のテイラー級数) $f(x) = \sin x$ の点 $x = \frac{\pi}{4}$ まわりでのテイラー級数を求める． $f(x)$ の高階導関数は前述の問題で求めているので， $x = \frac{\pi}{4}$ における高階微係数を求めると，

$$f^{(n)}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} & (n = 4k) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & (n = 4k + 1) \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & (n = 4k + 2) \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & (n = 4k + 3) \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

となる．よって，テイラー級数は

$$\begin{aligned}\sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}\left(\frac{\pi}{4}\right)}{n!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 - \frac{1}{3!\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{1}{4!\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4 + \cdots \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n} + \frac{1}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n+1} \right)\end{aligned}$$

と得られる．

5.5 対数関数のマクローリン級数

例 5.7 (対数関数のテイラー級数)

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \cdots \quad (|x| < 1).$$

(導出) $f(x) = \log(1+x)$ とおく．導関数を計算すると

$$f(x) = \log(1+x), \quad f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad f''(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}, \quad f'''(x) = \frac{(-1)(-2)}{(1+x)^3}, \quad \cdots$$

となる．一般的には $n \geq 1$ に対して

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)(-2)(-3)\cdots(-n+1)}{(1+x)^n} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

と表わされる．点 $x = 0$ における微分係数は

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

となる．よってテイラー級数は

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n\end{aligned}$$

と得られる．収束半径 r を求める．

$$c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

とおくと，

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} \frac{n+1}{n}}{(-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

と得られる．

5.6 有理式関数のマクローリン級数

例 5.8 (有理関数のテイラー級数)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots \quad (|x| < 1)$$

(導出) $f(x) = 1/(1-x)$ とおく. 導関数を計算すると

$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \quad f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad f''(x) = \frac{2 \cdot 1}{(1-x)^3}, \quad f'''(x) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{(1-x)^4}, \quad \cdots$$

である. 一般的には

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

と表わされる. 点 $x = 0$ における微分係数は

$$f^{(n)}(0) = n!, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

と得られる. よってテーラー級数は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

となる. 収束半径 r は $c_n = 1$ とおくと

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = 1$$

と得られる.

5.7 べき関数のマクローリン級数

例 5.9 (多項式のテイラー級数) α が自然数以外の実数のとき,

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots \quad (|x| < 1) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n. \end{aligned}$$

α が自然数のとき,

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^{\alpha-2} + \alpha x^{\alpha-1} + x^\alpha \quad (|x| < \infty) \\ &= \sum_{n=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{n} x^n. \end{aligned}$$

(導出) $f(x) = (1+x)^\alpha$ とおく. 導関数を計算すると

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^\alpha, \quad f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}, \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}, \\ f'''(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(1+x)^{\alpha-3}, \quad \cdots \end{aligned}$$

である． α が自然数の場合と，それ以外の場合に分けて考える．まず α が自然数以外の実数のときを考える．導関数は

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} \\ &= \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!}(1+x)^{\alpha-n} \end{aligned}$$

と表わされる．点 $x=0$ における微分係数は

$$f^{(n)}(0) = \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!}$$

となる．よってテーラー級数は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

と求まる．収束半径 r は

$$c_n = \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!n!}$$

とおくと，

$$\begin{aligned} r &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!n!} \frac{(\alpha-n-1)!(n+1)!}{\alpha!} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1+1/n}{\alpha/n-1} \right| = 1 \end{aligned}$$

と得られる．次に α が自然数のときを考える．導関数は

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!}(1+x)^{\alpha-n} & (n \leq \alpha) \\ 0 & (n > \alpha) \end{cases}$$

と表わされる．点 $x=0$ における微分係数は

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!} & (n \leq \alpha) \\ 0 & (n > \alpha) \end{cases}$$

と求まる．よってテーラー級数は

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\alpha} \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!n!} x^n = \sum_{n=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{n} x^n$$

と得られる．この展開式は有限項の和であり，有限次数の多項式である． α が自然数のときのテーラー展開は二項展開となる．展開式は多項式であり任意の実数 x に対して成立する．よって $|x| < \infty$ であり，収束半径は $r = \infty$ となる．

5.8 2項係数の拡張

定義 5.10 (階乗の拡張) α を実数とする. このとき $\alpha!$ を

$$\alpha! = \alpha(\alpha - 1)!, \quad 0! = 1$$

と定義する.

例 5.11 (階乗の具体例) α が自然数 n のとき

$$\alpha! = n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1$$

である. α が自然数ではないとき

$$\alpha! = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots = \prod_{n=0}^{\infty} (\alpha - n)$$

となり無限積で表わされる. 例えば $\alpha = 1/2$ のときは

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}\right)! &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) \left(\frac{1}{2} - 3\right) \cdots = \prod_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} - n\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \cdots = \prod_{n=0}^{\infty} \frac{-2n+1}{2} \end{aligned}$$

となる.

定義 5.12 (二項係数の拡張) 実数 α , 自然数 n に対して

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha!}{(\alpha-n)!n!} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1}$$

と定義する.

例 5.13 (二項係数の具体例) α が自然数 m のときは

$$\binom{\alpha}{n} = \binom{m}{n} = \frac{m!}{(m-n)!n!}$$

であり通常の二項係数と等しい. $\alpha = 1/2, n = 3$ のとき

$$\binom{\frac{1}{2}}{3} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{1}{16}$$

となる. $\alpha = -2, n = 3$ のとき

$$\binom{-2}{3} = \frac{(-2)(-3)(-4)}{3 \cdot 2 \cdot 1} = -4$$

となる.

5.9 解析関数

定義 5.14 (解析関数) 関数 $f(x)$ がテイラー級数で表されるとき, 関数 $f(x)$ は解析的 (analytic) であるという. 解析的な関数を解析関数 (analytic function) と呼ぶ.

定理 5.15 (解析関数の性質) 関数 $f(x), g(x)$ が解析的であるとき, 次の関数

$$\alpha f(x) + \beta g(x), \quad f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)}, \quad f(g(x))$$

もまた解析的である.

例 5.16 (テイラー級数の計算例) 関数 $f(x) = e^x$ のテイラー級数は

$$f(x) = e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n$$

と表わされる. このとき $g(x) = e^{\alpha x}$ のテイラー級数を求める. $g(x)$ は $f(x)$ を用いると $g(x) = f(\alpha x)$ と書ける. $f(x)$ のテイラー級数の x に αx を代入すると

$$\begin{aligned} g(x) = e^{\alpha x} &= 1 + (\alpha x) + \frac{1}{2}(\alpha x)^2 + \frac{1}{6}(\alpha x)^3 + \cdots \\ &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha^2}{2}x^2 + \frac{\alpha^3}{6}x^3 + \cdots \end{aligned}$$

を得る. この展開式はテイラー級数の公式を $g(x)$ に適用したものと同一ものとなる. 同様に $g(x) = e^{-x^2}$ のテイラー級数は

$$\begin{aligned} g(x) = f(-x^2) = e^{-x^2} &= 1 + (-x^2) + \frac{1}{2}(-x^2)^2 + \frac{1}{6}(-x^2)^3 + \cdots \\ &= 1 - x^2 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{6}x^6 + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n} \end{aligned}$$

と求まる.

5.10 テイラー級数の計算

例 5.17 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \\ \frac{1}{1-x-x^2} &= 1 + (x+x^2) + (x+x^2)^2 + (x+x^2)^3 + \cdots \\ &= 1 + (x+x^2) + (x^2+2x^3+x^4) + (x^3+3x^4+3x^5+x^6) + \cdots \\ &= 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots \end{aligned}$$

例 5.18 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned}(1+x)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3!}x^3 + \cdots = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \cdots \\ \sqrt{1-x} &= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3 + \cdots \\ \sqrt{1-x-x^2} &= 1 - \frac{1}{2}(x+x^2) - \frac{1}{8}(x+x^2)^2 - \frac{1}{16}(x+x^2)^3 + \cdots \\ &= 1 - \frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right)x^2 - \left(\frac{2}{8} + \frac{1}{16}\right)x^3 + \cdots = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{5}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots\end{aligned}$$

例 5.19 (テイラー級数の計算例)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$$

より,

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n}{n!} x^n \\ &\quad (n = 2k, n = 2k+1; k = 0, 1, 2, \dots) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^{2k}}{(2k)!} x^{2k} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^{2k+1}}{(2k+1)!} x^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} \\ &\quad (k \rightarrow n-1; n = 1, 2, 3, \dots) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)!} x^{2n-1} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots\end{aligned}$$

例 5.20 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned}\cosh x &= \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \right) + \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^n}{n!} + \cdots \right) \right\} \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots\end{aligned}$$

5.11 割り算によるテイラー級数の計算

例 5.21 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x} &= 1 + \frac{x}{1-x} = 1 + x + \frac{x^2}{1-x} = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{1-x} \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \frac{x^4}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots\end{aligned}$$

例 5.22 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x-x^2} &= 1 + \frac{x+x^2}{1-x-x^2} = 1 + x + \frac{2x^2+x^3}{1-x-x^2} = 1 + x + 2x^2 + \frac{3x^3+2x^4}{1-x-x^2} \\ &= 1 + x + x^2 + 3x^3 + \cdots\end{aligned}$$

例 5.23 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{1-x} &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots}{1-x} = x + \frac{x^2 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots}{1-x} = x + x^2 + \frac{\frac{5x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots}{1-x} \\ &= x + x^2 + \frac{5x^3}{6} + \frac{101x^5}{120} - \dots = x + x^2 + \frac{5x^3}{6} + \frac{101x^5}{120} + \dots \end{aligned}$$

例 5.24 (テイラー級数の計算例)

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots} = x + \frac{\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{30} - \dots}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots} = x + \frac{x^3}{3} + \dots$$

例 5.25 (テイラー級数の計算例)

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + 2x - 3} &= \frac{1}{(x+3)(x-1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+3} \right) = \frac{-1}{4} \frac{1}{1-x} + \frac{-1}{12} \frac{1}{1 - \left(\frac{-x}{3}\right)} \\ &= \frac{-1}{4} (1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots) + \frac{-1}{12} \left(1 + \left(\frac{-x}{3}\right) + \left(\frac{-x}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{-x}{3}\right)^n + \dots \right) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{2}{9}x - \frac{7}{27}x^2 - \dots - \frac{3^{n+1} + (-1)^n}{4 \cdot 3^{n+1}}x^n - \dots \end{aligned}$$

5.12 テイラー級数の項別微分

例 5.26 (テイラー級数の微分) $f(x)$ のテイラー級数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

を項別微分すると,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \frac{d}{dx} \left(f(a) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \right) \\ &= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} \left(\frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(a) \frac{n}{n!} (x-a)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{(n-1)!} (x-a)^{n-1} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m+1)}(a)}{m!} (x-a)^m \quad (m = n-1; n = 1, 2, 3, \dots) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(f')^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (m \rightarrow n) \\ &= f'(x) \end{aligned}$$

となる. これは $f'(x)$ に関するテイラー級数とである.

例 5.27 (項別微分の具体例)

$$\begin{aligned}
 e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots \\
 \frac{d}{dx} e^x &= \frac{d}{dx} \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{1}{(n+1)!}x^{n+1} + \dots \right) \\
 &= \frac{d}{dx} 1 + \frac{d}{dx} x + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}x^2 \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3!}x^3 \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{4!}x^4 \right) + \dots \\
 &\quad \dots + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{n!}x^n \right) + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{(n+1)!}x^{n+1} \right) + \dots \\
 &= 0 + 1 + \frac{2}{2}x + \frac{3}{3!}x^2 + \frac{4}{4!}x^3 + \dots + \frac{n}{n!}x^{n-1} + \frac{n+1}{(n+1)!}x^n + \dots \\
 &= 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1} + \frac{1}{n!}x^n + \dots \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \\
 &= e^x
 \end{aligned}$$

例 5.28 (項別微分の具体例)

$$\begin{aligned}
 \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \\
 \frac{d}{dx} \sin x &= \frac{d}{dx} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots \right) \\
 &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \cos x
 \end{aligned}$$

例 5.29 (項別微分の具体例)

$$\begin{aligned}
 \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + \dots \\
 \frac{d}{dx} \log(1+x) &= 1 - x + \dots + (-1)^n x^{n-1} + \dots = \frac{1}{1+x}
 \end{aligned}$$

問 5.30 これを示せ .

5.13 項別積分

例 5.31 (項別積分) 関数 $f(x) = \text{Tan}^{-1}x$ を考える . $f(x)$ のテイラー級数を求める . このとき $f^{(n)}(x)$ の計算は面倒であるので別の方法を考える . そこで次のような項別積分を用いてテイラー級数を求める . まず $f(x)$ の導関数は

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

である . これをテイラー級数で表わす . そのためまず

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

を用意する． x に x^2 を代入すれば

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

を得る．両辺を不定積分をすると

$$\begin{aligned} \text{Tan}^{-1}x &= \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int (-1)^n x^{2n} dx \\ &= \int dx + - \int x^2 dx + + \int x^4 dx + \cdots + (-1)^n \int x^{2n} dx + \cdots \\ &= C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \\ &= C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad (n \rightarrow n-1) \end{aligned}$$

を得る．定数項 C には不定性が残っている．これを定める． $x=0$ を代入すると

$$\text{Tan}^{-1}0 = C + 0 + 0 + \cdots \quad \rightarrow \quad C = \text{Tan}^{-1}0 = 0$$

を得る．以上より $f(x)$ のテイラー級数として

$$f(x) = \text{Tan}^{-1}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$$

が求まる．

5.14 オイラーの関係式

注意 5.32 (三角関数と指数関数) 三角関数と指数関数は

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

の関係にある．これをオイラーの関係式という．ここで $e^{\pm ix}$ は複素指数関数である．複素指数関数は複素数 $z = x + iy$ に対して

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

と定義される．右辺は複素べき級数である．この定義より関係式が自然に導出される．このとき $x=0$ とし $z = iy$ とおく．すると

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} = 1 + iy + i^2 \frac{y^2}{2} + i^3 \frac{y^3}{3!} + i^4 \frac{y^4}{4!} + i^5 \frac{y^5}{5!} + i^6 \frac{y^6}{6!} + \cdots \\ &= 1 + iy - \frac{y^2}{2} - i \frac{y^3}{3!} + \frac{y^4}{4!} + i \frac{y^5}{5!} - \frac{y^6}{6!} + \cdots = \left(1 - \frac{y^2}{2} + \frac{y^4}{4!} - \frac{y^6}{6!} + \cdots \right) + i \left(y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} \cdots \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} y^{2n-2}}{(2n-2)!} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} y^{2n-1}}{(2n-1)!} = \cos y + i \sin y \end{aligned}$$

を得る．同様に $z = -iy$ とおくと

$$\begin{aligned}
 e^{-iy} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iy)^n}{n!} = 1 + i(-y) + i^2 \frac{(-y)^2}{2} + i^3 \frac{(-y)^3}{3!} + i^4 \frac{(-y)^4}{4!} + i^5 \frac{(-y)^5}{5!} + i^6 \frac{(-y)^6}{6!} + \dots \\
 &= 1 + i(-y) - \frac{(-y)^2}{2} - i \frac{(-y)^3}{3!} + \frac{(-y)^4}{4!} + i \frac{(-y)^5}{5!} - \frac{(-y)^6}{6!} + \dots \\
 &= \left(1 - \frac{(-y)^2}{2} + \frac{(-y)^4}{4!} - \frac{(-y)^6}{6!} + \dots \right) + i \left((-y) - \frac{(-y)^3}{3!} + \frac{(-y)^5}{5!} - \dots \right) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (-1)^{2n-2} y^{2n-2}}{(2n-2)!} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (-1)^{2n-1} y^{2n-1}}{(2n-1)!} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} y^{2n-2}}{(2n-2)!} - i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} y^{2n-1}}{(2n-1)!} = \cos y - i \sin y
 \end{aligned}$$

を得る． y を x に置き換えることで，最初の関係式を得る．

5.15 テイラー展開

テイラー級数では関数 $f(x)$ を無限和で表す．次のテイラー展開では有限項の和で $f(x)$ を表す．

定理 5.33 (テイラー展開) 関数 $f(x)$ が $n+1$ 回微分可能なとき，

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_{n+1}(x), \\
 R_{n+1}(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \xi = a + \theta(x-a) \quad (0 \leq \theta \leq 1)
 \end{aligned}$$

が成り立つ．ただし点 $x = a$ は定義内の点である．この展開式を $f(x)$ のテイラー展開 (Taylor expansion) と呼ぶ．特に $a = 0$ のときをマクローリン展開 (Maclaurin expansion) と呼ぶ． R_n は剰余項 (remainder) と呼ばれる．

注意 5.34 (テイラー展開) 点 ξ は点 a と点 x とを $\theta : 1 - \theta$ に内分する点である．

定理 5.35 (平均値の定理) 関数 $f(x)$ が $a \leq x \leq b$ で連続で， $a < x < b$ で微分可能ならば，

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi), \quad \xi = a + \theta(b - a) \quad (0 \leq \theta \leq 1)$$

をみたす ξ が存在する．

例 5.36 (テイラー展開の具体例)

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_{n+1}(x), \\
 R_{n+1}(x) &= \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 \leq \theta \leq 1)
 \end{aligned}$$

例 5.37 (テイラー展開の具体例)

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + R_{2n}(x), & R_{2n}(x) &= \frac{(-1)^n \sin(\theta x)}{(2n)!} x^{2n}, \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + R_{2n+1}(x), & R_{2n+1}(x) &= \frac{(-1)^n \cos(\theta x)}{(2n+1)!} x^{2n+1} \end{aligned}$$

($0 \leq \theta \leq 1$)

5.16 テイラー級数による関数の近似

定義 5.38 (関数の近似) 関数 $f(x)$ をテイラー級数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

で表わし, n 次の項で打ち切った関数

$$\tilde{f}_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

を $f(x)$ の n 次近似と呼ぶ.

具体的に書くと

$$\begin{aligned} 0 \text{ 次近似: } & f(x) \simeq \tilde{f}_0(x) = f(a) && \text{定数} \\ 1 \text{ 次近似: } & f(x) \simeq \tilde{f}_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a) && \text{直線, 接線の方程式} \\ 2 \text{ 次近似: } & f(x) \simeq \tilde{f}_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 && \text{放物線} \\ & \vdots && \\ n \text{ 次近似: } & f(x) \simeq \tilde{f}_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots \\ & \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n && n \text{ 次多項式} \end{aligned}$$

と表される. テイラー級数による関数の近似では $f(x)$ を多項式で近似する.

注意 5.39 (関数の近似) 近似式 $\tilde{f}_n(x)$ は曲線 $y = f(x)$ に点 $x = a$ で接する n 次多項式である.

例 5.40 (関数の近似の具体例)

$$f(x) = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_0(x) = 1$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_1(x) = 1 + x$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

例 5.41 (関数の近似の具体例)

$$f(x) = \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_0(x) = 0$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_1(x) = \tilde{f}_2(x) = x$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_3(x) = \tilde{f}_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

$$f(x) \simeq \tilde{f}_5(x) = \tilde{f}_6(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

5.17 近似関数の誤差の評価

関数 $f(x)$ の n 次近似式 $\tilde{f}_n(x)$ の誤差 $e_n(x)$ を考える．テイラー展開

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n+1}(x)$$

より

$$f(x) = \tilde{f}_n(x) + R_{n+1}(x)$$

が成り立つ．誤差 (error) を

$$e_n(x) = |\tilde{f}_n(x) - f(x)|$$

と定義すると，上の式より誤差は

$$e_n(x) = |\tilde{f}_n(x) - f(x)| = |R_{n+1}(x)|$$

と表される．

例 5.42 (誤差の評価の具体例) $f(x) = \sin x$ を多項式で近似する． $x = 0$ まわりでテイラー展開して近似式を計算すると

$$0 \text{ 次近似 : } f(x) \simeq \tilde{f}_0(x) = 0$$

$$1 \text{ 次近似 : } f(x) \simeq \tilde{f}_1(x) = x$$

$$3 \text{ 次近似 : } f(x) \simeq \tilde{f}_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

$$5 \text{ 次近似 : } f(x) \simeq \tilde{f}_5(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

を得る．誤差 $e_n(x)$ は

$$e_0(x) = |\tilde{f}_0(x) - f(x)| = |R_1(x)| = |x \cos \theta x| \leq |x|$$

$$e_1(x) = |\tilde{f}_1(x) - f(x)| = |R_3(x)| = \left| \frac{x^3 \cos \theta x}{6} \right| \leq \frac{|x|^3}{6}$$

$$e_3(x) = |\tilde{f}_3(x) - f(x)| = |R_5(x)| = \left| \frac{x^5 \cos \theta x}{120} \right| \leq \frac{|x|^5}{120}$$

$$e_5(x) = |\tilde{f}_5(x) - f(x)| = |R_7(x)| = \left| \frac{x^7 \cos \theta x}{7!} \right| \leq \frac{|x|^7}{7!}$$

である．ここで $|\cos \theta x| \leq 1$ を用いた．

いま $x = 1$ のときの誤差を考える．このとき誤差は

$e_0(1) \leq 1$	→	$e_0 \sim 1$	有効桁数：0, 1 桁程度
$e_1(1) \leq \frac{1}{6} = 0.1666... < 0.2$	→	$e_1 \sim 2 \times 10^{-1}$	有効桁数：1, 2 桁程度
$e_3(1) \leq \frac{1}{120} = 0.008333... < 0.01$	→	$e_3 \sim 1 \times 10^{-2}$	有効桁数：2, 3 桁程度
$e_5(1) \leq \frac{1}{7!} = 0.000198... < 0.0002$	→	$e_5 \sim 2 \times 10^{-4}$	有効桁数：4, 5 桁程度

となる．近似の次数が大きいほど誤差は小さい．次に誤差 $e_n(x)$ が 0.01 以下となるような x の範囲を求める．上の誤差の評価式より

$$\begin{aligned}
 e_0(x) \leq |x| \leq 0.01 &\quad \rightarrow \quad |x| \leq 0.01 \\
 e_1(x) \leq \frac{|x|^3}{6} \leq 0.01 &\quad \rightarrow \quad |x|^3 \leq 0.06 \quad \rightarrow \quad |x| \leq 0.391 \\
 e_3(x) \leq \frac{|x|^5}{120} \leq 0.01 &\quad \rightarrow \quad |x|^5 \leq 1.2 \quad \rightarrow \quad |x| \leq 1.04 \\
 e_5(x) \leq \frac{|x|^7}{7!} \leq 0.01 &\quad \rightarrow \quad |x|^7 \leq 50.4 \quad \rightarrow \quad |x| \leq 1.75
 \end{aligned}$$

となる．近似の次数が上がるほど x の範囲が広がっている．

5.18 ランダウの記号

定義 5.43 (ランダウの記号) 関数 $f(x), g(x)$ に対して

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0$$

が成り立つとき，

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

と表記する． $o(\cdot)$ はランダウ (Landau) の記号であり，ラージオーと読む．またこのとき， f は g に比べ無視できるという．

定義 5.44 (ランダウの記号) 関数 $f(x), g(x)$ に対して

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = b < \infty$$

が成り立つとき，

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

と表記する． $O(\cdot)$ はランダウ (Landau) の記号であり，スモールオーと読む．またこのとき f は g で押さえられるという．

注意 5.45 (二つのランダウの記号の関係) 関数 $f(x), g(x)$ に対して

$$f(x) = O(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

が成り立つとき, $b \neq 0$ であれば $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - b \right) = 0$ となるので

$$f(x) = b g(x) + o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

が成り立つ.

定義 5.46 (無限大, 無限小) 関数 $f(x), g(x)$ が $x \rightarrow a$ において無限小または無限大となるとき, 次の呼び方を定義する.

- $f \rightarrow 0, g \rightarrow 0, f = o(g) (x \rightarrow a)$ のとき, f は g より高次の無限小と呼ぶ. または g は f より低次の無限小と呼ぶ.
- $f \rightarrow \pm\infty, g \rightarrow \pm\infty, f = o(g) (x \rightarrow a)$ のとき, f は g より低次の無限大と呼ぶ. または g は f より高次の無限大と呼ぶ.
- $f \rightarrow 0, g \rightarrow 0, f = O(g) (x \rightarrow a)$ のとき, f と g とは同次の無限小と呼ぶ.
- $f \rightarrow \pm\infty, g \rightarrow \pm\infty, f = O(g) (x \rightarrow a)$ のとき, f と g とは同次の無限大と呼ぶ.

例 5.47 (ランダウの記号の使用例)

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + O(x^2) = 1 + x + o(x) \quad (x \rightarrow 0) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x &= x + O(x^3) = x + o(x) \quad (x \rightarrow 0) \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + O(x^5) = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

注意 5.48 (テイラー展開とランダウの記号) テイラー展開により

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + O((x-a)^{n+1}), \\ f(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n) \end{aligned}$$

が成り立つ. なぜなら

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{R_{n+1}(x)}{(x-a)^{n+1}} \right| = \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f^{(n+1)}(x + \theta(x-a))}{(n+1)!} \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} \right| < \infty$$

となるからである. 同様に

$$\lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{R_{n+1}(x)}{(x-a)^n} \right| = \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f^{(n+1)}(x + \theta(x-a))}{(n+1)!} (x-a) \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} \right| \times 0 = 0$$

となることより得られる.

5.19 漸近展開

定義 5.49 (漸近展開) $f \in C^n$ に対して,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$$

を漸近展開 (asymptotic expansion) という.

5.20 テイラー級数を用いた関数の極限の計算

関数

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

の $x \rightarrow 0$ における極限を考える. $f(x)$ をテイラー級数で表わしたのち関数の極限を求める. すなわち

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) \text{ の } x = 0 \text{ まわりでのテイラー級数}\}$$

として計算する. まず分子である $\sin x$ をテイラー展開すると

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7)$$

となる. 次に分子 $\sin x$ を分母 x で割り, $f(x)$ のテイラー展開を求める. すなわち

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + O(x^7)}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{5!} + O(x^6)$$

を得る. もとの関数とテイラー級数で表わした関数とは等価なものである. よって

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{5!} + O(x^6)\right) = 1 - 0 + 0 + 0 = 1$$

を得る. 関数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ はもともと点 $x = 0$ において値が定義されていない. しかしながら, 等価な式であるテイラー級数では, 点 $x = 0$ は特別な点ではない. 点 $x = 0$ は見かけの不連続点である. ある関数に不連続点があるとき, その不連続点が取り除けるかどうかは, その関数をテイラー級数表示をすればよい.

問 5.50 (極限の計算) 極限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

を求めよ.

例 5.51 (テイラー展開を用いた極限の計算の例) 関数

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x} - x$$

に対して極限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ を考える. このとき

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) \text{ の } x = \infty \text{ まわりのテイラー級数}\}$$

として極限を求める．しかしながら，べき級数 $\sum c_n(x - \infty)^n$ は存在しない．そこで変数を $y = 1/x$ と導入する．すると極限は

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left\{ f\left(\frac{1}{y}\right) \text{ の } y = 0 \text{ まわりのテイラー級数} \right\}$$

と表わされる． $f(1/y)$ を計算すると

$$f\left(\frac{1}{y}\right) = \sqrt{\frac{1}{y^2} - \frac{2}{y}} - \frac{1}{y} = \frac{1}{y} \left(\sqrt{1 - 2y} - 1 \right)$$

となる．まず $\sqrt{1 - 2y}$ をテイラー展開すると

$$\sqrt{1 - 2y} = 1 + \frac{1}{2}(-2y) + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2} - 1)}{2 \cdot 1}(-2y)^2 + O((-2y)^3) = 1 - y - \frac{1}{2}y^2 + O(y^3)$$

を得る．これを用いて $f(1/y)$ のテイラー展開を求めると

$$f\left(\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y} \left\{ \left(1 - y - \frac{1}{2}y^2 + O(y^3) \right) - 1 \right\} = \frac{1}{y} \left(-y - \frac{1}{2}y^2 + O(y^3) \right) = -1 - \frac{1}{2}y + O(y^2)$$

となる．よって極限は

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{y \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{y}\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left\{ -1 - \frac{1}{2}y + O(y^2) \right\} = -1 + 0 + 0 = -1$$

と得られる．

5.21 関数の増減と極値

定義 5.52 (増加, 減少, 極値) h を十分小さい正の数 $h > 0$ とする．このとき関数 $f(x)$ に関して次の性質を定義する．

- $f(a - h) < f(a) < f(a + h)$ をみたすとき，関数 $f(x)$ は点 $x = a$ において増加の状態であるという．
- $f(a - h) > f(a) > f(a + h)$ をみたすとき，関数 $f(x)$ は点 $x = a$ において減少の状態であるという．
- $f(a - h) < f(a) > f(a + h)$ をみたすとき，関数 $f(x)$ は点 $x = a$ において極大値 $f(a)$ をとるという．
- $f(a - h) > f(a) < f(a + h)$ をみたすとき，関数 $f(x)$ は点 $x = a$ において極小値 $f(a)$ をとるという．

極大値，極小値を総称して極値と呼ぶ．

定理 5.53 (微分係数と増減, 極値) 微分係数と関数の増減および極値の関係に関して次のことがいえる．

- $f'(a) > 0$ のとき， $f(x)$ は点 $x = a$ において増加の状態にある．
- $f'(a) < 0$ のとき， $f(x)$ は点 $x = a$ において減少の状態にある．
- $f'(a) = 0, f''(a) < 0$ のとき， $f(x)$ は点 $x = a$ において極大値をとる．

- $f'(a) = 0, f''(a) > 0$ のとき, $f(x)$ は点 $x = a$ において極小値をとる.

(証明) 関数 $f(x)$ をテイラー展開して

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + O((x-a)^3)$$

を得る. $x = a \pm h$ とおくと

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + O(h^3)$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + O(h^3)$$

となる. h を十分小さな正の値として考える. h^3 以降の項は十分小さく無視できる. $f'(a) > 0$ のとき

$$f(a) - f'(a)h < f(a) < f(a) + f'(a)h$$

が成り立つので, テイラー展開の 2 次の項を無視すれば

$$f(a-h) < f(a) < f(a+h)$$

を得る. よって $f(x)$ は増加の状態にある. 次に $f'(a) < 0$ のとき, 同様に

$$f(a) - f'(a)h > f(a) > f(a) + f'(a)h$$

$$\Rightarrow f(a-h) > f(a) > f(a+h)$$

となるので, $f(x)$ は減少の状態にある. 次に $f'(a) = 0, f''(a) < 0$ のとき,

$$f(a) + \frac{f''(a)}{2}h^2 < f(a) > f(a) + \frac{f''(a)}{2}h^2$$

$$\Rightarrow f(a-h) < f(a) > f(a+h)$$

となるので, $f(x)$ は $x = a$ において極大値をとる. 最後に $f'(a) = 0, f''(a) > 0$ のとき,

$$f(a) + \frac{f''(a)}{2}h^2 > f(a) < f(a) + \frac{f''(a)}{2}h^2$$

$$\Rightarrow f(a-h) > f(a) < f(a+h)$$

となるので, $f(x)$ は $x = a$ において極小値をとる.

定理 5.54 (単調増加) 関数 $f(x)$ が定義域内の任意の点で $f'(x) > 0$ であるとき, $f(x)$ は単調増加である.

定理 5.55 (単調減少) 関数 $f(x)$ が定義域内の任意の点で $f'(x) < 0$ であるとき, $f(x)$ は単調減少である.

5.22 ちょっとまとめ

1. ∞ 回微分可能な任意の関数 $f(x)$ はべき級数 (テイラー級数) で表わされる.
2. べき級数が与えられたとき, べき級数は関数を一つ定める.
3. もとの関数で議論しても, べき級数で議論しても等価である.
4. 計算の都合が良い方で行なう.
5. 極限, 微分, 積分の計算において計算しやすい方を用いる.
6. 関数を多項式近似するとき, テイラー展開を用いると議論がしやすい.
7. 関数の局所的な性質が議論しやすい. 増減, 極値

5.23 演習 ~ テイラー展開

問 5.56 (テイラー級数) 関数 $f(x)$ に関して点 $x = 0$ まわりで x についてのテイラー級数を求めよ. このとき, 級数が絶対収束する x の範囲も求めよ.

- (1) $f(x) = e^x$ (2) $f(x) = \sin x$ (3) $f(x) = \cos x$ (4) $f(x) = \log(1+x)$ (5) $f(x) = \frac{1}{1-x}$
 (6) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ (7) $f(x) = \sinh x$ (8) $f(x) = \cosh x$ (9) $f(x) = 5x^4 + 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$
 (10) $f(x) = 3x^4 + x^3 - 4x^2 + 2x - 1$ (11) $f(x) = 3x^5 - 4x^4 + x^3 - 10x^2 + 3x - 1$ (12) $f(x) = e^{-x}$

問 5.57 (テイラー級数) 関数 $f(x)$ に関して点 $x = a$ まわりで x についてのテイラー級数を求めよ.

- (1) $f(x) = \sin x, a = \frac{\pi}{4}$ (2) $f(x) = \cos x, a = \frac{\pi}{3}$ (3) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3x}, a = 1$

問 5.58 (項別微分) 次の関数 $f(x)$ のマクローリン級数の項別微分が, 関数 $g(x)$ のマクローリン級数と等しいことを示せ.

- (1) $f(x) = e^x, g(x) = e^x$ (2) $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x$ (3) $f(x) = \log(1+x), g(x) = \frac{1}{1+x}$

問 5.59 (合成によるテイラー展開の計算) 次の関数のマクローリン級数を求めよ.

- (1) e^x (2) e^{2x} (3) e^{-x} (4) e^{x^2} (5) e^{-x^2} (6) $e^{\alpha x}$ (7) $\sinh x$ (8) $\cosh x$
 (9) $\frac{1}{1+x}$ (10) $\frac{1}{1+x^2}$ (11) $\frac{1}{1-x^2}$ (12) $\frac{1}{1-x-x^2}$
 (13) $(1+x)^\alpha$ (14) $\frac{1}{(1+x)^2}$ (15) $\frac{1}{(1-x)^2}$ (16) $(1+x)^{\frac{3}{2}}$ (17) $\sqrt{1+x}$ (18) $\sqrt{1+x^2}$
 (19) $\sqrt{1-x^2}$ (20) $\sqrt{1-x-x^2}$ (21) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (22) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 (23) $\log \frac{1+x}{1-x}$ (24) $\cos(-x^2)$ (25) $\log(2+x^2)$ (26) $\tan^{-1} 2x$

例 5.60 (掛算によるテイラー展開の計算) 次の関数のマクローリン級数を求めよ.

- (1) $(1+x)e^{x^2}$ (2) $x^2 \log(1+x)$ (3) $x \log(1+2x)$ (4) $x \sin x$ (5) $(1+x^2) \cos x$
 (6) $e^{2x} \sin x$ (7) $(2-x)\sqrt{1+x}$

例 5.61 (割算によるテイラー展開の計算) 次の関数のマクローリン級数を求めよ.

- (1) $\frac{x}{1+x}$ (2) $\frac{1}{x^2+2x-3}$ (3) $\frac{x^2}{x^2-x-2}$ (4) $\frac{2x^2+1}{2x^2+x-1}$ (5) $\frac{\sin x}{1-x}$
 (6) $\tan x$ (7) $\frac{\log(1+x) - e^x}{1-x^2}$

例 5.62 (項別積分によるテイラー展開の計算) 次の関数のマクローリン級数を導関数のマクローリン級数を項別積分して求めよ.

- (1) $\tan^{-1} x$ (2) $\sin^{-1} x$ (3) $\cos^{-1} x$ (4) $\log(x + \sqrt{1+x^2})$

問 5.63 (テイラー展開を用いた極限の計算) 次の極限をマクローリン級数を用いて求めよ.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1+x-e^x}$ (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$ ($a, b > 0$) (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$
 (6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)\sin x - x \cos x}{x^2}$ (8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - \cos x}{x}$ (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \sin x}$
 (10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - xe^x + x^2}{x(\cos x - 1)}$ (11) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)$ (12) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin^{-1} x}{x - x \cos x}$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - \sin x}{x^2} \quad (14) \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x-1}{\log x} \quad (15) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \log x}{1-x^2} \quad (16) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 2x} - x \right)$$

$$(17) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x+x^2} - x \right) \quad (18) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{x^3+x^2} - x \right)$$

問 5.64 (テイラー展開とグラフの形) 関数 $f(x) = xe^{-x^2}$ について, (i) $f(x)$ が増加の状態, 減少の状態となる x の範囲を求めよ. (ii) $f(x)$ が極大値, 極小値, 変曲点をとる x の点を求めよ. (iii) $f(x)$ のグラフの概形を描け.

問 5.65 (テイラー展開とグラフの形) 次の関数が $x = 0$ で極値をとるかを, マクローリン展開をして議論せよ.

$$(1) (\cos x - 1) \sin x^2 \quad (2) x^2 \sin x - x^3 e^x \quad (3) x^2 - x^2 \cos x \quad (4) x^2 \log(1+x) - x^3$$

問 5.66 (テイラー級数展開による近似) 次の近似値を $f(x)$ のマクローリン級数を 5 次項まで行い計算せよ.

$$(1) e^{\frac{1}{2}} \left(f(x) = e^x, x = \frac{1}{2} \right) \quad (2) \log 2 \left(f(x) = \log \frac{1+x}{1-x}, x = \frac{1}{3} \right)$$

$$(3) \sin 0.1 \quad (f(x) = \sin x, x = 0.1)$$

問 5.67 (テイラー級数展開による近似) 関数 (1) $f(x) = e^{-x}$, (2) $f(x) = \cos x$ の近似を考える.

(i) 関数 $f(x)$ を点 $x = 0$ のまわりで点 x について有限テイラー展開せよ. (ii) 関数 $f(x)$ を原点の近くで多項式で近似せよ. 0 次から 4 次の近似多項式 $\tilde{f}_0(x), \tilde{f}_1(x), \dots, \tilde{f}_4(x)$ を求めよ. (iii) 点 $x = 1$ での近似多項式 $\tilde{f}_0(x), \dots, \tilde{f}_4(x)$ の誤差を評価せよ. (iv) $x \geq 0$ の範囲で近似多項式 $\tilde{f}_0(x), \dots, \tilde{f}_4(x)$ の誤差が 0.0001 未満となる x の範囲を求めよ.

6 積分法

積分法には次の二つの積分がある.

- 不定積分 …… 微分の逆演算
- 定積分 …… 面積の計算

それぞれ意味, 定義は異なる. まずはそれぞれ独立に定義, 性質をみる. その後この二つの積分の間にある関係を考える.

6.1 不定積分

関数 $f(x)$ に関して x で“微分をする”という操作を $\frac{d}{dx}$ という演算子, 作用素 (operator) で表すとする. すなわち関数 $f(x)$ に微分演算 $\frac{d}{dx}$ を作用させるとは

$$\frac{d}{dx} f(x) = f'(x)$$

のことである. この微分演算の逆演算を考える. これを $\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1}$ と表記し

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} f(x) = F(x)$$

と表すことにする．逆演算により得られる関数 $F(x)$ は方程式

$$() \quad \frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

をみたす関数と定義する．定義からただちに分かるように，ある関数 $F(x)$ が方程式 () をみたすとき， C を任意定数として関数 $F(x) + C$ もまた方程式 () をみたす．よって必ず

$$\left(\frac{d}{dx} \right)^{-1} f(x) = F(x) + C$$

が成り立つ．微分の逆演算 $\left(\frac{d}{dx} \right)^{-1}$ は通常 $\int dx$ という記号を用いる．これで書き直すと

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

と表せる．

定義 6.1 (不定積分) 関数 $f(x)$ に対して，微分演算 $\frac{d}{dx}$ の逆演算を $\int dx$ と表記し，

$$\int f(x) dx = F(x) + C \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

と定義する．ただし C は任意定数である． $\int f(x) dx$ を不定積分 (**indefinite integral**)， $f(x)$ を被積分関数 (**integrand**)， C を積分定数 (**constant of integration**)， $F(x)$ を原始関数 (**primitive function**) と呼ぶ．

6.2 不定積分の性質

定理 6.2 (不定積分の性質) 不定積分に関して次の条件が成り立つ：

- (1) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$
- (2) $\int F'(x) dx = F(x) + C$
- (3) $\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$

(証明) 定義 6.1 より

$$\int f(x) dx = F(x) + C \Leftrightarrow \frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

とする．

(1)

$$(\text{左辺}) = \frac{d}{dx} \int f(x) dx = \frac{d}{dx} (F(x) + C) = \frac{dF(x)}{dx} = f(x) = (\text{右辺}).$$

(2)

$$(\text{左辺}) = \int F'(x) dx = \int \frac{dF(x)}{dx} dx = \int f(x) dx = F(x) + C = (\text{右辺}).$$

問 6.3 (不定積分の性質) 定理 6.2 (3) を示せ .

注意 6.4 (不定積分の性質) 定理 6.2 (1), (2) より

$$\begin{aligned} \left(\frac{d}{dx}\right) \left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} f(x) &= f(x), \\ \left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} \left(\frac{d}{dx}\right) f(x) &= f(x) + C \end{aligned}$$

が成り立つ . 微分と不定積分の演算は可換ではない .

6.3 不定積分の基本的な計算

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}x &= 1 & \Leftrightarrow & \int dx = x + C \\ \frac{d}{dx}x^{n+1} &= (n+1)x^n & \Leftrightarrow & \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \\ \frac{d}{dx}x^{\alpha+1} &= (\alpha+1)x^\alpha & \Leftrightarrow & \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1) \\ \left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x} \quad (x > 0) \\ \frac{d}{dx} \log(-x) = \frac{1}{x} \quad (x < 0) \end{array} \right. & & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{x} dx = \log|x| + C \\ \frac{d}{dx}e^x &= e^x & \Leftrightarrow & \int e^x dx = e^x + C \\ \frac{d}{dx}a^x &= (\log a)a^x & \Leftrightarrow & \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C \quad (a > 0, a \neq 1) \\ \frac{d}{dx} \cos x &= -\sin x & \Leftrightarrow & \int \sin x dx = -\cos x + C \\ \frac{d}{dx} \sin x &= \cos x & \Leftrightarrow & \int \cos x dx = \sin x + C \\ \frac{d}{dx} \tan x &= \frac{1}{\cos^2 x} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \\ \frac{d}{dx} \text{Sin}^{-1}x &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \text{Sin}^{-1}x + C \quad (|x| < 1) \\ \frac{d}{dx} \text{Tan}^{-1}x &= \frac{1}{1+x^2} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{1+x^2} dx = \text{Tan}^{-1}x + C \\ \frac{d}{dx} \cosh x &= \sinh x & \Leftrightarrow & \int \sinh x dx = \cosh x + C \\ \frac{d}{dx} \sinh x &= \cosh x & \Leftrightarrow & \int \cosh x dx = \sinh x + C \\ \frac{d}{dx} \tanh x &= \frac{1}{\cosh^2 x} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \tanh x + C \\ \frac{d}{dx} \sinh^{-1}x &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \sinh^{-1}x + C \\ \frac{d}{dx} \text{Cosh}^{-1}x &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} & \Leftrightarrow & \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \text{Cosh}^{-1}x + C \quad (|x| > 1) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx} \tanh^{-1} x = \frac{1}{1-x^2} \quad \Leftrightarrow \quad \int \frac{1}{1-x^2} dx = \tanh^{-1} x + C \quad (x \neq 1)$$

例 6.5 (不定積分の計算例)

$$I = \int x^8 dx = \frac{1}{8+1} x^{8+1} + C = \frac{x^9}{9} + C.$$

$$I = \int \sqrt[4]{x} dx = \int x^{\frac{1}{4}} dx = \frac{1}{\frac{1}{4}+1} x^{\frac{1}{4}+1} + C = \frac{4}{5} x^{\frac{5}{4}} + C = \frac{4\sqrt[4]{x^5}}{5} + C.$$

$$I = \int \frac{dx}{x^3} = \int x^{-3} dx = \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C = \frac{1}{-2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

$$\begin{aligned} I &= \int (x^3 - x^2 + 3x - 2) dx = \int x^3 dx - \int x^2 dx + 3 \int x dx - 2 \int dx \\ &= \frac{1}{3+1} x^{3+1} - \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 3 \frac{1}{1+1} x^{1+1} - 2x + C \\ &= \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 - 2x + C. \end{aligned}$$

6.4 置換積分法

定理 6.6 (置換積分法) 積分変数を $x = \phi(t)$ と変換すると

$$\int f(x) dx = \int f(\phi(t)) \phi'(t) dt = \int f(\phi(t)) \frac{dx}{dt} dt$$

となる。また逆に $t = \psi(x)$ とおくと、

$$\int f(\psi(x)) \psi'(x) dx = \int f(t) dt = F(t) + C = F(\psi(x)) + C$$

となる。この積分の方法を置換積分法 (integration by substitution) という。

(証明) 関数 $F(x)$ を $f(x)$ の原始関数とする。変数 x を $x = \phi(t)$ と変数変換する。このとき $\frac{dF}{dt}$ は合成関数の微分則より

$$\frac{dF(\phi(t))}{dt} = \frac{d}{dt} F(\phi(t)) = F'(\phi(t)) \phi'(t) = f(\phi(t)) \phi'(t)$$

となる。両辺を t で積分すると

$$\int \frac{dF}{dt} dt = \int f(\phi(t)) \phi'(t) dt$$

を得る。左辺は

$$\int \frac{dF(\phi(t))}{dt} dt = F(\phi(t)) + C = F(x) + C = \int f(x) dx$$

であるから証明終了。

例 6.7 (置換積分の使用例) 不定積分

$$I = \int (ax + b)^m dx$$

を計算する．まず

$$t = ax + b$$

と変数変換する．このとき両辺を x で微分すると

$$\frac{dt}{dx} = a$$

であるので

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\frac{dt}{dx}} = \frac{1}{a}$$

を得る．これより置換積分法を用いると不定積分は

$$I = \int t^m \frac{dx}{dt} dt = \int t^m \frac{1}{a} dt = \frac{1}{a} \int t^m dt = \begin{cases} \frac{t^{m+1}}{a(m+1)} + C & (m \neq -1) \\ \frac{1}{a} \log |t| + C & (m = -1) \end{cases}$$

となる．変数 t を x に戻すと

$$I = \begin{cases} \frac{(ax+b)^{m+1}}{a(m+1)} + C & (m \neq -1) \\ \frac{1}{a} \log |ax+b| + C & (m = -1) \end{cases}$$

を得る．

置換積分は慣れてくれば変数変換を省略して計算をする．次のように式変形を行なう：

$$I = \int (ax+b)^m dx = \frac{1}{a} \int (ax+b)^m (ax+b)' dx = \begin{cases} \frac{1}{a(m+1)} (ax+b)^{m+1} + C & (m \neq -1) \\ \frac{1}{a} \log |ax+b| + C & (m = -1) \end{cases}$$

例 6.8 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int \cos(ax+b)(ax+b)' dx \\ &= \frac{1}{a} \int \cos t \frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} dt = \frac{1}{a} \int \cos t dt = \frac{1}{a} \sin t + C = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C. \end{aligned}$$

ここで， $t = ax + b$ とおき， $\frac{dt}{dx} = (ax+b)' = a$ ， $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた．

例 6.9 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx = - \int \frac{\frac{dt}{dx} dx}{t} dt = - \int \frac{dt}{t} \\ &= - \log |t| + C = - \log |\cos x| + C. \end{aligned}$$

ここで， $t = \cos x$ とおき， $\frac{dt}{dx} = (\cos x)' = -\sin x$ ， $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた．

例 6.10 (置換積分の使用例)

$$\int \cot x \, dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{(\sin t)'}{\sin x} dx = \int \frac{\frac{dt}{dx} dx}{t} dt = \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C = \log |\sin x| + C.$$

ここで, $t = \sin x$ とおき, $\frac{dt}{dx} = \cos x$, $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた.

例 6.11 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a} \int \frac{\left(\frac{x}{a}\right)'}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{\frac{dt}{dx} dx}{1 + t^2} dt \\ &= \frac{1}{a} \int \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{1}{a} \text{Tan}^{-1} t + C = \frac{1}{a} \text{Tan}^{-1} \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

ここで, $t = \frac{x}{a}$ とおき, $\frac{dt}{dx} = \left(\frac{x}{a}\right)' = \frac{1}{a}$, $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた.

例 6.12 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a \left(\frac{x}{a}\right)'}{a \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx = \int \frac{\left(\frac{x}{a}\right)'}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx \\ &= \int \frac{\frac{dt}{dx} dx}{\sqrt{1 - t^2}} dt = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \text{Sin}^{-1} t + C = \text{Sin}^{-1} \left(\frac{x}{a}\right) + C. \end{aligned}$$

ここで, $t = \frac{x}{a}$ とおき, $\frac{dt}{dx} = \left(\frac{x}{a}\right)' = \frac{1}{a}$, $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた.

例 6.13 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} (a \cos t) \, dt = a^2 \int \cos^2 t \, dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) \, dt \\ &= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t = \frac{a^2}{2} \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C. \end{aligned}$$

ここで, $x = a \sin t$ とおき, $\frac{dx}{dt} = a \cos t$ を用いて積分し,

$$\sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \sin t \sqrt{1 - \sin^2 t} = 2 \frac{x}{a} \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} = 2 \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2}$$

を用いて変形した.

例 6.14 (置換積分の使用例)

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx = \int \frac{\left(\frac{x}{a}\right)'}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx = \sinh^{-1} \left(\frac{x}{a}\right) + C.$$

これで不定積分は得られたが他の表現も考える. 逆双曲線関数は

$$\sinh^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

とも表される．これを用いると不定積分は

$$I = \log \left(\frac{x}{a} + \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + 1} \right) + C$$

となる．またこれを変形すると

$$I = \log \frac{1}{a} \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C = \log \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C - \log a$$

となる． C は任意の定数なので $C - \log a$ をあらためて C とおき直すと

$$I = \log \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$$

を得る．以上得られた結果は任意定数分の不定性を除けば全て同じ不定積分である．

注意 6.15 (不定積分の関数の表現) 不定積分は計算の方法により得られる結果が一見すると違うときがある．これは不定積分が任意定数の不定性をもつためである．注意が必用である．

例 6.16 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1} = \frac{1}{a} \int \frac{\left(\frac{x}{a}\right)'}{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1} dx = \frac{1}{a} \int \frac{\frac{dt}{dx}}{t^2 - 1} \frac{dx}{dt} dt = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{t^2 - 1} \\ &= \frac{1}{a} \operatorname{Tanh}^{-1} t + C = \frac{1}{a} \operatorname{Tanh}^{-1} \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

ここで, $t = \frac{x}{a}$ とおき, $\frac{dt}{dx} = \left(\frac{x}{a}\right)' = \frac{1}{a}$, $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた．

例 6.17 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right) dx = \frac{1}{2a} (\log |x - a| - \log |x + a|) + C \\ &= \frac{1}{2a} \log \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C. \end{aligned}$$

例 6.18 (置換積分の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(x+2) dx}{\sqrt{1-2x^2}} = \int \frac{x dx}{\sqrt{1-2x^2}} + \int \frac{2 dx}{\sqrt{1-2x^2}} = \int x (1-2x^2)^{-\frac{1}{2}} dx + \int \frac{2 dx}{\sqrt{1-(\sqrt{2}x)^2}} \\ &= -\frac{1}{4} \int (1-2x^2)' (1-2x^2)^{-\frac{1}{2}} dx + 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{(\sqrt{2}x)' dx}{\sqrt{1-(\sqrt{2}x)^2}} \\ &= -\frac{1}{4} \cdot 2 \cdot (1-2x^2)^{\frac{1}{2}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \operatorname{Sin}^{-1}(\sqrt{2}x) + C = -\frac{1}{2} \sqrt{1-2x^2} + \sqrt{2} \operatorname{Sin}^{-1}(\sqrt{2}x) + C. \end{aligned}$$

例 6.19 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2x-1}{x^2-2x+1} dx = \int \frac{(2x-2)+1}{x^2-2x+1} dx = \int \frac{(x^2-2x+1)'}{x^2-2x+1} dx + \int \frac{dx}{(x-1)^2} \\ &= \log |x^2-2x+1| + \frac{1}{x-1} + C = \log(x-1)^2 + \frac{1}{x-1} + C = 2 \log |x-1| + \frac{1}{x-1} + C. \end{aligned}$$

例 6.20 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1+x}{1+x^2} dx = \int \frac{dx}{1+x^2} + \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= \int \frac{dx}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2)'}{1+x^2} dx = \text{Tan}^{-1}x + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

例 6.21 (置換積分の計算例)

$$I = \int \frac{x}{1+x^4} dx = \int \frac{x}{1+t^2} \frac{1}{2x} dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1}t + C = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1}x^2 + C.$$

$t = x^2$ とおき, $\frac{dt}{dx} = 2x$, $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2x}$ を用いた.

例 6.22 (置換積分の計算例)

$$I = \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{1-t^2}} \frac{1}{3x^2} dt = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{3} \text{Sin}^{-1}t + C = \frac{1}{3} \text{Sin}^{-1}x^3 + C.$$

ここで, $t = x^3$ とおき, $\frac{dt}{dx} = 3x^2$, $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{3x^2}$ を用いた.

例 6.23 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{2-x}} = \int \frac{2t}{t\sqrt{2-t^2}} dt = 2 \int \frac{dt}{\sqrt{2-t^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{1-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2}} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \int \frac{\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)'}{\sqrt{1-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2}} dt = 2 \text{Sin}^{-1}\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) + C = 2 \text{Sin}^{-1}\sqrt{\frac{x}{2}} + C. \end{aligned}$$

ここで, $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$ とおき, $\frac{dx}{dt} = 2t$ を用いた.

6.5 部分積分法

定理 6.24 (部分積分法)

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

これを部分積分法 (integration by parts) という.

(証明) 関数 $f(x)g(x)$ を微分すると積の微分公式より

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

を得る. これを両辺を x で積分すると

$$f(x)g(x) = \int (f(x)g(x))' dx = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx$$

となる. 移項すると証明終了.

例 6.25 (部分積分法の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \log x \, dx = \int \log x (x)' \, dx = x \log x - \int (\log x)' x \, dx \\ &= x \log x - \int \frac{1}{x} x \, dx = x \log x - \int dx = x \log x - x + C. \end{aligned}$$

例 6.26 (部分積分法の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int x \sin x \, dx = \int x (-\cos x)' \, dx = -x \cos x + \int (x)' \cos x \, dx \\ &= -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

例 6.27 (部分積分法の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int x^2 \sin x \, dx = \int x^2 (-\cos x)' \, dx = -x^2 \cos x + \int (x^2)' \cos x \, dx \\ &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x (\sin x)' \, dx \\ &= -x^2 \cos x + 2x \sin x - 2 \int \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C \\ &= 2x \sin x + (2 - x^2) \cos x + C. \end{aligned}$$

例 6.28 (部分積分法の使用例)

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \int x' \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{(x^2 - a^2) + a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = x \sqrt{a^2 - x^2} - \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx + a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} - I + \frac{a^2 a}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} \left(\frac{x}{a}\right)' \, dx = x \sqrt{a^2 - x^2} - I + a^2 \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a} + C \end{aligned}$$

より,

$$2I = \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a}$$

であり,

$$I = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a} + C$$

を得る.

例 6.29 (部分積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = - \int x \left(\sqrt{a^2 - x^2} \right)' \, dx = -x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \\ &= -x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a} + C = -\frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \text{Sin}^{-1} \frac{x}{a} + C. \end{aligned}$$

例 6.30 (部分積分法の使用例) 不定積分

$$I = \int e^{ax} \sin bx \, dx, \quad J = \int e^{ax} \cos bx \, dx$$

を求める．部分積分より

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a} \int (e^{ax})' \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} J, \\ J &= \frac{1}{a} \int (e^{ax})' \cos bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} I \end{aligned}$$

が成り立つ．これは

$$\begin{aligned} aI + bJ &= a^{ax} \sin bx, \\ bI - aJ &= -a^{ax} \cos bx \end{aligned}$$

と書ける．よって，

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx), \\ J &= \frac{1}{a^2 + b^2} e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx) \end{aligned}$$

を得る．

例 6.31 (漸化式による不定積分の求積) 不定積分

$$I_n = \int \cos^n x \, dx, \quad J_n = \int \sin^n x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

を考える． $n = 0$ のとき

$$I_0 = \int dx = x + C, \quad J_0 = \int dx = x + C$$

を得る． $n = 1$ のとき

$$I_1 = \int \cos x \, dx = \sin x + C, \quad J_1 = \int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

を得る． $n \geq 2$ のときを考える． I_n を部分積分を用いて計算すると

$$\begin{aligned} I_n &= \int \cos^n x \, dx = \int \cos^{n-1} x \cos x \, dx = \int \cos^{n-1} x (\sin x)' \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x - \int (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x) \sin x \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x \sin^2 x \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x (1 - \cos^2 x) \, dx \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \left\{ \int \cos^{n-2} x \, dx - \int \cos^n x \, dx \right\} \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1)(I_{n-2} - I_n) \\ &= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n \end{aligned}$$

となる． I_n を移項すると

$$\begin{aligned}(1 + (n - 1))I_n &= \cos^{n-1} x \sin x + (n - 1)I_{n-2} \\ n I_n &= \cos^{n-1} x \sin x + (n - 1)I_{n-2} \\ I_n &= \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \left(1 - \frac{1}{n}\right) I_{n-2}\end{aligned}$$

を得る．最後の式は漸化式である．この漸化式より不定積分 I_n が求まる．同様にして

$$J_n = -\frac{1}{n} \cos x \sin^{n-1} x + \left(1 - \frac{1}{n}\right) J_{n-2}$$

を得る．

問 6.32 (漸化式による不定積分の求積) J_n についての漸化式を求めよ．

注意 6.33 (三角関数の不定積分の計算例) I_n, J_n は n 倍角の公式を用いても求積される．

6.6 演習 ~ 不定積分，置換積分，部分積分

問 6.34 (不定積分) 次の不定積分を書け．

$$\begin{aligned}(1) \int dx & \quad (2) \int x^3 dx & (3) \int x^4 dx & (4) \int \frac{dx}{x} & (5) \int \frac{dx}{x^4} & (6) \int \frac{dx}{x^5} & (7) \int \sqrt{x} dx \\ (8) \int e^x dx & (9) \int 2^x dx & (10) \int 3^x dx & (11) \int \sin x dx & (12) \int \cos x dx & (13) \int \frac{dx}{\cos^2 x} \\ (14) \int \sinh x dx & (15) \int \cosh x dx & (16) \int \frac{dx}{\cosh^2 x} & (17) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} & (18) \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \\ (19) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} & (20) \int \frac{dx}{1+x^2} & (21) \int \frac{dx}{x^2-1} & (22) \int \frac{dx}{1-x^2}\end{aligned}$$

問 6.35 (不定積分の計算) 次の不定積分を求めよ．

$$\begin{aligned}(1) \int x^8 dx & \quad (2) \int (x^2 - 3x + 1) dx & (3) \int (x^3 - 2x) dx & (4) \int (x^3 - x^2 + 3x - 2) dx \\ (5) \int (5x^4 + 6x^2) dx & (6) \int \frac{dx}{x^3} & (7) \int \left(x^7 + \frac{1}{x^9}\right) dx & (8) \int \frac{(x+1)^2}{x^2} dx & (9) \int \frac{1+x}{x^3} dx \\ (10) \int \frac{1+x^3}{x^4} dx & (11) \int \sqrt[4]{x} dx & (12) \int (1+x)\sqrt[3]{x} dx & (13) \int \frac{2x+3}{\sqrt{x}} dx \\ (14) \int (2 \cos x - 3 \sin x) dx & (15) \int (4 \sin x - 3 \cos x) dx & (16) \int \cos^2 x dx \quad (\text{倍角})\end{aligned}$$

問 6.36 (置換積分法) 次の不定積分を求めよ．

(ヒント: $\int (\phi(x))^\alpha \phi'(x) dx$)

$$\begin{aligned}(1) \int (ax + b)^m dx & \quad (2) \int 3x^2(x^3 + 2)^3 dx & (3) \int x^2(x^3 + 1)^4 dx & (4) \int (2x + 5)^6 dx \\ (5) \int (2x^3 + 1)(x^4 + 2x)^{10} dx & (6) \int \frac{x}{(1+x^2)^3} dx & (7) \int \frac{x-1}{x^2-2x+1} dx & (8) \int \sqrt[3]{1+x} dx \\ (9) \int x\sqrt{1-x^2} dx & (10) \int \sqrt{x^2-x^4} dx & (11) \int \frac{dx}{\sqrt{1+3x}} & (12) \int \frac{x^2}{\sqrt{2x^3-5}} dx \\ (13) \int (e^x + 1)^2 e^x dx & (14) \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx & (15) \int \frac{dx}{\tan x} & (16) \int \tan x dx\end{aligned}$$

$$(17) \int \tanh x \, dx \quad (18) \int \frac{2x-1}{x^2-2x+1} \, dx \quad (2 \text{ つに分ける}) \quad (19) \int \frac{1+x}{1+x^2} \, dx \quad (2 \text{ つに})$$

(ヒント: 多項式)

$$(20) \int \cos(ax+b) \, dx \quad (t = ax+b) \quad (21) \int \frac{dx}{x^2+4} \quad (t = x/2) \quad (22) \int \frac{dx}{a^2+x^2} \quad (t = x/a)$$

$$(23) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \quad (24) \int \frac{dx}{x^2-a^2} \quad (25) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} \quad (26) \int \frac{dx}{x^2+2x+2} \quad (t = x+1)$$

$$(27) \int \frac{x}{\sqrt{1-(x+2)^2}} \, dx \quad (t = x+2) \quad (28) \int \frac{x+2}{\sqrt{1-2x^2}} \, dx \quad (2 \text{ つに})$$

$$(29) \int x \cos(2x^2+1) \, dx \quad (t = 2x^2+1) \quad (30) \int x e^{x^2} \, dx \quad (t = x^2)$$

$$(31) \int x \log(x^2+1) \, dx \quad (t = x^2+1) \quad (32) \int \frac{x}{1+x^4} \, dx \quad (t = x^2)$$

$$(33) \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^6}} \, dx \quad (t = x^3) \quad (34) \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \quad (x = t^2)$$

(ヒント: $t = \sin x, t = \cos x, t = e^x, t = \log x$)

$$(35) \int \frac{\cos x}{1+\sin x} \, dx \quad (36) \int \frac{2 \cos x}{1+3 \sin x} \, dx \quad (37) \int \cos^3 x \, dx \quad (\cos^3 x = \cos x(1-\sin^2 x))$$

$$(38) \int \sqrt{a^2-x^2} \, dx \quad (x = \sin t) \quad (39) \int \frac{dx}{e^x+e^{-x}} \quad (40) \int \frac{\log x}{x} \, dx \quad (41) \int \log x^{\frac{1}{x}} \, dx$$

$$(42) \int \frac{dx}{x \log x}$$

問 6.37 (部分積分法) 次の不定積分を求めよ .

$$(1) \int x^2 e^x \, dx \quad (2) \int x^2 e^{-x} \, dx \quad (3) \int x^2 e^{3x} \, dx \quad (4) \int \log x \, dx \quad (5) \int x \log x \, dx$$

$$(6) \int x \sin x \, dx \quad (7) \int x^2 \sin x \, dx \quad (8) \int x^2 \cos x \, dx \quad (9) \int \sin^{-1} x \, dx \quad (10) \int \tan^{-1} x \, dx$$

$$(11) \int x \sqrt{1+x} \, dx \quad (12) \int \sqrt{a^2-x^2} \, dx \quad (13) \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx$$

問 6.38 (部分積分法) 次の不定積分を求めよ .

$$I = \int e^{ax} \cos bx \, dx, \quad J = \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

問 6.39 (部分積分法) 次の不定積分を求めよ .

$$I_n = \int \cos^n x \, dx, \quad J_n = \int \sin^n x \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

6.7 有理関数の積分

有理関数

$$f(x) = \frac{a_0 x^N + a_1 x^{N-1} + \dots + a_N}{b_0 x^M + b_1 x^{M-1} + \dots + b_M} \quad (N, M \in \mathbb{N})$$

の不定積分

$$I = \int f(x) \, dx$$

を考える . 任意の有理関数は積分可能である .

Step 1 (分子を分母で割る) 分子の次数 N が分母の次数 M 以上のときはまず割り算を行い,

$$f(x) = N - M \text{ 次の多項式} + \frac{M - 1 \text{ 次以下の多項式}}{M \text{ 次の多項式}}$$

とする. このとき多項式の部分は必ず積分が可能である. よって以後では分子の次数 N は分母の次数 M より小さい ($N < M$) とする.

Step 2 (分母を因数分解する) 有理式を $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ とする. 分母の多項式 $q(x)$ を実数の範囲で因数分解する. このとき

$$q(x) = (x + b_1)^{m_1}(x + b_2)^{m_2} \cdots (x^2 + c_i x + d_i)^{m_i}(x^2 + c_{i+1} x + d_{i+1})^{m_{i+1}} \cdots$$

と表される. m_j は重複度である. 2 次式の判別式は負である.

Step 3 (部分分数分解する) 有理式 $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ を部分分数分解する. すなわち

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(x)}{(x + b_1)^{m_1}(x + b_2)^{m_2} \cdots (x^2 + c_i x + d_i)^{m_i}(x^2 + c_{i+1} x + d_{i+1})^{m_{i+1}} \cdots} \\ &= \frac{A_{1,1}}{x + b_1} + \frac{A_{1,2}}{(x + b_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1,m_1}}{(x + b_1)^{m_1}} \\ &\quad + \frac{A_{2,1}}{x + b_2} + \frac{A_{2,2}}{(x + b_2)^2} + \cdots + \frac{A_{2,m_2}}{(x + b_2)^{m_2}} + \cdots \\ &\quad \cdots + \frac{A_{i,1}x + B_{i,1}}{x^2 + c_i x + d_i} + \frac{A_{i,2}x + B_{i,2}}{(x^2 + c_i x + d_i)^2} + \cdots + \frac{A_{i,m_i}x + B_{i,m_i}}{(x^2 + c_i x + d_i)^{m_i}} + \cdots \end{aligned}$$

と変形する.

問 6.40 (部分分数分解) 任意の有理式 $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ ($N \leq M$) は上式のように部分分数分解される. これを示せ.

Step 4 (部分分数ごとに積分する) 部分分数ごとに積分を行う. すなわち

$$\begin{aligned} I &= \int f(x) dx \\ &= A_{1,1} \int \frac{dx}{x + b_1} + A_{1,2} \int \frac{dx}{(x + b_1)^2} + \cdots + A_{1,m_1} \int \frac{dx}{(x + b_1)^{m_1}} \\ &\quad + A_{2,1} \int \frac{dx}{x + b_2} + A_{2,2} \int \frac{dx}{(x + b_2)^2} + \cdots + A_{2,m_2} \int \frac{dx}{(x + b_2)^{m_2}} + \cdots \\ &\quad \cdots + \int \frac{A_{i,1}x + B_{i,1}}{x^2 + c_i x + d_i} dx + \int \frac{A_{i,2}x + B_{i,2}}{(x^2 + c_i x + d_i)^2} dx + \cdots + \int \frac{A_{i,m_i}x + B_{i,m_i}}{(x^2 + c_i x + d_i)^{m_i}} dx + \cdots \end{aligned}$$

を計算する. それぞれの場合ごとに積分を考える.

分母の因子が 1 次式の場合

$$\int \frac{dx}{(x + b)^m}$$

の積分を行なう. $m = 1$ のとき

$$\text{Type 1: } \int \frac{dx}{x + b} = \log |x + b| + C$$

となる . $m = 2, 3, \dots$ のときは

$$\text{Type 2: } \int \frac{dx}{(x+b)^m} = \frac{-1}{m-1} \frac{1}{(x+b)^{m-1}} + C$$

となる .

分母の因子が 2 次式の場合の積分を行なう . 2 次式の判別式が負であることに注意すると

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{(x^2+cx+d)^m} dx &= \int \frac{Ax+B}{\left(\left(x+\frac{c}{2}\right)^2 + \left(d-\frac{c^2}{4}\right)\right)^m} dx = \int \frac{Ax+B}{((x-a)^2+b^2)^m} dx \\ &= \int \frac{A(x-a) + (aA+B)}{((x-a)^2+b^2)^m} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^m} dx + (aA+B) \int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^m} \\ &= \frac{A}{2} I_m + (aA+B) J_m \end{aligned}$$

と表される . ここで $-a = \frac{c}{2}, b^2 = d - \frac{c^2}{4} > 0, b > 0$ とおき ,

$$I_m = \int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^m} dx, \quad J_m = \int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^m}$$

とおいた . 積分 I_1 は

$$\begin{aligned} \text{Type 3: } I_1 &= \int \frac{2(x-a)}{(x-a)^2+b^2} dx = \int \frac{((x-a)^2+b^2)'}{(x-a)^2+b^2} dx \\ &= \log |(x-a)^2+b^2| + C = \log |x^2+cx+d| + C \end{aligned}$$

となり , $I_m (m = 2, 3, \dots)$ は

$$\begin{aligned} \text{Type 4: } I_m &= \int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^m} dx = \int \frac{((x-a)^2+b^2)'}{((x-a)^2+b^2)^m} dx \\ &= \frac{-1}{m-1} \frac{1}{((x-a)^2+b^2)^{m-1}} + C = \frac{-1}{(m-1)(x^2+cx+d)^{m-1}} + C \end{aligned}$$

と求まる . 第二項目の積分 J_m を計算する . $m = 1$ のとき

$$\begin{aligned} \text{Type 5: } J_1 &= \int \frac{dx}{(x-a)^2+b^2} = \frac{1}{b^2} \int \frac{dx}{1+\left(\frac{x-a}{b}\right)^2} = \frac{1}{b} \int \frac{\left(\frac{x-a}{b}\right)'}{1+\left(\frac{x-a}{b}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{b} \text{Tan}^{-1} \left(\frac{x-a}{b} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{4d-c^2}} \text{Tan}^{-1} \left(\frac{2x+c}{\sqrt{4d-c^2}} \right) + C \end{aligned}$$

となる . $m \geq 2$ のときは漸化式

$$\begin{aligned} \text{Type 6: } J_m &= \left(\frac{2m-3}{2m-2} \right) \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^2} \frac{x-a}{((x-a)^2+b^2)^{m-1}} \\ &= \frac{4(2m-3)}{(4d-c^2)(2m-2)} J_{m-1} + \frac{2x+c}{(m-1)(4d-c^2)(x^2+cx+d)^{m-1}} \end{aligned}$$

より J_m が定まる . これを示す . $t = \frac{x-a}{b}$ において置換積分を用いると

$$J_m = \int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^m} = \frac{1}{b^{2m-1}} \int \frac{\left(\frac{x-a}{b}\right)'}{\left(1+\left(\frac{x-a}{b}\right)^2\right)^m} dx = \frac{1}{b^{2m-1}} \int \frac{dt}{(1+t^2)^m}$$

となる．分子を変形すると

$$J_m = \frac{1}{b^{2m-1}} \int \frac{(1+t^2) - t^2}{(1+t^2)^m} dt = \frac{1}{b^{2m-1}} \int \frac{dt}{(1+t^2)^{m-1}} - \frac{1}{b^{2m-1}} \int \frac{t^2}{(1+t^2)^m} dt$$

第1項は J_{m-1} であり，第2項を部分積分すると

$$\begin{aligned} J_m &= \frac{J_{m-1}}{b^2} - \frac{1}{b^{2m-1}} \int t \times \frac{t}{(1+t^2)^m} dt = \frac{J_{m-1}}{b^2} - \frac{1}{b^{2m-1}} \int t \left(\frac{-1}{2(m-1)} \frac{1}{(1+t^2)^{m-1}} \right)' dt \\ &= \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^{2m-1}} \int t \left(\frac{1}{(1+t^2)^{m-1}} \right)' dt \\ &= \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^{2m-1}} \left\{ \frac{t}{(1+t^2)^{m-1}} - \int \frac{1}{(1+t^2)^{m-1}} dt \right\} \end{aligned}$$

となる．残った積分も J_{m-1} である．式変形してまとめると

$$\begin{aligned} J_m &= \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^{2m-1}} \frac{t}{(1+t^2)^{m-1}} - \frac{J_{m-1}}{2(m-1)b^2} = \left(\frac{2m-3}{2m-2} \right) \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^{2m-1}} \frac{t}{(1+t^2)^{m-1}} \\ &= \left(\frac{2m-3}{2m-2} \right) \frac{J_{m-1}}{b^2} + \frac{1}{2(m-1)b^2} \frac{x-a}{((x-a)^2 + b^2)^{m-1}} \end{aligned}$$

となり漸化式を得る．

例 6.41 (分子の次数を下げる)

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{x^2 + 3} = x + 4 - \frac{x + 11}{x^2 + 3}$$

例 6.42 (分母の因数分解)

$$\begin{aligned} q(x) &= x^2 + 3, \\ q(x) &= x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1), \\ q(x) &= x^3 + x^2 - 2x = x(x-1)(x+2), \\ q(x) &= x^4 - x^3 + x + 1 = (x-1)^2(x^2 + x + 1), \\ q(x) &= x^8 + x^7 + 2x^6 + 2x^5 + x^4 + x^3 = x^3(x+1)(x^2+1)^2. \end{aligned}$$

例 6.43 (部分分数展開の具体例)

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1+x} \\ \frac{x}{(1+x)^2} &= \frac{(1+x) - 1}{(1+x)^2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \\ \frac{x}{(1+x)^3} &= \frac{(1+x) - 1}{(1+x)^3} = \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \\ \frac{x^2}{(1+x)^3} &= \frac{(1+x)^2 - 2(1+x) + 1}{(1+x)^3} = \frac{1}{1+x} - \frac{2}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+x)^3} \\ \frac{x^2 - 2x + 1}{(1+x)^3} &= \left(\frac{1}{1+x} - \frac{2}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+x)^3} \right) - 2 \left(\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right) + \frac{1}{(1+x)^3} \\ &= \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2} + \frac{4}{(1+x)^3} \end{aligned}$$

問 6.44 (部分分数展開の計算例) 部分分数分解として

$$\frac{1}{x^4 - x^3 + x + 1} = \frac{1}{(x-1)^2(x^2 + x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + x + 1}$$

とする。係数 A, B, C, D を定めよ。

問 6.45 (部分分数展開の計算例) 部分分数分解として

$$\frac{1}{x^3(x+1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x+1} + \frac{Ex + F}{x^2+1} + \frac{Gx + H}{(x^2+1)^2}$$

とする。係数 A, B, C, D, E, F, G, H を定めよ。

例 6.46 (部分分数の積分の計算例)

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^3(x+1)(x^2+1)^2} &= A \int \frac{dx}{x} + B \int \frac{dx}{x^2} + C \int \frac{dx}{x^3} + D \int \frac{dx}{x+1} \\ &\quad + E \int \frac{x}{x^2+1} dx + F \int \frac{dx}{x^2+1} + G \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx + H \int \frac{dx}{(x^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Type 1:

$$\int \frac{dx}{x} = \log|x| + C, \quad \int \frac{dx}{x+1} = \log|x+1| + C.$$

Type 2:

$$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C, \quad \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

Type 3:

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C.$$

Type 4:

$$\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} dx = -\frac{1}{2(x^2+1)} + C.$$

Type 5:

$$\int \frac{dx}{x^2+1} = \text{Tan}^{-1}x + C.$$

Type 6: これはあとの例題で示す。

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$$

例 6.47 (有理式関数の不定積分の具体例) (**Type 1** のみ) 不定積分

$$\int \frac{x+1}{x^3+x^2-2x} dx$$

を計算する．まず，部分分数分解する．

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{x^3+x^2-2x} &= \frac{x+1}{x(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} \\ &= \frac{(A+B+C)x^2 + (A+2B-C)x - 2A}{x(x-1)(x+2)}\end{aligned}$$

とおくと，

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

であり，これを解くと

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{2}{3}, \quad C = -\frac{1}{6}$$

となる．よって

$$\frac{x+1}{x^3+x^2-2x} = -\frac{1}{2x} + \frac{2}{3(x-1)} - \frac{1}{6(x+2)}$$

を得る．これを積分して

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{x+1}{x^3+x^2-2x} dx = \int \left(-\frac{1}{2x} + \frac{2}{3(x-1)} - \frac{1}{6(x+2)} \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x+2} = -\frac{1}{2} \log|x| + \frac{2}{3} \log|x-1| - \frac{1}{6} \log|x+2| + C \\ &= \frac{1}{6} \log \left| \frac{(x-1)^4}{x^3(x+2)} \right| + C\end{aligned}$$

を得る．

例 6.48 (有理式関数の不定積分の具体例) (Type 1, 3, 5) 不定積分

$$I = \int \frac{dx}{x^3+1}$$

を計算する．まず，部分分数分解として

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}$$

とする．通分して同じ次数でまとめると

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{(A+B)x^2 + (B+C-A)x + (A+C)}{x^3+1}$$

となる．よって係数は

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

を満足しなければならない．これを解くと

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}$$

となる．よって部分分数分解は

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)}$$

と表される．よって，

$$\begin{aligned} I &= \int \left(\frac{1}{3(x+1)} - \frac{x-2}{3(x^2-x+1)} \right) dx = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx \\ &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{3} \int \frac{(x-\frac{1}{2}) - \frac{3}{2}}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{3} \int \frac{(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{\left((x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \right)'}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \frac{4\sqrt{3}}{3 \cdot 2} \int \frac{\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)'}{1 + \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right)^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \log|x+1| - \frac{1}{6} \log \left(\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4} \right) + \frac{\sqrt{3}}{3} \text{Tan}^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + C \\ &= \frac{1}{6} \log \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \text{Tan}^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + C \end{aligned}$$

を得る．

例 6.49 (有理式関数の不定積分の具体例) (Type 1, 3, 5) 不定積分

$$I = \int \frac{x-11}{x^3+1} dx$$

を計算する．まず

$$\frac{x-11}{x^3+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} = \frac{(A+B)x^2 + (-A+B+C)x + (A+C)}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

とおくと

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -11 \end{bmatrix}$$

より

$$A = -4, \quad B = 4, \quad C = -7$$

が定まる．よって

$$\frac{x-11}{x^3+1} = \frac{-4}{x+1} + \frac{4x-7}{x^2-x+1}$$

となる．これより

$$\begin{aligned}
 I &= -4 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{4x-7}{x^2-x+1} dx = -4 \log|x+1| + \int \frac{4(x-\frac{1}{2})-5}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx \\
 &= -4 \log|x+1| + 4 \int \frac{(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx - 5 \int \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx \\
 &= -4 \log|x+1| + 2 \int \frac{\left((x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}\right)'}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx - \frac{10}{\sqrt{3}} \int \frac{\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)'}{1+\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2} dx \\
 &= -4 \log|x+1| + 2 \log\left(\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right) - \frac{10}{\sqrt{3}} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C \\
 &= 2 \log \frac{x^2-x+1}{(x+1)^2} - \frac{10}{\sqrt{3}} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right) + C
 \end{aligned}$$

を得る．

例 6.50 (有理式関数の不定積分の具体例) (Step1, Type 3, 5) 不定積分

$$I = \int \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{x^2 + 3} dx$$

を計算する．分子の次数が分母の次数以上であるから，分子を分母で割り

$$I = \int \left(x + 4 - \frac{x+11}{x^2+3}\right) dx = \int (x+4) dx - \int \frac{x+11}{x^2+3} dx = \frac{x^2}{2} + 4x - \int \frac{x+11}{x^2+3} dx$$

のように変形する．多項式部分は積分される．残るは有理式の積分である．これを計算すると

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+11}{x^2+3} dx &= \int \frac{x}{x^2+3} dx + 11 \int \frac{dx}{x^2+3} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+3)'}{x^2+3} dx + \frac{11\sqrt{3}}{3} \int \frac{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)'}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2} dx = \frac{1}{2} \log(x^2+3) + \frac{11}{\sqrt{3}} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C
 \end{aligned}$$

となる．よって

$$I = \frac{x^2}{2} + 4x - \frac{1}{2} \log(x^2+3) - \frac{11}{\sqrt{3}} \text{Tan}^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C$$

を得る．

例 6.51 (有理式関数の不定積分の具体例) (Type 6) $a=0, b=1$ の場合の J_m を求める．

$$\begin{aligned}
 J_2 &= \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{(1+x^2)-x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int \frac{1+x^2}{(1+x^2)^2} dx - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx \\
 &= \int \frac{dx}{1+x^2} - \int x \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = \text{Tan}^{-1}x - \int x \left(\frac{-1}{2}\right) \left(\frac{1}{1+x^2}\right)' dx \\
 &= \text{Tan}^{-1}x + \frac{1}{2} \int x \left(\frac{1}{1+x^2}\right)' dx = \text{Tan}^{-1}x + \frac{1}{2} x \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \text{Tan}^{-1}x + \frac{x}{2(1+x^2)} - \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1}x + C = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1}x + \frac{x}{2(1+x^2)} + C.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
J_3 &= \int \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \int \frac{(1+x^2) - x^2}{(1+x^2)^3} dx = \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} - \int \frac{x^2}{(1+x^2)^3} dx \\
&= J_2 + \frac{1}{4} \int x \left(\frac{1}{(1+x^2)^2} \right)' dx = J_2 + \frac{x}{4(1+x^2)^2} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} \\
&= J_2 + \frac{x}{4(1+x^2)^2} - \frac{1}{4} J_2 = \frac{3}{4} J_2 + \frac{x}{4(1+x^2)^2} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} x + \frac{x}{2(1+x^2)} \right) + \frac{x}{4(1+x^2)^2} + C \\
&= \frac{3}{8} \text{Tan}^{-1} x + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{x}{4(1+x^2)^2} + C.
\end{aligned}$$

例 6.52 (有理式の積分) (Type 5) 不定積分

$$I = \int \frac{x}{x^4 + 1} dx$$

を計算する．被積分関数の有理式の分母が 0 となるのは $x^4 + 1 = 0$ のときだから，代数方程式 $x^4 = -1$ を複素解も含めて解くと，

$$x^4 = -1 = e^{\pi + 2n\pi} \Rightarrow x = (e^{\pi + 2n\pi})^{\frac{1}{4}} = e^{\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}} \Rightarrow x = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \frac{1-i}{\sqrt{2}}, \frac{-1+i}{\sqrt{2}}, \frac{-1-i}{\sqrt{2}}$$

となる．複素解を順に $\alpha, \bar{\alpha}, \beta, \bar{\beta}$ とおくと，分母は

$$\begin{aligned}
x^4 + 1 &= (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})(x - \beta)(x - \bar{\beta}) = (x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + |\alpha|^2)(x^2 - (\beta + \bar{\beta})x + |\beta|^2) \\
&= (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)
\end{aligned}$$

と因数分解される．被積分関数の有理式を部分分数分解すると，

$$\frac{x}{x^4 + 1} = \frac{Ax + B}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + \sqrt{2}x + 1}$$

とおける．右辺を通分するとその分子は，

$$\begin{aligned}
&(Ax + B)(x^2 + \sqrt{2}x + 1) + (Cx + D)(x^2 - \sqrt{2}x + 1) \\
&= (A + C)x^3 + (\sqrt{2}A + B - \sqrt{2}C + D)x^2 + \sqrt{2}(A + B + C - D)x + (A + B + C + D)
\end{aligned}$$

となるので， $A + C = 0$ ， $\sqrt{2}A + B - \sqrt{2}C + D = 0$ ， $\sqrt{2}(A + B + C - D) = 1$ ， $A + B + C + D = 0$ において解くと， $A = 0$ ， $B = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ ， $C = 0$ ， $D = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ を得る．よって

$$\frac{x}{x^4 + 1} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} - \frac{1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right)$$

と書ける．よって積分は

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int \left(\frac{1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} - \frac{1}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} \right) dx = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left\{ \int \frac{dx}{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} - \int \frac{dx}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} \right\} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{1}{\frac{1}{2}} \left\{ \int \frac{dx}{2\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} - \int \frac{dx}{2\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1} \right\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ \int \frac{(\sqrt{2}x - 1)'}{1 + (\sqrt{2}x - 1)^2} dx - \int \frac{(\sqrt{2}x + 1)'}{1 + (\sqrt{2}x + 1)^2} dx \right\} \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \text{Tan}^{-1}(\sqrt{2}x - 1) - \text{Tan}^{-1}(\sqrt{2}x + 1) \right\} + C
\end{aligned}$$

となる．ここで，

$$\text{Tan}^{-1}x - \text{Tan}^{-1}y = \text{Tan}^{-1}z$$

をみたく z を x, y で表す． $\theta = \text{Tan}^{-1}x, \phi = \text{Tan}^{-1}y, \psi = \text{Tan}^{-1}z$ とおくと， $\theta - \phi = \psi$ となるので，両辺に \tan を作用させると，

$$z = \tan(\psi) = \tan(\theta - \phi) = \frac{\tan\theta - \tan\phi}{1 + \tan\theta \tan\phi} = \frac{x - y}{1 + xy} \Rightarrow \text{Tan}^{-1}x - \text{Tan}^{-1}y = \text{Tan}^{-1} \frac{x - y}{1 + xy}$$

を得る．これを用いると，

$$I = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} \frac{(\sqrt{2}x - 1) - (\sqrt{2}x + 1)}{1 + (\sqrt{2}x - 1)(\sqrt{2}x + 1)} + C = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} \frac{-1}{x^2} + C = -\frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} \frac{1}{x^2} + C$$

となる．また， $x = \tan\theta$ とすると，

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{\tan\theta} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \Rightarrow \text{Tan}^{-1} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \text{Tan}^{-1}x$$

となるので，

$$I = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} x^2 - \frac{\pi}{4} + C = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} x^2 + C$$

を得る．

6.8 1次式の根号を含む関数の積分

定理 6.53 (根号を含む場合の計算) 関数 $f(x)$ に根号 $\sqrt[n]{ax+b}$ ($a \neq 0$) を含む場合の不定積分を考える．変数変換

$$t = \sqrt[n]{ax+b}$$

とおき置換積分法で求積する．両辺を n 乗すると

$$x = \frac{t^n - b}{a}$$

を得る．またこれより

$$\frac{dx}{dt} = \frac{n t^{n-1}}{a}$$

が成り立つ．よって $f(x)$ の不定積分は

$$\int f(x) dx = \int f\left(\frac{t^n - b}{a}\right) \frac{dx}{dt} dt = \frac{n}{a} \int f\left(\frac{t^n - b}{a}\right) t^{n-1} dt$$

より求められる．

例 6.54 (根号を含む場合の計算例) 不定積分

$$I = \int \frac{dx}{x + 2\sqrt{x-1}}$$

を考える．まず

$$t = \sqrt{x-1}$$

とおく．これより

$$x = t^2 + 1, \quad \frac{dx}{dt} = 2t$$

となる．よって置換積分法より

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x+2\sqrt{x-1}} dt = \int \frac{1}{(t^2+1)+2t} \times (2t) dt = 2 \int \frac{t}{(t+1)^2} dt \\ &= 2 \int \frac{(t+1)-1}{(t+1)^2} dt = 2 \int \frac{dt}{t+1} - 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2} \\ &= 2 \log|t+1| + \frac{2}{t+1} + C = 2 \log(1+\sqrt{x-1}) + \frac{2}{1+\sqrt{x-1}} + C \end{aligned}$$

を得る．

例 6.55 (根号を含む不定積分) $t = \sqrt{x-1}$ において置換積分を行う：

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int \frac{2t}{(t^2+1)t} dt = 2 \int \frac{dt}{t^2+1} = \text{Tan}^{-1}t + C = \text{Tan}^{-1}\sqrt{x-1} + C.$$

例 6.56 (根号を含む不定積分) $t = \sqrt[3]{x}$, $x = t^3$, $dx/dt = 3t^2$ とおき，さらに $s = \sqrt{t}$, $t = s^2$, $dt/ds = 2s$ において置換積分する：

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx &= \int \frac{(\sqrt{t})^3 3t^2}{1+t} dt = 3 \int \frac{t^2(\sqrt{t})^3}{1+t} dt = 3 \int \frac{s^4 s^3 2s}{1+s^2} ds = 6 \int \frac{s^8}{1+s^2} ds \\ &= 6 \int \left(s^6 - s^4 + s^2 - 1 + \frac{1}{1+s^2} \right) ds = 6 \left(\frac{s^7}{7} - \frac{s^5}{5} + \frac{s^3}{3} - s + \text{Tan}^{-1}s \right) + C \\ &= \frac{6\sqrt{t^7}}{7} - \frac{6\sqrt{t^5}}{5} + 2\sqrt{t^3} - \sqrt{t} + 6\text{Tan}^{-1}\sqrt{t} + C \\ &= \frac{6x\sqrt[6]{x}}{7} - \frac{6\sqrt[6]{x^5}}{5} + 2\sqrt{x} - \sqrt[6]{x} + 6\text{Tan}^{-1}\sqrt[6]{x} + C. \end{aligned}$$

6.9 2次式の根号を含む関数の積分

定理 6.57 (根号を含む場合の計算) 関数 $f(x)$ に $\sqrt{ax^2+bx+c}$ ($a > 0$) を含む場合を考える．このときまず

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{a}x$$

とおく．両辺を二乗すれば

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}$$

を得る．これより

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2(\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a})}{(b + 2\sqrt{a}t)^2}$$

となる．このとき不定積分は

$$I = \int f(x) dx = \int f\left(\frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}\right) \frac{2(\sqrt{a}t^2 + bt + c\sqrt{a})}{(b + 2\sqrt{a}t)^2} dt$$

により求まる．

例 6.58 (根号を含む場合の計算例) 不定積分

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

を考える．変数変換

$$\sqrt{x^2 - 1} = t - x$$

とおく．両辺を二乗すれば

$$x = \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)$$

を得る．これより

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{t^2} \right)$$

となる．よって不定積分は

$$I = \int \frac{1}{t - \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right)} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{t^2} \right) dt = \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C = \log \left| x + \sqrt{x^2 - 1} \right| + C$$

と求まる．またこの結果は

$$I = \text{Cosh}^{-1} x + C$$

とも表される．

定理 6.59 (根号を含む場合の計算) 関数 $f(x)$ に $\sqrt{-a(x - \alpha)(x - \beta)}$ ($a > 0$) を含む場合を考える．このときまず

$$\sqrt{-a(x - \alpha)(x - \beta)} = (x - \alpha) \sqrt{\frac{a(\beta - x)}{x - \alpha}}$$

と変形し，

$$t = \sqrt{\frac{a(\beta - x)}{x - \alpha}}$$

とおく．このとき，

$$x = \alpha - \frac{a(\alpha - \beta)}{t^2 + a}, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{2a(\alpha - \beta)t}{(t^2 + a)^2}$$

となる．このとき不定積分は

$$I = \int f(x) dx = \int f\left(\alpha - \frac{a(\alpha - \beta)}{t^2 + a}\right) \frac{2a(\alpha - \beta)t}{(t^2 + a)^2} dt$$

により求まる．

例 6.60 (根号を含む場合の計算例) 不定積分

$$I = \int \frac{x}{\sqrt{2-x-x^2}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{-(x+2)(x-1)}} dx = \int \frac{x}{(x+2)\sqrt{\frac{1-x}{x+2}}} dx$$

を求める．変数変換

$$\sqrt{\frac{1-x}{x+2}} = t$$

とおく．このとき

$$x = \frac{1-2t^2}{1+t^2} = -2 + \frac{3}{1+t^2}, \quad \frac{dx}{dt} = -\frac{6t}{(1+t^2)^2}$$

である．よって

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{1-2t^2}{1+t^2} \frac{1}{\left(2-2+\frac{3}{1+t^2}\right)t} \left(-\frac{6t}{(1+t^2)^2}\right) dt = 2 \int \frac{2t^2-1}{(1+t^2)^2} dt \\ &= 4 \int \frac{dt}{1+t^2} - 6 \int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = 4 \operatorname{Tan}^{-1} t - 6 \int \frac{(1+t^2)-t^2}{(1+t^2)^2} dt \\ &= 4 \operatorname{Tan}^{-1} t - 6 \int \frac{dt}{1+t^2} + 6 \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = -2 \operatorname{Tan}^{-1} t - 3 \int t \left(\frac{1}{1+t^2}\right)' dt \\ &= -2 \operatorname{Tan}^{-1} t - \frac{3t}{1+t^2} + 3 \int \frac{dt}{1+t^2} = \operatorname{Tan}^{-1} t - \frac{3t}{1+t^2} + C \\ &= \operatorname{Tan}^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{x+2}} - \frac{3\sqrt{\frac{1-x}{x+2}}}{1+\frac{1-x}{x+2}} + C = \operatorname{Tan}^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{x+2}} - \sqrt{2-x-x^2} + C \end{aligned}$$

を得る．

6.10 三角関数の有理式の積分

三角関数の有理式 $f(\sin x, \cos x, \tan x)$ の不定積分を考える．まず変数変換として

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

とおく．このとき

$$\tan x = \tan\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2t}{1-t^2}$$

となる．同様にして

$$\begin{aligned} \sin x &= \sin\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) \frac{1}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos\left(2 \times \frac{x}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1 \\ &= 2 \frac{1}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} - 1 = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{aligned}$$

となる．次に $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ を x で微分すると

$$\frac{dt}{dx} = \left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)' = \frac{1}{2} \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{2} \left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}(1 + t^2)$$

となるので

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\frac{dt}{dx}} = \frac{2}{1 + t^2}$$

を得る．よって不定積分は

$$I = \int f(\sin x, \cos x, \tan x) dx = \int f\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1-t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

により求められる．

例 6.61 (三角関数を含む場合の積分の計算例)

$$I = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{dt}{t} = \log|t| + C = \log\left|\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right| + C.$$

例 6.62 (三角関数を含む場合の積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{\sin x + 2\cos x + 3} = \int \frac{1}{\frac{2t}{1+t^2} + 2\frac{1-t^2}{1+t^2} + 3} \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{2}{2t + 2(1-t^2) + 3(1+t^2)} dt \\ &= \int \frac{2}{t^2 + 2t + 5} dt = \int \frac{2}{(t+1)^2 + 4} dt = \int \frac{\left(\frac{t+1}{2}\right)'}{1 + \left(\frac{t+1}{2}\right)^2} dt = \text{Tan}^{-1} \frac{t+1}{2} + C \\ &= \text{Tan}^{-1} \frac{1}{2} \left(1 + \tan \frac{x}{2}\right) + C. \end{aligned}$$

6.11 演習 ~ 有理式，根号，三角関数の積分

問 6.63 (有理式の積分) 次の不定積分を求めよ．

- (1) $\int \frac{dx}{x}$ (2) $\int \frac{dx}{x^2}$ (3) $\int \frac{x}{x^2+1} dx$ (4) $\int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$ (5) $\int \frac{dx}{x^2+1}$ (6) $\int \frac{dx}{(x^2+1)^2}$
 (7) $\int \frac{dx}{(x^2+1)^3}$ (8) $\int \frac{dx}{ax+b}$ (9) $\int \frac{dx}{(ax+b)^m}$ (10) $\int \frac{2(x-a)}{(x-a)^2+b^2} dx$
 (11) $\int \frac{2(x-a)}{((x-a)^2+b^2)^m} dx$ (12) $\int \frac{dx}{(x-a)^2+b^2}$ (13) $\int \frac{dx}{((x-a)^2+b^2)^2}$
 (14) $\int \frac{x+1}{x^3+x^2-2x} dx$ (15) $\int \frac{dx}{x^3+1}$ (16) $\int \frac{x-11}{x^3+1} dx$ (17) $\int \frac{x^3+4x^2+2x+1}{x^3+3} dx$
 (18) $\int \frac{dx}{x^2-1}$ (19) $\int \frac{2}{x(x-1)(x-2)} dx$ (20) $\int \frac{5x-4}{2x^2+x-6} dx$ (21) $\int \frac{7x-1}{x^2-x-6} dx$
 (22) $\int \frac{x^2}{x^2-x-6} dx$ (23) $\int \frac{x^2}{(x-1)^3} dx$ (24) $\int \frac{dx}{x^2(1-x)^2}$ (25) $\int \frac{dx}{x^3(1-x)^3}$
 (26) $\int \frac{x-1}{(2-x)^3} dx$ (27) $\int \frac{5x+3}{(x+1)(x-1)^2} dx$ (28) $\int \frac{dx}{x^2+2x+2}$ (29) $\int \frac{x+2}{x^2+2x+2} dx$
 (30) $\int \frac{x^3-x+1}{x^2+1} dx$ (31) $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)}$ (32) $\int \frac{x-1}{(x+1)(x^2+1)} dx$
 (33) $\int \frac{2x}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$ (34) $\int \frac{x(x^2+3)}{(x^2-1)(x^2+1)^2} dx$ (35) $\int \frac{2x^2+4}{(x^2+1)^2} dx$

問 6.64 (有理式の積分) $J_n = \int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$ は次の漸化式をみたすことを示せ .

$$J_{n+1} = \frac{x}{2n(x^2 + 1)^n} + \frac{2n-1}{2n} J_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

問 6.65 (根号を含む積分) 次の不定積分を求めよ .

(ヒント : $t = \sqrt[n]{ax+b}$)

(1) $\int \frac{dx}{x+2\sqrt{x-1}}$ (2) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$ (3) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}$ (4) $\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}} dx$ (5) $\int \frac{x\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}} dx$

(ヒント : $\sqrt{ax^2+bx+c} = t - \sqrt{ax}$)

(6) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ (7) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ (8) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} dx$ (9) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$ (10) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-2x-5}}$

(ヒント : $\sqrt{a(x-\alpha)(\beta-x)} = (x-\alpha)\sqrt{\frac{a(\beta-x)}{x-\alpha}}, t = \sqrt{\frac{a(\beta-x)}{x-\alpha}}$)

(11) $\int \frac{x}{\sqrt{2-x-x^2}} dx$ (12) $\int \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{1-x^2}}$

問 6.66 (三角関数を含む有理式の積分) 次の不定積分を求めよ .

(ヒント : $t = \tan \frac{x}{2}$)

(1) $\int \frac{dx}{\sin x}$ (2) $\int \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 3}$ (3) $\int \frac{dx}{1 + \sin x - \cos x}$ (4) $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$
 (5) $\int \frac{dx}{2 + \cos x}$ (6) $\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} dx$ (7) $\int \frac{\cos x}{4 + 5 \sin x} dx$ (8) $\int \frac{dx}{3 - 2 \sin x}$
 (9) $\int \frac{dx}{5 + 3 \sin x}$ (10) $\int \frac{dx}{2 + \tan x}$ (11) $\int \frac{1 + \cos x}{(1 + \sin x)^2} dx$

6.12 定積分

定義 6.67 (定積分) 関数 $f(x)$ は有限区間 $[a, b]$ で連続とする . 区間 $[a, b]$ を

$$\Delta : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{k-1} < x_k < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

のように n 個の領域に分割する . 小区間 I_n の最小幅を $|\Delta| = \min_k (\Delta x_k)$ とする . 面積

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k, \quad \xi_k \in I_k = [x_k, x_{k-1}], \quad \Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

が分割の選び方に無関係に , $n \rightarrow \infty, |\Delta| \rightarrow 0$ のとき極限をもつならば , この極限を

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

と書き , 関数 $f(x)$ の a から b までの定積分 (definite integral) という . このとき $f(x)$ は積分可能であるという . 区間 $[a, b]$ を積分区間という .

注意 6.68 (定積分の意味) 区間 $[a, b]$ において x 軸と $y = f(x)$ とで囲まれた領域の符合付き面積である .

例 6.69 (定積分の具体例)

$$\begin{aligned} \int_a^b c \, dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c(x_k - x_{k-1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c((x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \cdots + (x_1 - x_0)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} c(x_n - x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} c(b - a) = c(b - a). \end{aligned}$$

定理 6.70 (積分可能) すべての分割 Δ に対して $S(\Delta) = s(\Delta)$ であるとき積分可能である。ここで $S(\Delta)$, $s(\Delta)$ は

$$S(\Delta) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k, \quad s(\Delta) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k, \quad M_k = \sup_{x \in I_k} f(x), \quad m_k = \inf_{x \in I_k} f(x)$$

である。

(証明) 分割 Δ の各領域をさらに分割した分割を細分といい、 Δ' とおくことにする。このとき明らかに

$$s(\Delta) \leq s(\Delta') \leq S(\Delta') \leq S(\Delta)$$

が成り立つ。

定理 6.71 (積分可能) 関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ で連続ならば積分可能である。

(証明) 区間 $I = [a, b]$ で $f(x)$ が連続であれば、 $f(x)$ は I で一様連続である。つまり、 $\forall \varepsilon > 0$ に対して、

$$x, x' \in I \quad |x - x'| < \exists \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

が成り立つ。 $|\Delta| < \delta$ のとき

$$x, x' \in I \quad |x - x'| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(x')| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad M_k - m_k < \varepsilon$$

6.13 定積分の性質

定理 6.72 (定積分の性質) 定積分は次の性質をもつ：

$$(1) \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx.$$

$$(2) f(x) \geq 0 \quad (a \leq x \leq b) \quad \text{のとき} \quad \int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

$$(3) f(x) \geq g(x) \quad (a \leq x \leq b) \quad \text{のとき} \quad \int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx.$$

$$(4) a < c < b \quad \text{のとき} \quad \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

$$(5) \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx.$$

$$(6) \int_a^a f(x) dx = 0.$$

$$(7) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

定理 6.73 (中間値の定理) 関数 $f(x)$ が区間 $[a, b]$ で連続で $m \leq f(x) \leq M$ であるとき, $m < \mu < M$ をみたす任意の μ に対して, $\mu = f(x)$ となる点 $x = c$ ($a < c < b$) が存在する.

定理 6.74 (定積分の性質) $a < b$ に対して $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$ をみたす $c \in (a, b)$ が存在する.

(証明) $m \leq f(x) \leq M$ のとき

$$\begin{aligned} \int_a^b m dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a) \\ \Rightarrow m &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M \Rightarrow m \leq \mu \leq M, \quad \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

が成り立つ. $m \leq \mu \leq M, m \leq f(x) \leq M$ より中間値の定理より

$$f(c) = \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

をみたす c が存在する.

6.14 定積分と不定積分

定理 6.75 (定積分と不定積分の関係) 定積分

$$S(x) = \int_a^x f(t) dt$$

に対して

$$\frac{dS}{dx} = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

が成り立つ.

(証明) 関数 $f(x)$ は連続関数であれば区間 $I = [x, x+h]$ において

$$m \leq f(x) \leq M, \quad m = \min_{x \in I} f(x), \quad M = \max_{x \in I} f(x)$$

をみたす. 全辺を区間 I で定積分すれば,

$$\begin{aligned} \int_x^{x+h} m dt &\leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq \int_x^{x+h} M dt \Rightarrow hm \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq hM \\ \Rightarrow m &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M \end{aligned}$$

が成り立つ．中辺は

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \frac{S(x+h) - S(x)}{h}$$

となるので，不等式は

$$m \leq \frac{S(x+h) - S(x)}{h} \leq M$$

となる． $h \rightarrow 0$ の極限においては $m \rightarrow f(x)$, $M \rightarrow f(x)$, $\frac{S(x+h) - S(x)}{h} \rightarrow \frac{dS}{dx}$ であるから， $\frac{dS}{dx} = f(x)$ を得る．

注意 6.76 (定積分と不定積分の関係) 関数 $f(x)$ の不定積分から得られる原始関数の一つを $F(x)$ とすると，

$$S'(x) = f(x) \quad \Rightarrow \quad S(x) = \int f(x) dx + C = F(x) + C$$

が成り立つ．

定理 6.77 (定積分と不定積分の関係) 関数 $f(x)$ の不定積分から得られる原始関数の一つを

$$F(x) = \int f(x) dx$$

とする．このとき $f(x)$ の a から b までの定積分は

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b = F(x) \Big|_{x=a}^{x=b}$$

と表される．

(証明)

$$\int_a^b f(t) dt = \int_0^b f(t) dt - \int_0^a f(t) dt = S(b) - S(a) = (F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a).$$

例 6.78 (定積分の計算例)

$$\int_a^b \alpha dx = \alpha \int_a^b dx = \alpha [x]_a^b = \alpha(b-a).$$

これは長方形の面積を表す．

例 6.79 (定積分の計算例)

$$\int_a^b x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = \frac{1}{2}(b-a)(b+a).$$

これは台形の面積を表す．

例 6.80 (定積分の計算例)

$$\int_0^1 x^5 dx = \left[\frac{x^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{0}{6} = \frac{1}{6}.$$

例 6.81 (定積分の計算例)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1.$$

例 6.82 (定積分の計算例)

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left[\tan^{-1} x \right]_0^1 = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

例 6.83 (定積分の計算例)

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \sinh^{-1}(1) = \log(1 + \sqrt{2}).$$

6.15 定積分の置換積分

定理 6.84 (置換積分) 積分変数を $x = \phi(t)$ と置き換えると定積分は

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t)) \phi'(t) \, dt = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t)) \frac{dx}{dt} \, dt$$

と表される.

例 6.85 (置換積分の計算例)

$$I = \int_0^1 (1-x)^\alpha \, dx = \left[\frac{-1}{\alpha+1} (1-x)^{\alpha+1} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{\alpha+1} = \frac{1}{\alpha+1}. \quad (\alpha > 0)$$

例 6.86 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} \cos t \, dt = a^2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t \, dt \\ &= a^2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2 t} \cos t \, dt = a^2 \int_0^{\pi/2} |\cos t| \cos t \, dt = a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t \, dt = \frac{a}{2} \int_0^{\pi/2} (\cos 2t + 1) \, dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{1}{2} \sin 2t + t \right]_0^{\pi/2} = \frac{a^2}{4} (\sin \pi - \sin 0) + \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{4} a^2. \quad (a > 0) \end{aligned}$$

ここで, $x = a \sin t$, $t = \sin^{-1} \frac{x}{a}$ において, $\frac{dx}{dt} = a \cos t$ を用いた.

例 6.87 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x \, dx = - \int_0^{\pi/2} \cos^2 x (\cos x)' \, dx = - \int_1^0 t^2 \frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} \, dt = - \int_1^0 t^2 \, dt \\ &= \int_0^1 t^2 \, dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

ここで, $t = \cos x$ において, $t = \sin 0 = 1$, $t = \sin \frac{\pi}{2} = 0$, $\frac{dt}{dx} = -\sin x$, $\frac{dt}{dx} \frac{dx}{dt} = 1$ を用いた.

例 6.88 (置換積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int_0^1 \frac{\frac{dt}{dx} dx}{1 + t^2} dt = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= \left[\text{Tan}^{-1} x \right]_0^1 = \text{Tan}^{-1}(1) - \text{Tan}^{-1}(0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

ここで $t = \sin x$ とおいた . このとき

$$\frac{dt}{dx} = \cos x, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dt}{dx} \right)^{-1} = \frac{1}{\cos x}$$

であることを用いた . また積分区間は $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ から $0 = \sin(0) \leq t \leq 1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ へと変わる .

例 6.89 (双曲線関数を用いた定積分) 定積分

$$I = \int_{-4}^{-2} \sqrt{x^2 - 1} dx$$

を考える . 積分区間が $x : -4 \rightarrow -2$ であるから $x < 0$ である . このことに注意して変数変換を

$$x = -\cosh t < 0 \quad (0 < t = \text{Cosh}^{-1}(-x))$$

とする . このとき積分区間は

$$t : \text{Cosh}^{-1}(4) \rightarrow \text{Cosh}^{-1}(2)$$

となる . また

$$\frac{dx}{dt} = -\sinh t$$

であることを用いると

$$\begin{aligned} I &= \int_{\text{Cosh}^{-1}(4)}^{\text{Cosh}^{-1}(2)} \sqrt{\cosh^2 t - 1} (-\sinh t) dt \\ &\quad (\text{積分区間をひっくり返す . } \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1 \text{ を用いて .}) \\ &= - \int_{\text{Cosh}^{-1}(2)}^{\text{Cosh}^{-1}(4)} \sinh t \sqrt{\sinh^2 t} dt = \int_{\text{Cosh}^{-1}(2)}^{\text{Cosh}^{-1}(4)} \sinh t |\sinh t| dt \\ &\quad (\text{Cosh}^{-1}(2) \leq t \leq \text{Cosh}^{-1}(4) \text{ のとき } \sinh t > 0 \text{ より .}) \\ &= \int_{\text{Cosh}^{-1}(2)}^{\text{Cosh}^{-1}(4)} \sinh^2 t dt \\ &\quad (\sinh^2 t = (\cosh 2t - 1)/2 \text{ を用いて .}) \\ &= \frac{1}{2} \int_{\text{Cosh}^{-1}(2)}^{\text{Cosh}^{-1}(4)} (\cosh(2t) - 1) dt = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sinh(2t) - t \right]_{\text{Cosh}^{-1}(2)}^{\text{Cosh}^{-1}(4)} \\ &= \frac{1}{4} \sinh(2 \text{Cosh}^{-1}(4)) - \frac{1}{4} \sinh(2 \text{Cosh}^{-1}(2)) - \frac{1}{2} \text{Cosh}^{-1}(4) + \frac{1}{2} \text{Cosh}^{-1}(2) \end{aligned}$$

となる . ここで

$$\text{Cosh}^{-1}(x) = \log(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

であることを用いる．このとき

$$\begin{aligned} \sinh(2\text{Cosh}^{-1}(x)) &= \frac{1}{2} \left(e^{2\log(x+\sqrt{x^2-1})} - e^{-2\log(x+\sqrt{x^2-1})} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(x + \sqrt{x^2-1} \right)^2 - \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2-1}} \right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1}{x - \sqrt{x^2-1}} \right)^2 - \left(\frac{1}{x + \sqrt{x^2-1}} \right)^2 \right) \\ &= \frac{2x\sqrt{x^2-1}}{\left(x - \sqrt{x^2-1} \right)^2 \left(x + \sqrt{x^2-1} \right)^2} = 2x\sqrt{x^2-1} \end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \sinh(2\text{Cosh}^{-1}(4)) - \frac{1}{4} \sinh(2\text{Cosh}^{-1}(2)) &= \frac{2 \times 4}{4} \sqrt{4^2-1} - \frac{2 \times 2}{4} \sqrt{2^2-1} \\ &= 2\sqrt{15} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

となる．また

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \text{Cosh}^{-1}(4) + \frac{1}{2} \text{Cosh}^{-1}(2) &= -\frac{1}{2} \log(4 + \sqrt{4^2-1}) + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{2^2-1}) \\ &= -\frac{1}{2} \log \frac{4 + \sqrt{15}}{2 + \sqrt{3}} = -\frac{1}{2} \log \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - \sqrt{15}} \end{aligned}$$

である．よって

$$\begin{aligned} I &= 2\sqrt{15} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} \log \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - \sqrt{15}} \\ &= 2\sqrt{15} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} \log(8 + 2\sqrt{15} - 4\sqrt{3} - 3\sqrt{5}) \end{aligned}$$

を得る．

例 6.90 (双曲線関数を用いた定積分) 定積分

$$I = \int_{-4}^{-2} \sqrt{x^2-1} dx$$

を求める．

$$\sqrt{x^2-1} = x - t$$

とおく．すると，

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int_{\alpha}^{\beta} \left(t - \frac{2}{t} + \frac{1}{t^3} \right) dt = \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} - 2 \log t - \frac{1}{2t^2} \right]_{\alpha}^{\beta} \\ &= \frac{\beta^2 - \alpha^2}{8} - \frac{1}{8} \left(\frac{1}{\beta^2} - \frac{1}{\alpha^2} \right) - \frac{1}{2} \log \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) \end{aligned}$$

となる．ここで，

$$\alpha = -4 + \sqrt{15}, \quad \beta = -2 + \sqrt{3}$$

である．これらを代入すると

$$\begin{aligned} I &= 2\sqrt{15} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} \log \frac{2 - \sqrt{3}}{4 - \sqrt{15}} \\ &= 2\sqrt{15} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} \log(8 + 2\sqrt{15} - 4\sqrt{3} - 3\sqrt{5}) \end{aligned}$$

を得る．

6.16 定積分の部分積分

定理 6.91 (部分積分)

$$\int_a^b f'(x)g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x) dx.$$

例 6.92 (部分積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi x \sin x dx = \int_0^\pi x (-\cos x)' dx = [-x \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi 1 \times (-\cos x) dx \\ &= [-x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x dx = [-x \cos x]_0^\pi + [\sin x]_0^\pi = [-x \cos x + \sin x]_0^\pi \\ &= (-\pi \cos \pi + \sin \pi) - (-0 \times \cos 0 + \sin 0) = \pi. \end{aligned}$$

例 6.93 (部分積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x (e^{2x})' dx = \left[\frac{1}{2} x e^{2x} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx = \left[\frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} \right]_0^1 \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} - 0 + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

例 6.94 (部分積分の計算例)

$$I = \int_0^1 (\sin^{-1} x)^4 dx = \int_0^{\pi/2} t^4 \cos t dt = \dots$$

ここで, $t = \sin^{-1} x$, $x = \sin t$ とおき, $\frac{dx}{dt} = \cos t$, $t = \sin^{-1} 0 = 0$, $t = \sin^{-1} 1 = \frac{\pi}{2}$ を用いた.

6.17 偶関数と奇関数の定積分

定理 6.95 (偶関数, 奇関数の定積分) 関数 $f(x)$ が偶関数のとき

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

関数 $f(x)$ が奇関数のとき

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

(証明) 関数 $f(x)$ が偶関数のとき

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^{-a} f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= - \int_0^a f(-t)(-1) dt + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$

が成り立つ. 関数 $f(x)$ が奇関数のとき

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^{-a} f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= - \int_0^a f(-t)(-1) dt + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

が成り立つ.

6.18 三角関数の定積分

問 6.96 (三角関数の定積分) 自然数 n, m に対して

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \, dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos nx \, dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx \, dx = \pi \delta_{n,m}, \quad \int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx \, dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx \, dx = \pi \delta_{n,m}$$

となることを示せ. ただし, $\delta_{n,m}$ はクロネッカーのデルタ (Kronecker's delta) である.

(答え)

$$\int_0^{2\pi} \cos nx \, dx = \left[\frac{1}{n} \sin nx \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{n} (\sin 2n\pi - \sin 0) = 0.$$

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \, dx = \left[-\frac{1}{n} \cos nx \right]_0^{2\pi} = -\frac{1}{n} (\cos 2n\pi - \cos 0) = -\frac{1}{n} (1 - 1) = 0.$$

$n \neq m$ のとき,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx \, dx &= \frac{-1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos(n+m)x - \cos(n-m)x) \, dx \\ &= \frac{-1}{2} \left[\frac{\sin(n+m)x}{n+m} - \frac{\sin(n-m)x}{n-m} \right]_0^{2\pi} = -\frac{\sin 2(n+m)\pi - \sin 0}{2(n+m)} + \frac{\sin 2(n-m)\pi - \sin 0}{2(n-m)} = 0. \\ \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos(n+m)x + \cos(n-m)x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(n+m)x}{n+m} + \frac{\sin(n-m)x}{n-m} \right]_0^{2\pi} = \frac{\sin 2(n+m)\pi - \sin 0}{2(n+m)} + \frac{\sin 2(n-m)\pi - \sin 0}{2(n-m)} = 0. \\ \int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\sin(n+m)x + \sin(n-m)x) \, dx \\ &= \frac{-1}{2} \left[\frac{\cos(n+m)x}{n+m} + \frac{\cos(n-m)x}{n-m} \right]_0^{2\pi} = -\frac{\cos 2(n+m)\pi - \cos 0}{2(n+m)} - \frac{\cos 2(n-m)\pi - \cos 0}{2(n-m)} \\ &= -\frac{1-1}{2(n+m)} - \frac{1-1}{2(n-m)} = 0. \end{aligned}$$

$n = m$ のとき,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin nx \sin nx \, dx &= \int_0^{2\pi} \sin^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2x) \, dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{2\pi - 0}{2} - \frac{\sin 4\pi - \sin 0}{4} = \pi. \\ \int_0^{2\pi} \cos nx \cos nx \, dx &= \int_0^{2\pi} \cos^2 nx \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos 2x + 1) \, dx = \left[\frac{\sin 2x}{4} + \frac{x}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{\sin 4\pi - \sin 0}{4} + \frac{2\pi - 0}{2} = \pi. \\ \int_0^{2\pi} \sin nx \cos nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2x \, dx = \left[-\frac{\cos 2x}{4} \right]_0^{2\pi} = -\frac{\cos 4\pi - \cos 0}{4} = -\frac{1-1}{4} = 0. \end{aligned}$$

問 6.97 (三角関数の定積分) 定積分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx, \quad J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

は

$$I_n = J_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (n: \text{偶数}) \\ 1 & (n: \text{奇数}) \end{cases}$$

となることを示せ (ヒント: 例 6.31 を用いよ) .

6.19 図形の面積

定理 6.98 (図形的面積) 曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ と直線 $x = a$, $x = b$ とで囲まれてできる領域の面積は

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$$

により求まる .

定理 6.99 (図形的面積) 曲線 $y = f(x)$ と x 軸 と直線 $x = a$, $x = b$ で囲まれてできる領域の面積は

$$S = \int_a^b |f(x)| \, dx$$

により求まる .

例 6.100 (図形的面積の計算例) 単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の内部の領域の面積を求める . 円の方程式は書き直すと

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}$$

と表される . $y(x)$ は 2 価関数である . 枝をそれぞれ

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad g(x) = -\sqrt{1 - x^2}$$

とおく . このとき円の面積は

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_{-1}^1 \left(\sqrt{1 - x^2} - \left(-\sqrt{1 - x^2} \right) \right) \, dx = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx \\ &= 4 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx \\ &\quad (x = \cos t \text{ とおく . } dx/dt = -\sin t \text{ であり } x: 0 \rightarrow 1 \text{ は } t: \pi/2 \rightarrow 0 \text{ となる .}) \\ &= 4 \int_{\pi/2}^0 \sqrt{1 - \cos^2 t} (-\sin t) \, dt \\ &\quad (\text{積分区間をひっくり返す . } \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \text{ を用いて .}) \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} |\sin t| \sin t \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (0 \leq t \leq \pi/2 \text{ のとき } \sin t \geq 0 \text{ より}) \\
& = 4 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \, dt \\
& \quad (\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2 \text{ を用いて.}) \\
& = 2 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t) \, dt = \left[2t - \sin 2t \right]_0^{\pi/2} = 2 \times \frac{\pi}{2} - 0 - \sin(\pi) + \sin(0) = \pi
\end{aligned}$$

と求まる.

例 6.101 (図形の面積の計算例) 曲線 $x = y^2$ と直線 $x = y + 2$ とで囲まれてできる領域の面積は

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - (-\sqrt{x})) \, dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) \, dx$$

により求まる.

例 6.102 (図形の面積の計算例) 円 $x^2 + y^2 = 1$ を直線 $2x + 2y = 1$ で 2 つに分割する. 分割された上側の領域の面積を求める. 面積は

$$S = \int_{-1}^{\alpha} (\sqrt{1-x^2} - (-\sqrt{1-x^2})) \, dx + \int_{\alpha}^{\beta} (\sqrt{1-x^2} - \frac{1-2x}{2}) \, dx$$

により求まる. ここで, α, β ($\alpha < \beta$) は円と直線の交点の x 座標で

$$x^2 + \left(\frac{1-2x}{2} \right)^2 = 1$$

の根である. 計算は自習.

6.20 曲線の長さ

定理 6.103 (曲線の長さ) 区間 $[a, b]$ における関数 $y = f(x)$ のグラフの曲線の長さは

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \, dx$$

により得られる.

注意 6.104 (曲線の長さ) 曲線 s のうちある点 (x, y) のまわりの微小線分を ds とする. このとき ds を斜辺とする直角三角形を考える. その他の辺の長さを dx, dy とするとピタゴラスの定理より

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$$

が成り立つ. 数学的には厳密ではないが次の展開をすると微小線分 ds は

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \, dx$$

と表される. 曲線の長さ s は微小線分 ds を全て足し合わせたものだから

$$s = \int_0^s ds = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} \, dx$$

となる.

定理 6.105 (曲線の長さ) 曲線 $x = \phi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$ の長さは

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

により得られる .

例 6.106 (曲線の長さの計算例) 単位円の円周の長さを考える . $x^2 + y^2 = 1$ より $y = \pm\sqrt{1-x^2}$ だから多価関数の枝を分けて

$$y_+ = \sqrt{1-x^2}, \quad y_- = -\sqrt{1-x^2}$$

とする . このとき

$$\frac{y_{\pm}}{dx} = \frac{\mp x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \sqrt{1 + \left(\frac{dy_{\pm}}{dx}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

が成り立つ . よって

$$\begin{aligned} s &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy_+}{dx}\right)^2} dx + \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy_-}{dx}\right)^2} dx = 2 \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 4 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= 4 \left[\sin^{-1} x \right]_0^1 = 4 (\sin^{-1}(1) - \sin^{-1}(0)) = 4 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = 2\pi \end{aligned}$$

を得る .

例 6.107 (曲線の長さの計算例) $-1 \leq x \leq 1$ における曲線 $y = x^2$ の長さ考える . $dy/dx = 2x$ であるから曲線の長さ s は

$$s = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx = 2 \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

と表される . 積分を計算する . 置換積分として

$$x = \frac{1}{2} \sinh t, \quad \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \cosh t, \quad t : 0 \rightarrow \sinh^{-1}(2)$$

とおく . すると

$$s = \int_0^{\sinh^{-1}(2)} \cosh t \sqrt{1 + \sinh^2 t} dt$$

となる . 双曲線関数の性質

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

を用いると

$$s = \int_0^{\sinh^{-1}(2)} \cosh^2 t dt$$

となる .

$$\cosh^2 t = \frac{1}{2}(\cosh 2t + 1)$$

を用いると

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{2} \int_0^{\sinh^{-1}(2)} (\cosh 2t + 1) dt = \left[\frac{1}{4} \sinh 2t + \frac{t}{2} \right]_0^{\sinh^{-1}(2)} \\ &= \frac{1}{4} (\sinh(2 \sinh^{-1}(2)) - \sinh(2 \sinh^{-1}(0))) + \frac{1}{2} (\sinh^{-1}(2) - \sinh^{-1}(0)) \\ &= \frac{1}{4} \sinh(2 \sinh^{-1}(2)) + \frac{1}{2} \sinh^{-1}(2) \end{aligned}$$

となる．ここで

$$\sinh^{-1} t = \log(t + \sqrt{t^2 + 1})$$

であることを用いると

$$\begin{aligned} s &= \frac{1}{4} \frac{e^{2 \log(2 + \sqrt{2^2 + 1})} - e^{-2 \log(2 + \sqrt{2^2 + 1})}}{2} + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{2^2 + 1}) \\ &= \frac{1}{8} \left((2 + \sqrt{5})^2 - \left(\frac{1}{2 + \sqrt{5}} \right)^2 \right) + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{5}) \\ &= \frac{1}{8} \left(\left(\frac{1}{\sqrt{5} - 2} \right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{5} + 2} \right)^2 \right) + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{5}) \\ &= \frac{1}{8} \frac{(\sqrt{5} + 2)^2 - (\sqrt{5} - 2)^2}{(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2)} + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{5}) = \sqrt{5} + \frac{1}{2} \log(2 + \sqrt{5}) \end{aligned}$$

を得る．

例 6.108 (曲線の長さの計算例) 前例題において $-1 \leq x \leq 1$ における曲線 $y = x^2$ の長さは $\sqrt{1 + 4x^2} = t - 2x$ において置換積分すると

$$\begin{aligned} \frac{s}{2} &= \int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} dx = \frac{1}{8} \int_1^{2 + \sqrt{5}} \left(t + \frac{2}{t} + \frac{1}{t^3} \right) dx = \frac{1}{8} \left[\frac{t^2}{2} + 2 \log t - \frac{1}{2t^2} \right]_1^{2 + \sqrt{5}} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \log(2 + \sqrt{5}) \end{aligned}$$

と表される．

例 6.109 (曲線の長さの計算例) $-b \leq x \leq b$ における曲線

$$y = a \cosh \frac{x}{a}$$

の長さ考える．これはひもをつるしたとき重力でたわんでできるひもの曲線の形を表しており，懸垂線(けんすいせん)という．これを計算する．まず，

$$\frac{dy}{dx} = \sinh \frac{x}{a}$$

より，曲線の長さ s は

$$\begin{aligned} s &= \int_{-b}^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2} dx = \int_{-b}^b \sqrt{1 + \sinh^2 \frac{x}{a}} dx = \int_{-b}^b \cosh \frac{x}{a} dx \\ &= \left[a \sinh \frac{x}{a} \right]_{-b}^b = a \sinh \frac{b}{a} - a \sinh \frac{-b}{a} = 2a \sinh \frac{b}{a} = ae^{\frac{b}{a}} - ae^{-\frac{b}{a}} \end{aligned}$$

と表される．

6.21 回転体の体積

定理 6.110 (回転体の体積) 曲線 $y = f(x)$ と直線 $x = a, x = b, y = 0$ とで囲まれてできる図形を x 軸の回りで 1 回転してできる立体の体積は

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

により求まる .

例 6.111 (回転体の体積) $y = x^2$ と $x = 1, y = 0$ とで囲まれてできる領域を x 軸の回りで 1 回転してできる立体の体積は

$$V = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{5} .$$

問 6.112 (回転体の体積) $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ の内部の領域を x 軸の回りで 1 回転してできる立体の体積を求めよ .

6.22 演習 ~ 定積分

問 6.113 (定積分) 次を示せ .

(1) $f(x)$ が偶関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

(2) $f(x)$ が奇関数のとき $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

問 6.114 (定積分) 次の定積分を求めよ .

(1) $\int_a^b \alpha dx$ (2) $\int_a^b x dx$ (3) $\int_0^1 x^5 dx$ (4) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ (5) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ (6) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$

(7) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$

例 6.115 (定積分の置換積分) 次の定積分を求めよ . ($a > 0$)

(1) $\int_0^1 (1-x)^a dx$ (2) $\int_0^1 \sqrt{(3x+1)^3} dx$ (3) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx$ (4) $\int_0^{a/2} \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$

(5) $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$ (6) $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ (7) $\int_1^{1+\sqrt{2}} \frac{2}{\sqrt{x^2-2x+3}} dx$ (8) $\int_0^{2a} x^2 \sqrt{2ax-x^2} dx$

(9) $\int_{-4}^{-2} \sqrt{x^2-1} dx$ (10) $\int_1^2 x e^{x^2} dx$ (11) $\int_0^2 x \log(x^2+1) dx$ (12) $\int_1^e \frac{(\log x)^4}{x} dx$

例 6.116 (定積分の部分積分) 次の定積分を求めよ .

(1) $\int_0^\pi x \sin x dx$ (2) $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx$ (3) $\int_0^\pi x^3 \cos x dx$ (4) $\int_0^2 x^2 e^{2x} dx$

(5) $\int_0^1 (\sin^{-1} x)^4 dx$ ($t = \sin^{-1} x$)

例 6.117 (有理式の定積分) 次の定積分を求めよ .

(1) $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{1+x}{1+x^2} dx$ (2) $\int_0^2 \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$ (3) $\int_0^2 \frac{x^3}{(x+1)^2} dx$ (4) $\int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx$

例 6.118 (三角関数の定積分) 次の定積分を求めよ .

$$(1) \int_0^{\pi/4} \cos^3 x dx \quad (2) \int_0^{\pi} \cos^4 x dx \quad (3) \int_0^{\pi/2} \sin^5 x dx \quad (4) \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$$

$$(5) \int_0^{\pi} (1 - \sin x) \cos^6 x dx \quad (6) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx \quad (7) \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin^3 x} dx$$

問 6.119 (三角関数の定積分) 自然数 n, m に対して次の定積分が成立することを示せ .

$$\int_0^{2\pi} \sin nx dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos nx dx = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = \pi \delta_{n,m}, \quad \int_0^{2\pi} \sin nx \cos mx dx = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx = \pi \delta_{n,m}.$$

問 6.120 (定積分) 次の定積分が成立することを示せ .

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2} & (n: \text{偶数}) \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} & (n: \text{奇数}) \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

問 6.121 (面積) 次の領域の面積を定積分で求めよ .

- (1) 単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の内部の領域 .
- (2) 楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) の内部の領域
- (3) 曲線 $x = y^2$ と直線 $x = y + 2$ とで囲まれてできる領域 .
- (4) 2つの曲線 $y = \frac{x^3}{4}, y = x^3 - x$ で囲まれてできる領域 .
- (5) 円 $x^2 + y^2 = 1$ を直線 $2x + 2y = 1$ で2つに分割してできる上側の領域 .
- (6) 曲線 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) と x 軸とで囲まれてできる領域 .
- (7) 曲線 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) と x 軸とで囲まれてできる領域 .
- (8) 曲線 $x = 2t + 1, y = 2 - t - t^2$ と x 軸とで囲まれてできる領域 .
- (9) 曲線 $x = \sin t, y = t \cos t$ ($0 \leq t \leq \pi/2$) と x 軸とで囲まれてできる領域 .
- (10) 曲線 $x = a(1 - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) と x 軸とで囲まれてできる領域 .

問 6.122 (曲線の長さ) 次の曲線の長さを定積分で求めよ .

- (1) 単位円 $x^2 + y^2 = 1$ の円周の長さ .
- (2) $y = x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$)
- (3) $y = \cosh x$ ($-1 \leq x \leq 1$)
- (4) $y = \log x$ ($1 \leq x \leq 2$)
- (5) $y = \log \cos x$ ($0 \leq x \leq \pi/4$)
- (6) $y = \frac{a}{2}(e^{x/a} + e^{-x/a})$ ($0 \leq x \leq b$)
- (7) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)
- (8) $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)
- (9) $x = t \cos(1/t), y = t \sin(1/t)$ ($1 \leq t \leq 2$)
- (10) $x = 3t^2, y = 3t - t^3$ ($0 \leq t \leq 2$)

問 6.123 (回転体の体積) 次の体積を求めよ .

- (1) $y = x^2, x = 1, y = 0$ とで囲まれてできる領域を x 軸回りで1回転してできる立体 .
- (2) $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ の内部の領域を x 軸回りで1回転してできる立体 .

6.23 広義積分

有限区間で連続な関数に対し定義される量が定積分である . 不連続点を含む区間や無限区間における積分へ拡張する . この拡張された積分を広義積分 (improper integral) という .

定義 6.124 (不連続点を含む区間での広義積分) 関数 $f(x)$ が $x = a$ で不連続で, 区間 $(a, b]$ で連続なとき,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx.$$

$x = b$ で不連続で, 区間 $[a, b)$ で連続なとき,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx.$$

$x = c$ ($a < c < b$) で不連続で, 区間 $[a, b]$ で連続なとき,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon_1 \rightarrow +0} \int_a^{c-\epsilon_1} f(x) dx + \lim_{\epsilon_2 \rightarrow +0} \int_{c+\epsilon_2}^b f(x) dx.$$

以上の極限が存在するとき広義積分は収束するという.

例 6.125 (不連続点を含む広義積分の具体例)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{0+\epsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} [2\sqrt{x}]_{0+\epsilon}^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (2\sqrt{1} - 2\sqrt{\epsilon}) = 2. \\ \int_0^1 \frac{dx}{x} &= \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{0+\epsilon}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} [\log|x|]_{0+\epsilon}^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} (\log 1 - \log \epsilon) = -\lim_{\epsilon \rightarrow +0} \log \epsilon = +\infty. \\ \int_0^1 \frac{dx}{x^2} &= \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{0+\epsilon}^1 \frac{dx}{x^2} = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \left[-\frac{1}{x}\right]_{0+\epsilon}^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \left(-1 + \frac{1}{\epsilon}\right) = +\infty. \end{aligned}$$

定理 6.126 (広義積分の収束次数) 実数 $p > 0$ に対して次の広義積分が成り立つ:

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & (0 < p < 1) \\ +\infty & (p \geq 1) \end{cases}$$

問 6.127 (広義積分の収束次数) これを示せ.

例 6.128 (広義積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x \log x dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{\epsilon}^1 x \log x dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \left(-\frac{1}{2}\epsilon^2 \log \epsilon + \frac{\epsilon^2}{4} - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \epsilon^2 \log \epsilon \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\log \xi}{\xi^2} = -\frac{1}{4}. \quad (\epsilon = 1/\xi) \\ I_{\epsilon} &= \int_{\epsilon}^1 x \log x dx = \frac{1}{2} \int_{\epsilon}^1 (x^2)' \log x dx = \left[\frac{1}{2}x^2 \log x\right]_{\epsilon}^1 - \frac{1}{2} \int_{\epsilon}^1 x dx \\ &= \left[\frac{1}{2}x^2 \log x - \frac{1}{4}x^2\right]_{\epsilon}^1 = \frac{1}{2} \log 1 - \frac{1}{2}\epsilon^2 \log \epsilon - \frac{1-\epsilon^2}{4} = -\frac{1}{2}\epsilon^2 \log \epsilon + \frac{\epsilon^2}{4} - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

例 6.129 (広義積分の計算例)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 \log x dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \int_{\epsilon}^1 x^2 \log x dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \left(-\frac{1}{9} + \frac{\epsilon^3}{9} - \frac{\epsilon^3 \log \epsilon}{3}\right) = -\frac{1}{9}. \\ I_{\epsilon} &= \int_{\epsilon}^1 x^2 \log x dx = \int_{\xi}^0 e^{2t} t e^t dt = \int_{\xi}^0 t e^{3t} dt = \frac{1}{3} \int_{\xi}^0 t (e^{3t})' dt = \frac{1}{3} \left[te^{3t}\right]_{\xi}^0 - \frac{1}{3} \int_{\xi}^0 e^{3t} dt \\ &= \left[\frac{1}{3}te^{3t} - \frac{1}{9}e^{3t}\right]_{\xi}^0 = \frac{0 - \xi e^{3\xi}}{3} - \frac{1 - e^{3\xi}}{9} = -\frac{1}{9} - \frac{(3\xi - 1)e^{3\xi}}{9} = -\frac{1}{9} + \frac{\epsilon^3}{9} - \frac{\epsilon^3 \log \epsilon}{3}. \end{aligned}$$

ここで, $t = \log x, x = e^t$ とおき, $\frac{dx}{dt} = e^t, t = \log 1 = 0, t = \log \epsilon = \xi$ を用いた.

定義 6.130 (無限区間での広義積分) 関数 $f(x)$ が無限区間 $[a, \infty)$ で連続なとき,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

無限区間 $(-\infty, b]$ で連続なとき,

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

無限区間 $(-\infty, \infty)$ で連続なとき,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

以上の極限が存在するとき広義積分は収束するという.

例 6.131 (無限区間での広義積分の具体例)

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{b \rightarrow \infty} [\text{Tan}^{-1} x]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\text{Tan}^{-1}(b) - \text{Tan}^{-1}(0)) \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \text{Tan}^{-1}(b) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例 6.132 (無限区間での広義積分の具体例)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 1} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{dx}{x^2 + 1} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} [\text{Tan}^{-1} x]_a^b \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} (\text{Tan}^{-1}(b) - \text{Tan}^{-1}(a)) = \lim_{b \rightarrow \infty} \text{Tan}^{-1}(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} \text{Tan}^{-1}(a) = \pi. \end{aligned}$$

例 6.133 (無限区間での広義積分の具体例) $\alpha > 0$ に対して

$$\int_{-\infty}^0 e^{\alpha x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{\alpha x} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} \right]_a^0 = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{1}{\alpha} (1 - e^{\alpha a}) = \frac{1}{\alpha}.$$

例 6.134 (無限区間での広義積分の具体例)

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{b \rightarrow \infty} [2\sqrt{x}]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (2\sqrt{b} - 2) = +\infty. \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{x} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow \infty} [\log x]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (\log b - \log 1) = \lim_{b \rightarrow \infty} \log b = +\infty. \\ \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1. \end{aligned}$$

定理 6.135 (広義積分の収束次数) 実数 $p > 0$ に対して次の広義積分が成り立つ:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} +\infty & (0 < p \leq 1) \\ \frac{1}{1-p} & (p > 1) \end{cases}$$

問 6.136 (広義積分の収束次数) これを示せ .

例 6.137 (広義積分の収束性) 広義積分

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x x^p}$$

を考える . 被積分関数は

$$\frac{1}{e x^p} \leq \frac{1}{e^x x^p} \leq \frac{1}{x^p}$$

の関係が成り立つので ,

$$\frac{1}{e} \int_0^1 \frac{dx}{x^p} \leq \int_0^1 \frac{dx}{e^x x^p} \leq \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

となる . ここで ,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \text{収束} & (0 < p < 1) \\ \text{発散} & (p \geq 1) \end{cases}$$

であるから , はさみうちの定理より ,

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x x^p} = \begin{cases} \text{収束} & (0 < p < 1) \\ \text{発散} & (p \geq 1) \end{cases}$$

を得る .

6.24 コーシーの主値積分

定義 6.138 (コーシーの主値積分) 関数 $f(x)$ が $x = c$ ($a < c < b$) で不連続で , 有限区間 $[a, b]$ で連続なとき ,

$$\text{v.p.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow +0} \left(\int_a^{c-\epsilon} f(x) dx + \int_{c+\epsilon}^b f(x) dx \right)$$

を c におけるコーシーの主値積分 (Cauchy's principal values of integral) という . また関数 $f(x)$ が無限区間 $(-\infty, \infty)$ で連続なとき ,

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\int_{-a}^a f(x) dx \right)$$

を ∞ におけるコーシーの主値積分という . 主値積分はまた

$$\text{P} \int_a^b f(x) dx$$

とも表記する .

例 6.139 (広義積分での計算例)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x \, dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b x \, dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2 - a^2}{2} \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2}{2} - \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{a^2}{2} = \infty - \infty : \text{存在しない.} \end{aligned}$$

例 6.140 (コーシーの主値積分での計算例)

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} x \, dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a x \, dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-a}^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^2 - a^2}{2} = 0. \quad \dots \text{有限確定}$$

例 6.141 (極限は多価となる計算例) 広義積分では極限 $a \rightarrow -\infty, b \rightarrow \infty$ は独立に考え、コーシーの主値積分では $a = -b$ と条件を課して極限を考える。いま、 $a = -kb$ と条件を課して極限をとることにする。積分は

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-kb}^b x \, dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-kb}^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^2 - k^2 b^2}{2} = \frac{1 - k^2}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} b^2$$

となる。(i) $|k| = 1$ のとき積分は 0 に有限確定する。(ii) $|k| < 1$ のとき積分は $+\infty$ に無限確定する。(iii) $|k| > 1$ のとき積分は $-\infty$ に無限確定する。このように、積分は極限の取方により多価となる。

例 6.142 (広義積分での計算例)

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon_1} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon_2}^1 \frac{dx}{x} \right) = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} \left[\log |x| \right]_{-1}^{-\varepsilon_1} + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \left[\log |x| \right]_{\varepsilon_2}^1 \\ &= \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} (\log \varepsilon_1 - \log 1) + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} (\log 1 - \log \varepsilon_2) = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow +0} \log \varepsilon_1 - \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow +0} \log \varepsilon_2 \\ &= -\infty + \infty : \text{存在しない.} \end{aligned}$$

例 6.143 (コーシーの主値積分での計算例)

$$\begin{aligned} \text{v.p.} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{x} \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left[\log |x| \right]_{-1}^{-\varepsilon} + \left[\log |x| \right]_{\varepsilon}^1 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\log \varepsilon - \log 1 + \log 1 - \log \varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\log \varepsilon - \log \varepsilon) = 0. \quad \dots \text{有限確定} \end{aligned}$$

例 6.144 (コーシーの主値積分の計算例)

$$\begin{aligned} \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow +\infty} 2 \int_0^a \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{a \rightarrow +\infty} 2 \left[\text{Tan}^{-1} x \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} 2 \text{Tan}^{-1}(a) = \pi. \end{aligned}$$

6.25 級数と定積分

例 6.145 (調和級数と定積分) 曲線 $y = \frac{1}{x}$ の面積を考える。範囲が $1 \leq x \leq n+1$ のときの面積を S_n とする。また、幅が 1 で高さが $\frac{1}{k}$ の長方形の面積を $k = 1, 2, 3, \dots, n$ まで足合わせたものを T_n とする。このときグラフを書けば明らかに

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \int_1^{n+1} \frac{dx}{x} = \log(n+1) = T_n$$

が成り立つ．よって $n \rightarrow \infty$ のとき

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad T = \lim_{n \rightarrow \infty} \log(n+1) = \infty$$

である． $S > T$ であるから，調和級数 S は発散する．

例 6.146 (発散する級数と定積分)

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots > T = \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}} = \infty$$

である．よって級数 $S = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ は発散する．

例 6.147 (収束する級数と定積分)

$$1 = \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} < S = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots < 1 + \int_2^{\infty} \frac{dx}{(x-1)^2} = 2$$

が成り立つ． $1 < S < 2$ であるから $S = \sum \frac{1}{n^2}$ は収束する．

問 6.148 (級数の収束)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{発散} & (0 < p \leq 1) \\ \text{収束} & (p > 1) \end{cases}$$

となることを示せ．

6.26 演習 ~ 広義積分

問 6.149 (広義積分) 次の広義積分の値を求めよ．

- (1) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ (2) $\int_0^1 \frac{dx}{x}$ (3) $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ (4) $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ ($0 < p < 1$) (5) $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ ($p \geq 1$)
 (6) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$ (7) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x}$ (8) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ (9) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ($0 < p \leq 1$) (10) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ($p > 1$)
 (11) $\int_{-\infty}^0 e^{\alpha x} dx$ ($\alpha > 0$) (12) $\int_{-\infty}^0 e^{\alpha x} dx$ ($\alpha < 0$) (13) $\int_0^{\infty} e^{\alpha x} dx$ ($\alpha > 0$)
 (14) $\int_0^{\infty} e^{\alpha x} dx$ ($\alpha < 0$) (15) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ (16) $\int_0^1 x \log x dx$ (17) $\int_0^1 x^2 \log x dx$
 (18) $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{2-x}}$ (19) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3-x}}$ (20) $\int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{x^2}$ (21) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$ (22) $\int_{-1}^2 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$
 (23) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (24) $\int_0^r \frac{4r}{\sqrt{r^2-x^2}} dx$ ($r > 0$) (25) $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ (26) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$
 (27) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x^2-1|}}$ (28) $\int_0^2 \frac{2x-3}{\sqrt{|x^2-3x+2|}} dx$ (29) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ (30) $\int_0^{\infty} x e^{-x}$
 (31) $\int_0^{\infty} x e^{-x^2}$ (32) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

問 6.150 (広義積分) 定積分 $I(a, b) = \int_a^b x dx$ に条件 $a = -kb$ (k : 実定数) を課して, 極限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} I(a, -kb)$ を求めよ.

問 6.151 (コーシーの主値積分) 次の広義積分とコーシー主値積分の違いに注意して積分の値を求めよ.

(1) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ (2) v.p. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ (3) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ (4) v.p. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ (5) $\int_{-\infty}^{\infty} x dx$ (6) v.p. $\int_{-\infty}^{\infty} x dx$

問 6.152 (広義積分) 広義積分を用いて次の級数が収束するか発散するか議論せよ.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($0 < p \leq 1$) (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$)

問 6.153 (広義積分) 次の広義積分は収束するか発散するか議論せよ.

(1) $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} dx$ (2) $\int_0^1 \sin \frac{1}{x} dx$ (3) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$ (4) $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x(x-1)}}$ (5) $\int_0^1 \log x dx$
 (6) $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ (7) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x}$ (8) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ (9) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^4+1}}$ (10) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$